

## The effect of adding *Trigonella fenum* and *Nigella sativa* to ration on milk yield and its chemical composition in local black dose

تأثير اضافة بذور الحلبة (*Trigonella fenum*) و بذور الحبة السوداء (*Nigella sativa*) الى عليةة اناث الماعز المحلي الاسود في انتاج الحليب و تركيبه الكيميائي

مهند فضل حسين المسعودي  
كلية الزراعة / جامعة كربلاء

### المستخلص

اجريت الدراسة في حقل اهلي في محافظة كربلاء اذ اخذت 15 من اناث الماعز المحلي بعد وضعها للمواليد و قسمت الى ثلاثة مجاميع متساوية و ضمت كل مجموعة 5 حيوانات . غذيت مجموعة السيطرة (C) على عليةة مركزية حيث قدمت العليةة المركزية بنسبة 2.5% من وزن الجسم مع اعطاء العلف الاخضر بكميات كافية والرعاية الحر لمدة ساعتين يوميا ، وغذيت مجموعة المعاملة الاولى (T1) على نفس العليةة السابقة مع اضافة بذور الحلبة بمقدار 90 غم /كغم علف ، وغذيت مجموعة المعاملة الثانية (T2) على نفس العليةة الاصلية مع اضافة بذور الحبة السوداء بواقع 9 غم /كغم علف ، ولمدة 90 يوما وقيس كمية الحليب المنتجة اسبوعيا من الحيوانات وكذلك تم تحليل تركيب الحليب الكيميائي (نسبة الدهن و البروتين و سكر الحليب (اللاكتوز) و المواد الصلبة اللادهنية ) اسبوعيا ، واظهرت النتائج تفوق معنوي ( $P < 0.05$ ) لمجموعة (T1) ومجموعة (T2) على مجموعة السيطرة في معدل كمية الحليب المنتجة اثناء مدة التجربة ، بينما لم يكن هناك فروق معنوية بين مجموعات التجربة في نسبة الدهن بروتين الحليب واللاكتوز و المواد الصلبة اللادهنية ، وتبيّن من هذه الدراسة ان اضافة بذور الحلبة او بذور الحبة السوداء الى علائق اناث الماعز المحلي الاسود قد ادت الى رفع كمية الحليب المنتجة من هذه الحيوانات مقارنة مع الحيوانات التي لم تضاف الى علائقها بذور الحلبة او بذور الحبة السوداء .

### Abstract:

This study was conducted in private farm in Karbala ,fifteen does were randomly divided into three groups (5 each),animal of first group (control ) free from any addition only concentrated diet, the 2<sup>nd</sup> group (T1) feeded on 90 gm of *Trigonella fenum* seed add to each Kg diet as afood addivites , while the 3<sup>rd</sup> group (T2) feeded on 9 gm of *Nigella sativa* seed add to each Kg diet as Afood addivites , weekly milk yield and milk chemical composition (fat %,protein %, lactose%, soild non fat (snf)% ) was investigated , milk yield checked for 6 week ,and samples of milk were taken for laboratory analysis , the result show significant increase ( $P < 0.05$ ) in milk yield in 2<sup>nd</sup> group(T1) and 3<sup>rd</sup> group (T2) in compared with control group (C) , no significant difference were observed in Fat%, milk protein %, lactose %and Snf % among all groups.

### المقدمة

يشكل الماعز مصدرا رئيسيا لغذاء بعض المجتمعات في العالم خصوصا التي تعيش في مناطق ذات اجواء بيئية قاسية كارتفاع درجة الحرارة والجفاف (1) ،اذ يمتاز الماعز بقابلية كبيرة للتكيف مع الظروف البيئية الفاسية وكذلك قدرته على استغلال الغذاء ذو القيمة المنخفضة والرعاية في مناطق فقيرة (2) ،بالاضافة الى سرعة بلوغه الجنسي وقصر دورة حياته وصغر حجمه مماساعد ذلك على انتشار تربيته في يد صغار المربين (3) ،وفي العراق يأتي الماعز بعد الاغنام والابقار من حيث العدد اذ بلغ تعداده عام 2008 بحدود 1474845 راسا (4) ،ولغرض زيادة انتاجيته اضيفت عدة مواد الى علائق الماعز كالفيتامينات والاملاح والمعادن لتعويض نقص الغذاء وكذلك لزيادة القيمة الغذائية للعليةة ومن هذه الاضافات هي النباتات الطبيعية اذ استخدمت مؤخرا بوصفها علاجا او كمنشطات لها القدرة على تحفيز انتاج الحليب سواء في الانسان (5) او الحيوانات الثدية الاخرى كالماعز (6) ،والابقار(7) ،ومن هذه النباتات الطبيعية هي نبات الحلبة (*Trigonella Fenum*) والتي تعد ذات قيمة غذائية جيدة (8) ، لاحتوائها على مركبات الزيوت الطيرية ولاكتونات والكانات (9) وكذلك تحتوي على كاربوهيدرات بنسبة 45% وبروتينات (10) بالإضافة لاحتوائها على مواد صابونية (Saponins) ومركبات استروجينية (Phyto-estrogen) (8) والتي تنشط انتاج وافراز الحليب من خلال تأثيرها على هرمون الحليب (البرولاكتين) والدايوجينين (Diosgenin) (8) والذي يعد من المصادر الطبيعية للستيرويدات التي لها دور في زيادة افراز هرمون الاستروجين (11) ،واحتوائها على نسب جيدة من فيتامينات A وB ومواد سكرية كسكر الكالاكتوز والمانوز (12) ،واشارت الدراسات التي ان بذور الحلبة تؤدي الى زيادة انتاج اللحم والحليب عند اضافتها على علائق المجررات (13) اذا ادت اضافتها الى عليةة اناث الماعز بنسبة 20% الى زيادة كمية انتاج الحليب المنتجة

(14) ، اذ تمتلك بذور الحلبة خواص تساهم في رفع كفاءة انتاج الحليب وتحسين نسب مكوناته الكيميائية (15) ، كما استخدمت الحبة السوداء (*Nigella sativa*) لاغراض طبية منها اضافتها الى علانق حيوانات التسمين لغرض زيادة الوزن وتحسين حالتها الصحية ولزيادة انتاجية هذه الحيوانات من اللحم والحليب وتحسين تركيبها الكيميائي اذ انها تحتوي على نسبة جيدة من البروتين الخام تصل لـ 30% (16) وعليه استخدمت في علانق الحيوانات كإضافات عافية لغرض زيادة مستوى البروتين في العلقة وتحسين نوعيته وبالتالي تحسين انتاجية الحيوانات (17) حيث ادت اضافة الحبة السوداء الى علقة الابقار الى زيادة انتاج الحليب (18) وقد اشار (19) الى زيادة انتاج الحليب في الابقار المحلية وتحسين تركيبه الكيميائي بعد اضافة بذور الحبة السوداء الى العلقة بنسبة 5% ، كما ادت اضافتها الى علقة الجاموس الى زيادة انتاج الحليب زيادة نسبتي الدهن والبروتين (20) ، وعليه فان هدف هذه الدراسة هو دراسة تأثير اضافة بذور الحلبة او الحبة السوداء الى علقة انانث الماعز المحلي الاسود في انتاج الحليب وتركيزه الكيميائي.

### **المواد وطرائق العمل**

اجريت هذه التجربة في حقل اهلي كربلاء اذ اخذت 15 من انانث الماعز المحلي الاسود في週الاسبوع الاخير من الحمل (على وشك الولادة ) ، وبعمر 2.5 – 4 سنوات وزوّرت عشوائيا الى ثلاثة مجموعات وبمعدل 5 حيوانات في كل مجموعة ، ووفرت لها العناية الصحية والبيطرية وفق البرنامج الصحي الوقائي المتبعة في المنطقة ، وغذيت باعطاء علف مركز مكون من شعير 37% وحنطة 45% وذرة صفراء 10% وبروتين نباتي 5% وحجر كلس 2% وملح طعام 1% ، وبنسبة بروتين كلی 13.5% (21)، اذ اعطي كل حيوان علف مركز يعادل 2.5% من وزن الجسم بالإضافة للعلف الاخضر والرعى الحر لمدة 3 ساعات يوميا، عدّيت المجموعة الأولى (مجموعة السيطرة C) على هذه العلقة المذكورة انفا بدون اي اضافات ، بينما اضيف الى غذاء المجموعة الثانية (مجموعة المعاملة الأولى T1) بذور الحلبة وبمقدار 90 غم / كغم علف مركز ، واضيف لعلقة المجموعة الثالثة (مجموعة المعاملة الثانية T2) بذور الحبة السوداء وبمقدار 9 غم / كغم علف مركز (لم تتحسب بذور الحلبة والحبة السوداء ضمن مكونات العلف بل اعتبرت اضافات ).

واخذت قياسات الانتاج الكلي للحليب ونسبة الدهن وبروتين الحليب وسكر اللاكتوز والمواد الصلبة الالادئية ابتداءً من شهر بعد الولادة واستمرت لـ 6 اسابيع اذ جمعت عينات الحليب بعزل المواليد عن امهاتها عصراً بعد ان تم حلها حلبة مسانية لتفريغ الصدر و وفي اليوم التالي حلبت الاناث صباحاً ثم وزنت الجداء واطلقت مع امهاتها لمدة نصف ساعة ثم وزنت مرة اخرى لمعرفة كمية الحليب المتناول من قبل المواليد من خلال الفرق بين الوزنين قبل وبعد الرضاعة، ثم اعيدت عملية الحلب واطلاق الجداء عصراً ويحسب الانتاج اليومي للحليب بجمع الحلبين حسبما جاء في (22) وكان الحلب بيديوبا، واخذت عينة من الحلبين الصباحية والمسائية من كل حيوان لغرض التحليل الكيميائي للحليب .

### **التحليل الكيميائي للحليب :**

قدرَت نسبة البروتين الخام في اللباً وذلك بتقدير نسبة النتروجين بطريقة Micro Kjeldahl (23) و ضربت نسبة النتروجين بالمعامل 6.25 للحصول على نسبة البروتين في الحليب، وقدرت النسبة المئوية للدهن في اللباً بإتباع طريقة بابكوك وحسب ما جاء في (24) و ذلك بعزل الدهن بوساطة حامض الكبريتيك تركيز 90% وثم فصل الدهن عن مكونات اللباً بجهاز الطرد المركزي بسرعة 1500 دورة / الدقيقة ولمدة 5 دقائق ثم سجلت نسبة الدهن عن طريق قياس ارتفاع عمود الدهن في قنينة بابكوك مباشرة وقيسَت نسبة المواد الصلبة الكلية (T.S) وذلك بتجفيف عينة معلومة الوزن في فرن التجفيف (Oven) على درجة 105M حيث يؤخذ الوزن عن طريق الفرق بين وزن عينة اللباً قبل التجفيف وبعده وقيسَت نسبة سكر اللاكتوز في اللباً بالطريقة اللونية وحسب ماجاء في (23) .

### **التحليل الاحصائي :**

حللت البيانات احصائياً وفقاً لتصميم برنامج Statistical Analysis System (SAS) (25) وقارنت الفروق بين المجموعات بوساطة اختبار دنكن متعدد الحدود (26)

**النتائج و المناقشة :**

يتبيّن من نتائج الجدول 1 تفوق معنوي ( $P < 0.05$ ) في معدل انتاج الحليب الاسبوعي في كل من مجموعتي المعاملة (T1 و T2) على مجموعة السيطرة.

جدول (1) : المتوسطات  $\pm$  الخطأ القياسي لتأثير المعاملات المدروسة في كمية الحليب المنتجة اسبوعياً/كغم

معاملات التجربة			المدة الزمنية
المجموعة الثالثة بذور الحبة السوداء (T2) N=5	المجموعة الثانية بذور الحبة (T1) N=5	المجموعة الأولى مجموعة السيطرة (C) N=5	
0.91 $\pm$ 3.93 ab	0.90 $\pm$ 5.08 a	0.37 $\pm$ 2.54 b	الأسبوع الأول
0.76 $\pm$ 4.03 ab	1.01 $\pm$ 5.04 a	0.33 $\pm$ 2.45 b	الأسبوع الثاني
0.55 $\pm$ 4.20 a	1.10 $\pm$ 5.42 a	0.30 $\pm$ 2.83 b	الأسبوع الثالث
0.82 $\pm$ 4.91 a	0.90 $\pm$ 5.57 a	0.33 $\pm$ 3.06 b	الأسبوع الرابع
0.71 $\pm$ 4.54 a	1.05 $\pm$ 4.94 a	.28 $\pm$ 2.94 b	الأسبوع الخامس
0.67 $\pm$ 4.08 a	0.87 $\pm$ 4.10 a	0.41 $\pm$ 2.48 a	الأسبوع السادس
0.15 $\pm$ 4.28 a	0.20 $\pm$ 5.01 a	0.23 $\pm$ 2.80 b	معدل الانتاج الكلي

تشير الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد إلى وجود فروق معنوية ( $P < 0.05$ ) بين المجموعات

وقد يرجع سبب تفوق معدل انتاج الحليب الاسبوعي في مجموعة المعاملة الاولى (T1) الى دور بذور الحبة في زيادة افراز هرمون البرولاكتين وهو الهرمون المسؤول عن تكوين وافراز الحليب (8) بالتعاضد مع هرمونات الغدة الدرقية كهرمون التايروكسين الذي يقوم بتحويل ايض المواد الغذائية في الدم الى الضرر لاستخدامه لانتاج وافراز الحليب (27) او قد يعزى السبب الى ارتفاع استهلاك العلف من قبل الحيوانات والذي يؤدي بدوره الى ارتفاع انتاج الحليب (28) و الى دور الحبة في تنشيط الغدة النخامية وتحفيزها على تحرير هرمون البرولاكتين (29) او قد يعود سبب الارتفاع في الانتاج الى وجود مادة الدايبوسيكتين (Diosegenin) القلوية والذي فعله مشابه لفعل هرمون الاستروجين الانثوي لذا فهو يحفز الغدة اللبنية على التطور وانتاج الحليب (30)، ولعل السبب في ذلك قد يعود لاحتواء بذور الحبة على مركبات Phytoestogens وهي مواد كيميائية نباتية تشبه هرمون الاستروجين والذي يعد مفتاح انتاج وافراز الحليب (31)، او قد يرجع السبب الى قدرة الحبة على زيادة افراز هرمون النمو والذى يؤدي بدوره الى زيادة افراز الحليب (32) وهذه النتائج تتوافق مع (33) و(34) الذين اشاروا الى ارتفاع انتاج الحليب معنوياً عند استخدام بذور الحبة بنسبة 25% في علائق الحيوانات المنتجة للحليب ، وكما تتوافق مع ماذكرته (35) حيث لاحظ وجود فروقات معنوية في انتاج الحليب للابقار للابقار المغذاة على علقة تحتوي على بذور الحبة بنسبة 4% وتتوافق مع (14) الذي اشار الى زيادة انتاج الحليب في إناث الماعز المغذاة على علائق اضيفت اليها بذور الحبة بنسبة 20% ، وكذلك تتوافق النتائج مع كل من (36) و(28) و(7) و(33).

اما سبب تفوق معدل الانتاج الاسبوعي للحليب لإناث مجموعه المعاملة الثالثة (T2) على مجموعة السيطرة فيعزى الى بذور الحبة السوداء التي تؤدي اضافتها الى تحسين كفاءة التحويل الغذائي وزيادة استهلاك العلف وبالتالي زيادة انتاج الحليب (19) وهذه النتائج تتوافق مع ماذكره كل من (18) و (37) والذي اشار الى زيادة معدل انتاج الحليب في الابقار العراقية المحلية بعد اضافة الحبة السوداء الى علائقها .

**مستوى دهن الحليب :**

تظهر من نتائج الجدول 2 عدم وجود فروق معنوية بين مجموعات التجربة في مستوى دهن الحليب

جدول (2) : المنشآت  $\pm$  الخطأ القياسي لتاثير المعاملات المدروسة في اثاث الماعز في نسبة دهن الحليب %

معاملات التجربة			المدة الزمنية
المجموعة الثالثة بذور الحبة السوداء (T2) N=5	المجموعة الثانية بذور الحبة (T1) N=5	المجموعة الأولى مجموعة السيطرة (C) N=5	
0.20 $\pm$ 3.97	0.34 $\pm$ 4.02	0.27 $\pm$ 3.76	الأسبوع الأول
0.31 $\pm$ 3.21	0.57 $\pm$ 3.58	0.17 $\pm$ 3.02	الأسبوع الثاني
0.11 $\pm$ 2.58	0.27 $\pm$ 2.36	0.36 $\pm$ 2.38	الأسبوع الثالث
0.16 $\pm$ 2.56	0.21 $\pm$ 2.28	0.29 $\pm$ 2.17	الأسبوع الرابع
0.23 $\pm$ 2.63	0.34 $\pm$ 2.58	0.30 $\pm$ 2.44	الأسبوع الخامس
0.16 $\pm$ 2.62	0.30 $\pm$ 2.24	0.28 $\pm$ 2.60	الأسبوع السادس

بالرغم من التفوق الحسابي لمجموعتي المعاملة الاولى T1 والثالثة T2 على مجموعة السيطرة في بداية التجربة لكن هذا التفوق لم يصل لمستوى المعنوية وهذا يؤيد ماذهب اليه (32) اذ اشار الى عدم وجود فروق معنوية في مستوى دهن الحليب عند اضافة بذور الحبة الى علائق الماعز البالكستاني ،وكذلك ماشار اليه (33) والذي لم يجد فروق معنوية في نسبة دهن الحليب في ابقار الفريزيان المغذاة على علائق اضيفت اليها بذور الحبة بنسبة 4% ، وكذلك توافق ماوصل اليه (38) والذي اشار الى عدم تاثير نسبة دهن الحليب في اثاث الماعز الشامي القبرصي باضافة بذور الحبة على علائقها بنسبة 10% . وتوافق النتائج ايضا مع (19) و (37) الذي اشار الى عدم تاثير مستوى نسبة دهن الحليب في ابقار الحليب المحلية باضافة بذور الحبة السوداء الى العلائق ، ولكن هذه النتائج تتعارض مع ماوصل اليه (20) والذي اشار الى زيادة نسبة دهن الحليب معنوية في الجاموس المغذي على علائق اضيف اليها بذور الحبة السوداء .

**مستوى بروتين الحليب :**

يتبيّن من جدول 3 عدم وجود فروق معنوية بين مجموعات التجربة في مستوى بروتين الحليب

جدول 3: المنشآت  $\pm$  الخطأ القياسي لتاثير المعاملات المدروسة في نسبة بروتين الحليب %

معاملات التجربة			المدة الزمنية
المجموعة الثالثة بذور الحبة السوداء (T2) N=5	المجموعة الثانية بذور الحبة (T1) N=5	المجموعة الأولى مجموعة السيطرة (C) N=5	
0.29 $\pm$ 3.65	0.20 $\pm$ 3.50	0.19 $\pm$ 3.55	الأسبوع الأول
0.17 $\pm$ 3.44	0.14 $\pm$ 3.28	0.10 $\pm$ 3.20	الأسبوع الثاني
0.13 $\pm$ 3.31	0.09 $\pm$ 3.25	0.08 $\pm$ 3.21	الأسبوع الثالث
0.12 $\pm$ 3.33	0.14 $\pm$ 3.23	0.06 $\pm$ 3.22	الأسبوع الرابع
0.11 $\pm$ 3.30	0.09 $\pm$ 3.15	0.08 $\pm$ 3.16	الأسبوع الخامس
0.18 $\pm$ 3.34	0.13 $\pm$ 3.31	0.05 $\pm$ 3.19	الأسبوع السادس

والتالي اعلاه توافق مع ماذكره (6) الذي اشار الى عدم تاثير نسبة بروتين الحليب باضافة بذور الحبة بنسبة 5% و 10% الى علائق اثاث الماعز النبوي ،وكذلك توافق مع (7) و(33) والذي اشار الى عدم تاثير نسبة بروتين الحليب في الابقار المغذاة على علائق اضيفت اليها بذور الحبة بنسبة 4% و 2% ، وكذلك اثبتت هذه النتائج ماوصل اليه (19) و(37) والذي اشار الى عدم تاثير اضافة بذور الحبة السوداء على مستوى نسبة بروتين الحليب في الابقار المحلية ، ولكن هذه النتائج عارضت ماوصل اليه (28) الذي اشار الى ارتفاع معنوي في نسبة بروتين الحليب في اثاث الماعز الشامي القبرصي عند تغذيتها على علائق تحتوي على بذور الحبة .

**مستوى سكر الحليب (اللاكتوز):**

يلاحظ من الجدول 4 عدم وجود فروق معنوية بين مجموعات التجربة في مستوى سكر الحليب (اللاكتوز) .

جدول 4 : المتوسطات  $\pm$  الخطأ القياسي لتاثير المعاملات في نسبة سكر الحليب (اللاكتوز) %

معاملات التجربة			المدة الزمنية
المجموعة الثالثة بنور الحبة السوداء(T2) N=5	المجموعة الثانية بنور الحلبة (T1) N=5	المجموعة الأولى مجموعة السيطرة (C) N=5	
0.13 $\pm$ 4.29	0.19 $\pm$ 4.33	0.37 $\pm$ 4.09	الأسبوع الأول
0.26 $\pm$ 4.52	0.18 $\pm$ 4.64	0.17 $\pm$ 4.57	الأسبوع الثاني
0.17 $\pm$ 4.55	0.15 $\pm$ 4.61	0.16 $\pm$ 4.57	الأسبوع الثالث
0.18 $\pm$ 4.56	0.14 $\pm$ 4.47	0.13 $\pm$ 4.51	الأسبوع الرابع
0.16 $\pm$ 4.51	0.13 $\pm$ 4.32	0.23 $\pm$ 4.30	الأسبوع الخامس
0.09 $\pm$ 4.28	0.13 $\pm$ 4.49	0.16 $\pm$ 4.59	الأسبوع السادس

وكما يلاحظ من الجدول اعلاه لم يكن هناك تأثير معنوي لبنور الحلبة ولا لبنور الحبة السوداء على مستوى سكر الحليب (اللاكتوز) وهذا يؤيد ما توصل اليه (6) و(33) و(38) والذين اشاروا الى عدم تأثير مستوى سكر الحليب في اثاث الماعز الشامي القبرصي بعد اضافة بنور الحلبة الى عليقتها، وكذلك يتوافق مع ما ذكره كل من (19) و(37) و(20) والذي اشار الى عدم تأثير اضافة بنور الحبة السوداء الى عليقة الجاموس في مستوى سكر الحليب .

**مستوى المواد الصلبة الدهنية :**

لم يكن هناك اي فرق معنوي بين معاملات التجربة في نسبة المواد الصلبة الدهنية في الحليب كما يتضح من جدول 5 .

جدول 5 : المتوسطات  $\pm$  الخطأ القياسي لتاثير المعاملات المدروسة في نسبة المواد الصلبة الدهنية (snf) %

معاملات التجربة			المدة الزمنية
المجموعة الثالثة بنور الحبة السوداء(T2) N=5	المجموعة الثانية بنور الحلبة (T1) N=5	المجموعة الأولى مجموعة السيطرة (C) N=5	
0.37 $\pm$ 9.22	0.45 $\pm$ 9.09	0.40 $\pm$ 8.84	الأسبوع الأول
0.20 $\pm$ 8.45	0.23 $\pm$ 8.38	0.24 $\pm$ 8.60	الأسبوع الثاني
0.19 $\pm$ 8.39	0.21 $\pm$ 8.49	0.23 $\pm$ 8.43	الأسبوع الثالث
0.16 $\pm$ 8.26	0.16 $\pm$ 8.26	0.24 $\pm$ 8.14	الأسبوع الرابع
0.11 $\pm$ 8.30	0.10 $\pm$ 8.16	0.12 $\pm$ 8.20	الأسبوع الخامس
0.14 $\pm$ 8.23	0.07 $\pm$ 8.17	0.10 $\pm$ 8.10	الأسبوع السادس

لم تؤثر اضافة بنور الحلبة معنويا في نسبة المواد الصلبة الدهنية في الحليب وهذه النتائج توافق ما ذهب اليه (6) و(33) و(7) والذي اشار الى عدم تغير نسبة المواد الصلبة الدهنية معنويًا في حليب الابقار المغذاة على بنور الحلبة، وكذلك لم تؤثر اضافة بنور الحبة السوداء في نسبة المواد الصلبة الدهنية وهذا يوافق ما ذكره (37) و(19) و(20) والذي اشار الى عدم تأثير اضافة بنور الحبة السوداء في نسبة المواد الصلبة الدهنية في حليب الجاموس.

**المصادر :**

- 1-Wilkinson,J.M. and Stark,B.A.(1987).Commercial Goat production 1 st Ed.Professional Books.
- 2- **Abdel- Aziz ,M.(2010)**.Present status of the world goat population andtheir productive .Lohman.informantion ,V45(2):42-52
- 3- **Haenlein ,G.F.W.(2004)**.Goat milk in human nutrition . Small ruminant Res.,51:155-163.  
4-الجهاز المركزي للإحصاء (2008). قسم الإحصاء دائرة التخطيط والمتابعة، وزارة الزراعة.
- 5-**Reeder ,C.L.LeGrand,A. and Connor-Von ,S.(2013)** : The effect of fenugreek on milk production and prolactine levels in mother of preterm infants .clinical lactation 4(4) : 159-165.
- 6-**Balgees,A. Naha,M.Rahmalla,s.A.,Amasiab,E.O.and Mahala ,A.G .(2013):** Effect of fenugreek seeds supplementation on feed intake ,some metabolic hormones profile milk yield and composition of nubian goat,Res.J. Ani. Sci 7(1):p 1-5
- 7 - ناصر، عدنان خضر . شمس الدين، قصي زكي . عبو، نادر يوسف (2013) : استخدام مسحوق بنور الحلبة كإضافات غذائية في علائق تلايقار الشرايبة المحلية وتاثيرها في انتاج الحليب وتركيزه الكيميائي . المجلة العراقية للعلوم البيطرية . المجلد 27 العدد 1 . الصفحات : 21-26 .
- 8 - النوبي، فرجات الدسوقي . جمال الدين ، عبد الرحيم . محمد، حلمي سالم (2002) : الهرمونات و الغدد الصماء كلية الزراعة جامعة الاسكندرية .
- 9-**Max,B.(1992):** This and that:the essential pharmacology of herbs and spicse .trends pharmacol.Sci.,13:p 15-20.
- 10-**Ali,A.A.,Abusayeed,A.,alam,M.S.,Yerasmin,M.S.,Khan,A.M and Muhamad ,I.I.(2012):** characteristics of oil and nutrient contents of nigella sativa linu and trigonella –Graecum seeds .Bull .chem.soc.Ethiop. 26(1): p56-64.
- 11-**Hemavathy,J., and Prabhakar ,J.V.(1989):** Lipid dcomposition of fenugreek seeds.food.chem. 31: p 1-7
- 12- **Garti,N.,Madar.Z.,Aserin,A. And Stevnheim,B.(1997):** Fenugreek galactomannos as food emulsifier ,Tec.food. Sci. 30 (3) :p305-311.
- 13-**Acharya,S.N.Thomas,J.E., and Basu,S.K.(2008) :** Fenugreek an ahernative crop for semiarid Regions of north america crop ,Sci, 48 : p 841-853.
- 14- **Al-Saiady ,M.y.,Al- shaikh, M.A,Mogawer,H.H.,Al Mufarrey,S.I and Kridees ,M.S.(2007);** Effect of feeding different level of fenugreek seeds on milk yield, milk fat, and some Blood hematoloy and chemistry of Ardi Goat.J.saudi Soc.for Agric. Sci. Vol 6 no 2: p41-46.
- 15-**Salah ,A.A.(2000):** Effect of fenugreek seeds as afeed additive on sheep performance in the north western coast of egypt. 11<sup>th</sup> conf. Egyptian Soc. Anim.pro.alex, Egypt, 6-9 :p 321-325.
- 16-**Ali,M.M.(2003):** Performance of lambs fed diets containining different proportions of nigella sativa meal (Msc.thesis),fac.of Agric.Mansoura.Unvi.
- 17-**El-Ayek,M.Y.,Gaber,A.A. and Meherz,A.Z.(1999) :**Influence of sustituting concentrate feed mixture by nigella sativa meal on :animal performance and carcass traits,/egyptian ,J.of nutri. feeds special issue: p 265-277.
- 18-**El-Gaafrawy,A.M.,Zaki,A.A.,Enas,A.A.,Elsedty,R. And El-Ekhnawy ,k.H (2003) :**Effect of feeding nigella sativa cake on digestibility nutritive value and reproductive preformance of friesian cows and immune activity of their offspring .Egyptian ,J.Nutr.feeds ,Specail issue : p 549-539.
- 19-ناصر ، عدنان خضر . عبد الله، نور الدين . عبو ، نادر يوسف . (2009) : تأثير اضافة كسبة الجبة السوداء الى علائقة الابقار المحلية في انتاج الحليب ومكوناته ومعامل هضم المركبات الغذائية فيها ، المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 23، العدد 1، الصفحات 47-53 .
- 20-**Khattab,H.M.,El-Basiony,A.Z.,Hamdy,S.M and Marwan,A.A.(2013) :**Immune Responce and productive performance of dairy Buffaloes and their offspring supplemented with Black seed oil .Iranin of applied anim.Sci. 1(4):227-234.

- 21- خواجه، علي كاظم.البياتي ؛ الهمام عبد الله، و متى ؛ سمير عبد الأحد. (1978). الترکیب الكیمیاوی والقیمة الغذائیة لمواد العلف العراقیة،وزارة الزراعة،مدیریة الثروة الحیوانیة العامة،قسم التغذیة.
- 22-Hadji panayiotou,M. And Louca,A.(1976) : The effect of partial sukling on lactation performance of chios sheep and Damascus Goats and the growth rate of lambs and Kids .J.Agric.Sci.Camb. 87: 15-20.
- 23- A.O.A.C. ( 1975). Officials Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemists. 12<sup>th</sup>.ed. Washington D.C.USA.
- 24- American Public Health Association ( 1978). Standard Method for the Examination of Dairy Products. American . Public Health Association., Washington, D. C. USA.
- 25--Statistical analysis system (2012). User guide for personal computers .SA S Institute Inc. Cam,N.C., USA .
- 26- Duncan,B.D.(1955). Multiplerange and multiple F.test .Biometrics ,11:1-42.
- 27-Issi,M.Gul,Y. And Basbug,O.(2011):the effect of classical theileriosis treatment on thyroid hormone level in cattle naturally infected with theileria annulata,Asian ,j.Anim.Vet.Adr.6: 531- 536.
- 28-Samia,A.A.,Sania,A.I.,Kamal,S.,Abdelkaling,M.,Khder,S.I.and Barsham ,M.A.(2012) : Effect of oral administration of Trigonella foenum on galactogoue body weight and hormonal level insudanse desert sheep. J.of Pharma. And biomedical .Sci .22(22): 1-4.
- 29-Basha,L.A.,Rokaya,M.,Hussein,M.Badawi,M,abdalla,A.M.(1987):the influence of Trigonella foenum qraecum on prolactine relase in female albino rats during different phase of reproductive life J .Durg.Res. Egypt. 17 : 1-12.
- 30- الطاني ،غزوان قاسم حسن (2005) :تأثير الانثيقون في صفات النمو ومكونات حاصل نبات الحلبة (رسالة ماجستير ) كلية العلوم – جامعة الموصل .
- 31-Tiran,D.,(2003):The use of fenugreek for breast feeding women complement, the Nurs.Midwifery. 9:155-156.
- 33-Mohammed,A.A., and Ghazi,F.B.(2005) : feeding effects of fenugreek seeds on lactation performance some plasma constituents and growth hormone level in goat pakistan .J.of biological Sci. 8(4):1553-1556.
- 33 – الحافظ ، ماهر عبد القادر و الشعار ،نادية محمد بشير (2012) :تأثير استخدام بذور الحلبة في انتاج الحليب ومكوناته لابقار الفريزيان المحلية. مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية .مجلد 12 ، العدد 4 ،الصفحات : 41-46 .
- 34- Al-shaikh,M.A.,Al-Mufarrej, S.I. and Mogawer,H.H.(1999): Effect of fenugreek seeds on lactation performance of dairy Goat .J. Appl.Anim. Res. 16: 177-183.
- 35 – الشعار ،نادية محمد بشير (2009) : تأثير استخدام بذور الحلبة في انتاج الحليب ومكوناته وبعض خواص الدم في ابقار الفريزيان المحلية .رسالة ماجستير .كلية الزراعة والغابات – الموصل .
- 36-Allam,M.,El-Hosseing,S.,Abde-gowad ,A.M.,El-Saadany,S.A. and Zeid ,A.M.(1999) : Medicinal herds and plants as sfeed additive on Zeraibi performance .Egyptian .J.Nutr.and feeds 2: 249-265.
- 37- ناصر ، عدنان خضر،نور الدين محمود و عبو ، نادر يوسف (2012) : تقييم لاضافة كسبة الحبة السوداء الى علايق الابقار المحلية على انتاج الحليب ومكوناته ومعامل هضم المواد الغذائية .مجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية ، المجلد 3 ،العدد 2 ،الصفحات 52-63 .
- 38 – القدسی ، ناطق حميد ، طه ،صادق علي ، عبد الستار ،وفاء حميد وخليل ،نزار اسماعيل (2011) : اضافة نسب مختلفة من بذور الحلبة الى العليةة وتاثير ذلك على انتاج الحليب ومكوناته وبعض مكونات الدم في الماعز الشامي القبرصي .مجلة الانبار للعلوم البيطرية . مجلد 4 ،العدد 2 الصفحات : 137-143 .