

Survey and diagnostic insect parasites that infect the pupa of house flies *Musca domestica* Linn. (Diptera:Muscidae) in some region of Karbala

مسح و تشخيص المتطفلات الحشرية التي تصيب عذاري الذباب المنزلي *Musca domestica* Linn. (Diptera:Muscidae) في بعض مناطق محافظة كربلاء

* حيدر نعيم محمد الاشبيل رايد عباس العيسى محمد صالح عبد الرسول
جامعة كربلاء/ كلية التربية للعلوم الصرفة
البريد الالكتروني: Alashbal.haider@gmail.com / موبايل: 07811995996
* بحث مستنـى لـباحثـ الاول

الخلاصة:

هدف البحث الى مسح وتشخيص الطفيلييات التي تصيب عذاري الذباب المنزلي *Musca domestica* L. في بعض مناطق محافظة كربلاء لمدة من الاول من كانون الاول 2013 حتى نهاية حزيران 2014 في كل من ناحية الحسينية و الحر ومنطقة خان الرابع والسوادة والشريعة. جمعت عينات من عذاري الذباب المنزلي من فضلات الدواجن واكواخ النفايات المتراكمة وتم وضع كل عذراء داخل كبسولة جيلاتينية لحين بزوغها للحصول على بالغات الطفيلييات اذ تعد خارجية التطفل (ectoparaste)، صممت مفاتيح تصنيفية التشخيص، وفي هذه الدراسة تم وصف باللغات الطفيلييات بشكل كامل لجميع اجزاء الجسم المظهرية من خلال الاشكال والصور التوضيحية. وتم خلال هذه الدراسة تسجيل اربع انواع تقع ضمن ثلاثة اجناس وهي: *Muscidifurax raptor*, *Nasonia vitripennis*, *Spalangia endius*, *Spalangia nigroaenea* تعود الى عائلة pteromalidae ورتبة غشائية الاجنحة. بينت النتائج ان اعلى قيمة درجة توزيع افراد الانواع الـ (Evenness) كانت للنوع *Spalangia endius* اذ بلغت (0.60) في حين اقل قيمة بلغت (0.13) في النوع *Nasonia vitripennis* ، وان النسبة المئوية الكلية للتطفل كانت 7% . كما اوضحت النتائج ان اعلى قيمة لنسبة توافر الانواع (Richness) بلغ 1.6% في منطقة خان الرابع اما اقل قيمة فكانت متساوية بين منطقتي الحسينية والسوادة والتي بلغت 0.83% .

Abstract:

The research aims to scan and diagnose parasites that infect pupa houseflies *Musca domestica* L. in some areas of the province of Karbala Governorate for the duration of the first of December 2013 until the end of June 2014 in each of the Husseiniya region , Al-Hur, Khan Al-Robaa , Alsoadh and Sharia.The samples were collected from pupa houseflies from poultry waste and piles of accumulated waste and was putting all pupa within the gelatin capsule until the its emergence for adult parasites, and classified as a external parasite (ectoparaste), taxonomic keys will designed to diagnosis.A completely adult parasites were described in this study to all parts of the body morphometric through figure and illustrations. Four Species from within three Genous were recorded during this study and they were: *Muscidifurax raptor*, *Nasonia vitripennis*, *Spalangia endius*, *Spalangia nigroaenea* belonging to the family pteromalidae: Hymenoptera Order. The results showed that the highest value of the degree distribution of species members (Evenness) was *Spalangia endius*, and amounting to (0.60), while the lowest value reached to (0.13) in the *Nasonia vitripennis*, and the total percentage of parasitism was 7%. The results showed that the highest value for the ratio of the availability of the species (Richness) reached at 1.6% in the Khan Al-Robaa region. The lowest value 0.83% was recorded in Husseiniay and Alsoadh regions.

المقدمة

تعد الذبابة المنزلية *L. Musca domestica* (Diptera:Muscidae) من الحشرات المهمة طيباً وبيطرياً واقتصادياً لأنثرها المباشر في صحة الإنسان وحيواناته لحملها أكثر من مئة مسبب مرضي (1) وبالإضافة إلى أنها تنقل بعض الامراض المقاومة لفعل المضادات الحيوية (2)، تعيش هذه الذبابة في أوساط غنية باليكروبات المؤثرة في نمو وتطور الأدوار غير البالغة (3). كما إنها تسبب الكثير من الإزعاج للإنسان والحيوان . ولسيطرة على الذباب المنزلي غالباً ما يعتمد على المبيدات الكيميائية الحشرية بشكل واسع وقد استخدمت مركبات الفوسفات العضوية organophosphates والبایریثروید pyrethroids لمكافحة الذباب المنزلي في العديد من البلدان (5)(6). لكن الاستخدام المتزايد للمبيدات أدى إلى ظهور العديد من المشاكل منها ظهور المقاومة للمبيدات الحشرية ، والتلوث البيئي، لذلك اجريت العديد من البحوث واسعة النطاق للعثور على البديل المناسب التي يمكن ادراجها ضمن الادارة المتكاملة للأفات(7) (8). ان المقاومة الاحيائية للذباب المنزلي باستخدام المتطفلات الحشرية تم استعمالها بشكل تطبيقي في موقع مختلف من العالم وذلك من أجل السيطرة على انتشار الذباب المنزلي(9) حيث يقدم نظام المكافحة الاحيائية استراتيجية جيدة في تقليل التكاليف الكلية لإدارة مكافحة الأفات (10) (11). تعد الحشرات الطفيلية كعوامل مدمرة للذباب المنزلي والتي يكون انتشارها عالمياً وخاصة الزنابير الطفيليّة التابعة إلى عائلة Pteromalidae (Pteromalidae) من رتبة غشائية الاجنة لاسيما التابع لجنس *Spalangia* الذي يعد كأحد عوامل السيطرة الاحيائية على الذباب المنزلي في غالبية أنحاء العالم (12). لذلك فقد استهدفت الدراسة الحالية إلى حصر وتشخيص أنواع الحشرات الطفيليّة التي تتغذى على عذاري الذباب المنزلي *Musca domestica L.* في بعض مناطق كربلاء وتضمنت الدراسة المحاور الآتية : تشخيص أنواع الحشرات في بعض مناطق كربلاء المتطفلة على عذاري الذباب المنزلي *M. domestica* ، تصميم مفاتيح تصنيفية لمتطفلات عذاري الذباب المنزلي *M. domestica* على مستوى الجنس والنوع. وصف أنواع المتطفلات الحشرية لعذاري الذباب المنزلي *M. domestica* وأماكن تواجدها في بعض مناطق كربلاء.

المواد وطرق العمل

جمعت عذاري الذباب المنزلي من مناطق مختلفة في محافظة كربلاء وهي (ناحية الحسينية، ناحية الحر، منطقة خان الربع، منطقة السوادة ومنطقة الشريعة) من أماكن تجمع النفايات واماكن تربية الدواجن حيث تكون طبيعة التربة طينية رطبة. استمرت مدة الجمع من بداية كانون الأول 2013 وحتى نهاية حزيران 2014 وبواقع مرتبين/شهر في كل مرة تؤخذ 1 كغم من التربة التي تحتوي على فضلات الحيوانات اذ تجمع من خمس أماكن متفرقة من كل موقع وفي المختبر عزلت عذاري الذباب المنزلي وذلك استناداً إلى وجود زوج من الثغور التنسجية تشبه الحرف- D - حيث تحاط من الداخل بثلاث شقوف تفصيه spiracular. كما يمكن مشاهدة انتفاخ واضح في موقع مركزي من الجانب الداخلي للثغور (13). اذ تتوضع كل عذراء داخل كبسولة جيلاتينية فارغة و تتوضع داخل اطباق ضمن درجة حرارة الغرفة حسب مناطق الجمع وترافق يومياً لغاية بزوغ بالغات الذباب او بالغات الطفيلي يتم بعد ذلك عزل المتطفل لأغراض التصنيف .

الدراسة المظهرية للفيقي :

تم وصف بالغات الطفيلي (ذكور وإناث) باستخدام مجهر التسريح الضوئي من خلال فحص كامل للحشرة تحت المجهر اذ يتم قتل الحشرات المعدة للفحص باستخدام قبضة القتل ومن ثم نضعها في الكحول الأثيلي بتركيز 70% . وعند الحاجة إلى توضيح الصفات الدقيقة لأعضاء الجسم المختلفة كالرأس والأرجل والأجنحة بعد إزالة هذه الأعضاء الخارجية من الحشرات باستعمال ابر تشيرج دقيقة الطرف ثم تنتقل إلى محلول هيدروكسيد البوتاسيوم (KOH) تركيز 10% وترك لمنطقة 2 ساعة اذ يتم خلال هذه الفترة إزالة بعض الأنسجة وفضلات الانسجة العالقة باستخدام الإبر الخاصة تحت المجهر عند نظافة الأجزاء جيداً تم غسلها بواسطة غمسها في حامض الخليك الثلجي Glacial acetic acid تركيز 15% ولمدة 10 دقيقة. ثم بعد ذلك تم تقسيم أجزاء الحشرة إلى مجموعتين حسب الحاجة إلى تحميلاً على شرائح دائميه أو عدم الحاجة إلى ذلك. اذ شملت المجموعة الأولى الرأس واللوامس وتم عمل شرائح دائمية لها حسب (14). فضلاً عن ذلك صورت الشرائح بمجهز حديثاً خاص (Dinocapture) مركب على حامل تم صناعته يدوياً متصل بشاشة عرض خاصة ملقطة بالمنظومة ومتصل بالحاسوب الالكتروني من خلال برنامج خاص محملاً على الحاسوب. أما المجموعة الثانية والتي شملت لواحق الصدر (الأجنحة والأرجل) والبطن فقد تم تصويرها بعد وضعها على شرائح زجاجية وبالطريقة ذاتها التققط صور مباشرة دون الحاجة إلى عمل سلايدات دائمية وذلك لعدم وضوح بعض المعالم مثل العروق في الأجنحة او لتكسر بعضها مثل الرأس والصدر أثناء تحميلاًها على الشرائح الزجاجية .

حساب نسبة توافر انواع المتطفلات ونسبة تواجدها:

حيث تم حساب نسبة توافر انواع المتطفلات Richness لكل موقع من مواقع الدراسة المشار إليها افنا والتي هي عبارة عن \sqrt{n} / S اذ ان S يمثل عدد الانواع الكلي للمتطفلات و n يمثل عدد الافراد الكلي لها ولكل نوع احتسبت نسبة توافر الانواع Evenness والتي هي عبارة عن عدد افراد ذلك النوع من المتطفل مقسوماً على العدد الكلي للمتطفلات التي تم جمعها في ذلك الموقع (15).

النتائج والمناقشة:

اشارت النتائج الواردة في جدول (1) الى اختلاف في معدل اعداد عذاري الذباب المنزلي التي تم جمعها من مناطق مختلفة في محافظة كربلاء حيث لوحظ ان اعلى عدد للعذاري تم جمعه من منطقة الحسينية اذ بلغ 253 عذراء في حين بلغ اقل عدد للعذاري هو 100 عذراء في منطقة خان الرابع وهذا قد يعود الى كثرة حقول الدواجن في منطقة الحسينية وكذلك فأن معظم هذه الحقول هي حقول منزليه وليس رسميه مما يؤدي الى قلة الاهتمام بالنظافة والإجراءات الصحية الأخرى ، اما في منطقة السواد، الشريعة والحر فقد تراوحت اعداد العذاري التي تم جمعها (100_180) عذراء ،من ناحية اخرى يتضح من الجدول ذاته ان معدل النسبة المئوية للتنفل قد اختلف بين المناطق حيث بلغت اعلى نسبة للتنفل 9.09 في منطقة الحسينية و 8 % في منطقة خان الرابع وهذا انعكس وبشكل واضح في قيمة توافر الانواع اذ بلغت 1.06، قد يعزى ذلك الى ان هذه المنطقة من المناطق المعزلة نوعا ما والتي تمتاز بقلة استعمال المواد الكيميائية في المكافحة سواء مكافحة الحشرات الطبية او الافات الزراعية .وائل نسبة للتنفل ظهرت في منطقة الشريعة وبلغت 3.44 % وتم الحصول فقط على خمسة متطلفات تعود لنوعين تابعين لجنس واحد (*Spalangia*) حيث امتازت منطقة الشريعة بكثرة المزارع وبالمقابل كثرة استعمال الكيميائيات مما قد يكون له تأثير في اعداد العذاري والمتطلفات وتظهر النتائج ان اعلى نسبة لتوافر الانواع ظهرت في منطقة خان الرابع اذ بلغت 1.06 اما في منطقة الحسينية، الحر، السواد، الشريعة فكانت هذه القيمة متقاربة نوعا ما تراوحت (0.83-0.9) بالم مقابل فان اعلى عدد من انواع المتطلفات تم جمعه في منطقة الحسينية اذ بلغت اربع انواع بسبب وفرة وتنوع العطاء النباتي على العكس مما لوحظ في منطقة الشريعة.ووجدت حالات تواجد اكتر من طفيل في عذراء واحد في نوع *N.vitripennis* ، وجاءت هذه النتائج متتفقة مع ما توصل اليه (16) اذ وجدوا ان النسبة المئوية للتنفل بلغت 0.6 % في محافظة بغداد علما ان دراستهم استمرت لمدة ثلاثة سنوات.

جدول (1) : أنواع المتطلفات ودرجة تواجدها في مناطق مختلفة في محافظة كربلاء

المنطقة	اعداد العذاري الكلي	اعداد العذاري المئوية	اعداد المتطلفات	النسبة المئوية للتنفل	أنواع المتطلفات وعدد كل واحد منها	نسبة تواجد الانواع Evenness	تواتر الانواع Community Richness
الحر	149	52	11	7.38	<i>S.endius</i> 5 <i>S.nigraenea</i> 5 <i>M.raptor</i> 1	0.45 0.45 0.09	0.9
	253	90	23	9.09	<i>S.endius</i> 11 <i>S.nigraenea</i> 8 <i>M.raptor</i> 1 <i>N.vitripennis</i> 3	0.35 0.48 0.04 0.13	0.83
	100	33	8	8.00	<i>S.endius</i> 3 <i>S.nigraenea</i> 2 <i>M.raptor</i> 3	0.38 0.25 0.38	1.06
الحسينية	180	58	13	7.22	<i>S.endius</i> 4 <i>S.nigraenea</i> 5 <i>M.raptor</i> 4	0.31 0.38 0.31	0.83
	145	62	5	3.44	<i>S.endius</i> 3 <i>S.nigraenea</i> 2	0.6 0.4	0.89

مفتاح تصنيفي لتحت عائلة Pteromalina

- اللامس يكون طويل ونحيف ويكون من 13 قطعة ويحتوي على واحد أو أكثر من القطع الحلقة *Anellus* اما الهراءة Club تكون من ثلاثة قطع ، سوط الذكر يكون محزز.....2.....
- الرأس والصدر ذات ألوان معدنية مصفرة مع وجود شعيرات متبايرة على أجزاء الجسم بشكل غير منتظم ظهر الصدر الأمامي لا يشبه الجرس بل يكون متطاول وذو نهاية مستدقه من الحافة الملاصقة الدرع الوسطي حيث يحتوي الأخير على تجويف or paraspidal notauli غير كامل يضيق من نهايته ويفصل الدرع الى ثلاثة أقسام يطلق على هذا التجويف 3.....paraspidal grooves
- الجنح كامل النمو العرق الحافي قصير لا يمتد طويلا ، البطن متصلة بالصدر بشكل مباشر ، الإبطين *Axillae* تنمو بشكل مميز إلى الأمامPteromalinae

4-1-2: مفتاح تصنيفي لأجناس وأنواع Pteromalinae

- 1 بداية الفخذ غير متضخمة ، في حالات نادرة ظهر الصدر الامامي يكون قصير ،الجناح لا يحتوي على بقع وعروق طولية.....2
- 2 A العرق الحافي قصير.....3
- 3 B العرق الحافي طويل الى حد ما.....8
- 3 الجناح لا يحتوي على بقع والعرق الحافي اطول من العرق بعد الحافي. نهاية الساق يبرز منها شوكة واحدة Spur 4.....
- 4 العرق الحافي يكون عريض من القاعدة الى المنتصف ويضيق من نهايته5
- 5 A- يحتوي لامس الانثى على قطعة حلقة واحدة Anellus اما منطقة Funicular تحتوي سبعة قطع أما الذكر فيحتوي على قطعتين حلقيتين اما منطقة Funicular تحتوي على ستة قطع فقط ، طوق ظهر الصدر الامامي Pronotum ذو حواف مستدقهMuscidifurax Girault and Sanders
- B- الاصل والعدن يكون ذو لونبني مصفر والسوط اسود اللون يحتوي على شعيرات حسية طويلة في الذكر أما الانثى تكون قصيرة القطعة الاولى من السوط flagellum تكون خالية من الشعيرات الحسية6
- 6 المنطقة الحلقة annular area تكون من حلقة واحدة في الانثى وحلقتين في الذكر7
- 7 الجسم ذو لون قزحي في الذكر اما الانثى فتكون ذا لون اسود مخضرMuscidifurax raptor
- 8 نهاية الساق تحتوي على شوكة واحدة Spur ظهر الصدر الامامي Pronotum في كثير من الأحيان أضيق مقارنة مع ظهر الصدر الوسطي9
- 9 حافة الفم لا تحتوي على نتوءات او اسنان ، الصدر غير مستوي ولا يحتوي على نتوءات حادة ، البطن تتصل بالصدر بدون ساق10
- 10 الهراء Club تكون ذات نهاية غير حادة وفي حالات مشكوك بها يوجد ت الخضر مع طيات مميزة11
- 11 الرأس والصدر يكون ناعم شبكي يشبه الجلد المتشقق، غير لامع ،اللامس يحتوي على قطعتين حلقيتين Anille ،قطع Funicular مختلفة ، حافة الجناح الامامي لا تحتوي على شراسيب12 Nasonia Ashmead
- 12 A- في الذكر الامس ذو لون اصفر13
- B- في الانثى الامس ذو لونبني14
- 13 الجناح الامامي قصير ، الطول اكبر من العرض بحوالى ثلث مرات الاصل scape مغزلي الشكل في المنظر الجانبي ، hamal pedicel يكون اطول من القطعة الحلقة الاولى من قطع FunicularN.vitripennis
- 14 الجناح الامامي الطول اكبر من العرض بحوالى مرة واحدة ، عرق البقعة الجناحية متراوحة ،ويحتوي على العديد من الشعيرات ، على طول سطحه الخارجي ، الاصل scape مغزلي الشكل من المنظر الجانبي ، hamal pedical يكون اطول من القطعة الاولى من قطع Funicular(17)(18) N.vitripennis


مفتاح تصنيفي تحت عائلة Spalangiinae

- 1- الجسم باستثناء الساقينبني إلى اسود بشكل موحد دون بريق معدني واضح ،يحتوي الجسم على شعيرات تبرز من داخل حفر ويختلف عددها وانتشارها حسب النوع.....2
- 2- اللوامس تكون ملامسة للفم ولا تحتوي على قطع حلقة Anillus ، وجزئ الى عشر قطع تكون القطع متباعدة قليلا في الشكل الهراء Clup تكون من قطعة واحدة ، اما الحلقة القاعدية ف تكون مدوره3
- 3- التجويف Parapsidal groove يكون كامل النمو ، البطن تتصل بالصدر بواسطة سويق Ptiolat ، الاجنحة تكون كاملة النمو او النتطورSpalangiina.....


مفتاح تصنيفي لأنواع جنس Spalangia

- 1- السويق متراوحة انبوبية الشكل يحتوي على تعرجات تمتد طوليابشكل منتظم ، يوجد على جدار الجسم شعيرات تنشأ من ثقوب على شكل حفر واضحة ، الاجنحة تمتد الى نهاية البطنSpalangia Latreille1805
- 2- ظهر الصدر الامامي يكون على شكل صدفه معزولة بسلسلة من الثغور او الثقوب Cross-line من جهة الحافة الامامية له أما سطح الطوق فيكون ناعم مع وجود حفر منتشرة التي تبرز منها الشعيرات3
- 3- A طوق ظهر الصدر الامامي يتحدد من الخلف بواسطة أخدود ضيق على شكل حافة متعرجة Ridge-likeRidge-like4
- B طوق ظهر الصدر الامامي لا يتحدد من الخلف بواسطة أخدود ضيق على شكل حافة متعرجة RidgeRidge5
- 4- الطوق شبه خماسي ويمكن تميزه بسهولة من خلال النظر الى المنطقة المحصوره بين الحافة المتعرجة من الخلف وسلسلة الثغور Cross-line من الامام ،في الاناث تكون قطع Funicle متراوحة والرأس على شكل مستطيل تقريباspalangia nigroaenea Curtis 1839
- 5- الجزء الامامي الجانبي من الطوق يشبه السرة المنقطة مع وجود مساحات تاعمة او ملساء متقاربة او متباude6


6- الطوق شبه كروي م Cobb مع وجود خط احيانا مقوس يشبه الحافة ، يحتوي على ثغور متفرقة بانتظام أو منتشرة وتكون كبيرة في الغالب ، في الاناث تكون قطع Funicle منطولة فليلاً أما في الذكور فتكون مربعة *Spalangia endius* (19) . walker1839




شكل (1) منظر أمامي للرأس *M.raptor* -X 180




شكل (2) - اللوامس *M.raptor* X 180



شكل (3) الصدر (منظر ظهري) *M.raptor* X 180



شكل (4) الجناح الامامي *M.raptor* X 180



شكل (5) الجناح الخلفي *M.raptor* X 180



شكل(7) الرجل الوسطى
شكل(8) الرجل الخلفية
(منظر خارجي) *M.raptor* X 180

شكل (6) الرجل الامامية



شكل (10) بطن ♀ *M.raptor* X180 ♀



شكل (9) بطن ♂ *M.raptor* X 180 ♂



صورة(1) منظر جانبي ♂
M.raptor X 180 ♂



صورة (2) منظر جانبي ♂
M.raptor X 180 ♂



صورة-(3)- منظر بطني ♀
صورة-(4)- منظر ظاهري ♀
Nsonia vitripennis X 180




صورة-(5)- منظر جانبي ♂
N.vitripennis X 180



صورة-(6)- منظر ظاهري ♂
N.vitripennis X 180




شكل-(11)- الرجل الخلفية *N.vitripennis* X 180




شكل-(13)- الرجل الوسطى
N.vitripennis X 180


شكل-(12)- الرجل الامامية




شكل-(14)- اللوامس *N.vitripennis* Antennae



شكل-(15)- الجناح الامامي في *N.vitripennis* X 180




شكل-(16)- الجنح الخلفي في *N.vitripennis* X 180




شكل-(17)- الصدر في ♀ *N.vitripennis* X 180




شكل-(18)- البطن في ♀ *N.vitripennis* X 180




شكل-(19)- منظر ظهري *Spalangia endius* X 180



شكل -(20)- منظر ظهري *X180* *Spalangia endius*




شكل -(21)- ♂ قرون الاستشعار اللوامس *Spalangia endius* *X 180* ♂




شكل-(22)- اجزاء الرجل النموذجية. *X 180 Spalangia sp.*



شكل-(23)- الرجل الخلفية شكل-(24)- الرجل الوسطى شكل-(25)- الرجل الامامية
الارجل الامامية والخلفية والوسطى في *Spalangia sp.* X 180



شكل-(26)- الجناح الامامي في X 180 *Spalangia sp.*



شكل-(27)- الجناح الخلفي في X 180 *Spalangia sp.*



شكل - (28)- بطن ♂
شكل - (29)- بطن ♀
منظر ظهري للبطن في $Spalangia\ sp.$ X 180



صورة - (7)- منظر جانبي ♂ في $S.endius$ X 180



صورة-(8)- منظر جانبي ♀ في X 180 *S. endius*



صورة-(9)- منظر جانبي ♂ في X 180 *S. nigroaenea*



صور-(10)- منظر جانبي للأنثى في X 180 *S. nigroaenea*

المصادر:

- 1- Greenberg, B. (1965). Flies and diseases. *Scientific American*, 213(1):92- 99.
- 2- Macovei, L.; Miles, B.; Zureki, L. (2008). Potential of houseflies to contaminate ready-to eat food with anti biotic-resistant enterococci, *J. Food. Prot.* 71,PP.435.
- 3- Zurek, L., C. ; Schal , and Watson, D.W. (2000). Diversity and contribution of the intestinal bacterial community to the development of *Musca domestica* (Diptera: Muscidae) larvae *J. Med.Entomol.* 37: 924-928.
- 4- Schmidtmann, E. T. and Martin, P. A. W. . (1992). Relationship between selected bacteria and the growth of immature house flies, *Musca domestica*, in an axenic test system. *J. Med. Entomol.* 29: 232-235.
- 5- Rinkevich, F.D.; Zhang, L.; Hamm, R.L.; Brady, S.G., Lazzaro, B.P.; Scott, J.G. (2006) . Frequencies of the pyrethroid resistance alleles of Vssc1 and CYP6D1 in house flies from the eastern United States, *Insect. Molec. Biol.* 15 157–167.
- 6- Cao, X.M.; Song, F.L.; Zhao, T.Y.; Dong, Y.D.; Sun, C.X.; Lu, B.L. (2006). Survey of deltamethrin resistance in house flies (*Musca domestica*) from urban garbage dumps in northern China, *Environ. Entomol.* 35 1–9.
- 7- Vaziranzadeh (2003) Integrated pest management of houseflies, *Musca domestica*(Diptera: Muscidae), using a combination of cyromazine Insect Growth Regulator (IGR) and a pteromalid wasp *Nasonia vitripennis*. [PhD thesis]. Cardiff University, UK.
- 8- Senior, L. J. (1998). Control the greenhouse white fly, *Trialeurodes vaporariorum* [PhD thesis]. Cardiff University, UK.
- 9- Machtlinger, E.T., 2011. Studies on the field ecology, breeding biology and parasitism of house flies,*Musca domestica*,and stable flies,*Stomoxys calcitrans*, (Diptera Muscidae) to improve integrated pest management for North Florida small equine farms. Masters Thesis, University of Florida, Gainesville.
- 10- Noronha, C.; Gibson, G.A.P. and Floate, K.D. (2007). Hymenopteras parasitoids of house fly and stable fly puparia in prince Edward Island and New Brunswickm Canada. *Can. Entomol.* 139:748-750.
- 11- mLazaraus, W.F.; Rutz, F. ; Miller, R.W. and Brown D.A. (1989). Costs of existing and recommended manure management practices for housefly and stable fly (Diptera: Muscidae) control on dairy farms. *J. Econ. Entomol.* 82:1145-1151.
- 12- Bouček, Z. (1963) . A taxonomic study in *Spalangia Latr.* (Hymenoptera, Chalcidoidea) . *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 35, 429–512.
- 13- Siriwanarungsee, S.; Sukontason, K.L.; Kuntalue,B.; Piangjai, S.; Olson, J.K.; Sukontason,k. (2005). Morphology of the puparia of the housefly , *Musca domestica* (Diptera:Muscidae) and blowfly, *Chrysomya megacephala* (Diptera:Calliphoridae) , *Parasitol Res* ; 96: 166–170
- 14- الصندوق، نضال مهدي والعلوي، حسين عباس (1987) علم الحشرات العام العملي . مطبعة التعليم العالي. بغداد 46 - 47
- 15- Price, P.W.(1984). Insect Ecology. John Wiley and Sons. New York Ragaei, M. and K. H. Sabry. 2011. Impact of spinosad and buprofezin alone and in combination against the cotton leaf worm, *Spodoptera littoralis* under laboratoty conditions. *Journal of Biopesticides* 4(2): 156-160.
- 16- Abdul-Rassoul, M.S. ; Mohammad, M. K . and Kadhim , F.S. (2000). Parasites of the house fly *Musca domestica L* . (Diptera :Muscidae) in Baghdad. *Bull. Iraq Nat. Hist.Mus.*,9(1):15-25.
- 17- Peck, O.; Boucek, Z. and Hoffer, A. (1964). Keys to the chalcidoidea of Czechoslorakia (Insecta : Hymenoptera) . *Memoirs of the Entomological Society of Canada* no.34:120 pp.
- 18- Darling, C. ; Werren, J. H. (1990). biosystimatics of *Nasonia* (Hymenoptera :pteromalidae) Two new species Reared from Birds Nests in North America .*Entomological Society of America* (90):352-370.
- 19- Gibson, G.A.P. and Reigada, C. (2009). The bizarre male of *Spalangia dozieri* (Hymenoptera: Pteromalidae): adaptations for male phoresy or the result of sexual selection? *The Canadian Entomologist*, 141, 112–125.