

Alleviation of water stress effect by using proline in terms of some maize cultivars growth .

تخفيف تأثير الإجهاد المائي باستعمال البرولين بدلالة نمو بعض أصناف للذرة الصفراء

عبد عون هاشم علوان الغانمي- عبد الجاسم محيسن جاسم الجبور- * قيود ثعبان يوسف الأسدي
كلية العلوم/جامعة كربلاء - مركز بحوث التقنيات الأحيائية/جامعة النهريين- كلية التربية للعلوم
الصرافة/جامعة كربلاء

بحث مسنل من أطروحة دكتوراه للباحث الثالث*

الخلاصة

نفذت التجربة في حقل خاص بمنطقة البركة (30) كم شمال شرق مدينة كربلاء خلال موسم النمو 2012 للعروتين الربيعية والخريفية باستعمال الأصص البلاستيكية بهدف معرفة تأثير الرش الورقي بحامض البرولين في الصفات الخضرية لثلاثة اصناف من الذرة الصفراء المعرضة للإجهاد المائي . أما الصفات المدروسة فشملت الصفات الخضرية (ارتفاع النبات، عدد الاوراق،المساحة الورقية لورقة العلم،الوزن الجاف للمجموع الخضري). استخدم التصميم العشوائي الكامل كتجربة عاملية من ثلاثة عوامل وهي ثلاثة أصناف من الذرة الصفراء (سرور، 5018 ، بغداد3) ،اربعة تراكيز من حامض البرولين (0 ، 50 ، 100 ، 150) ملغم . لتر⁻¹ ومستويين للسعة الحقلية (50% ، 100%) وبثلاث مكررات إذ تضمنت التجربة 72 أصيصاً (وحدة تجريبية) لكل عروة،وقد تم تحليل النتائج إحصائياً وقورنت المتوسطات باستعمال اقل فرق معنوي تحت مستوى احتمال 0.05 .اظهرت النتائج تفوق صنف سرور في اغلب صفات النمو الخضري على الصنفين الاخرين، كما اعطى تركيز البرولين 100ملغم . لتر⁻¹ اعلى معدلات للصفات المدروسة ومتفوقا على بقية التراكيز الاخرى،من ناحية اخرى اعطت معاملة الري بـ 100% من قيمة السعة الحقلية اعلى المعدلات للمؤشرات قيد الدراسة . وكان للتداخلات تأثير معنوي في الصفات المدروسة .

Abstract

This study was conducted in a private field at Albargah district (30Kms) northern east of Karbala city during spring and fall of 2012 growing season using plastic pot experiment. This study aimed to assess the effect of water stress , foliar application of proline and their interaction on shoot characteristics, of three cultivars of maize .The characteristics included plant height, leaves number, flag leaf area and shoot dry weight. A Factional experiment within Completely Randomized Design (C.R.D.) was adopted i.e. three cultivars of maize namely: Serour , 5018 , and Baghdad-3, proline (0, 50,100 and 150) mg . L⁻¹ and two levels of field capacity (50 and 100) % with three replicates in a total of 72 experimental units .Means were compared using the least significant difference (L.S.D) at 0.05 probability level. Results could be summarized as follow:Cultivars significantly differed in the studied traits .The cultivar Serour gave the highest values of plant height, leaves number, flag leaf area, shoot dry weight for spring and fall cultivations . Apart from some cases , 100% field capacity treatment gave higher values of most studied parameters.The interaction have a significant effect on all studied parameter.

المقدمة

يعد نبات الذرة الصفراء (*Zea mays* L.) أحد اهم المحاصيل العائدة للعائلة النجيلية (Poaceae) قليل التفرعات ذو سيقان سميكة مقسمة على سلاميات تحمل على طولها أوراقا تخرج من العقد والورقة مكونه من الغمد والنصل، وهذا النصل يكون طويل ومسطح وفي نهاية الساق من الأعلى تخرج النورة المذكورة في حين تخرج من إبط الأوراق النورة المؤنثة (العرنوص)، و يمثل محصول الذرة الصفراء احد محاصيل الحبوب المهمة اقتصاديا اذ يدخل في تغذية الإنسان والحيوان وفي الصناعة ويأتي بالمرتبة الثالثة بعد القمح والرز من حيث المساحة المزروعة والإنتاج ، وبالرغم من ملائمة الظروف البيئية لزراعته في العراق الا أن إنتاجيته لا تزال منخفضة بوحدة المساحة ويعود ذلك إلى عدم توفر العوامل الأساسية ومنها الماء، والمغذيات الضرورية ، لاسيما (N.P.K) التي لا تقل أهمية عن الماء الضروري لنمو الخلية النباتية وفعاليتها (1).

اما الإجهاد المائي فيعد واحد من أهم أنواع الاجهادات البيئية غير الحيوية (2) والذي يحصل حينما يقل ماء التربة نتيجة لقلة سقوط الأمطار أو عندما يفوق فقد الماء عن طريق النتح امتصاص الماء عن طريق الجذور، وبذلك فان الجفاف drought الذي يمثل أحد أهم العوامل غير الأحيائية abiotic الرئيسية التي تؤثر في نمو النباتات في المناطق المدارية، فهو يشكل مشكلة محددة للنمو والإنتاج في كافة أنحاء العالم وتسبب خسائر زراعية مهمة خصوصاً في المناطق الجافة وشبه الجافة حيث يؤدي الجفاف إلى

تغيرات في البيئة الطبيعية بصورة عامة وتتعرض في اختلال العمليات الفسلجية للنبات حيث يؤدي الجفاف إلى خفض النمو الخضري والتكاثري وبذلك فإن نمو النبات يتأثر سلباً تحت ظروف الإجهاد المائي وذلك حسب نوع النبات والظروف البيئية ويعزى هبوط نمو النبات تحت تلك الظروف إلى تثبيط عملية الانقسام الخلوي وهذا من شأنه أن ينقص عدد الخلايا والى تثبيط عملية الاتساع الخلوي وهذا يقلل حجم الخلايا أو نتيجة الاختلال بالتوازن الهرموني Hormone Imbalance بفعل الإجهاد المائي وتشمل زيادة في بناء ونشاط معوقات النمو أو هبوط في بناء ونشاط محفزات النمو أو الاثنين معاً (3).

لقد دلت العديد من الدراسات إلى إن حامض البرولين (C₅H₉NO₂)proline acid يمثل احد الاحماض الامينية المهمة في النبات وان اهم ما يميز هذا الحامض عن بقية الاحماض الامينية الاخرى هو احتواؤه على مجموعة امين ثانوية مرتبطة حيث أن هذه المجموعة تكون حرة وغير مرتبطة في جميع الاحماض الامينية الاخرى عدا البرولين (4) ، ويتجمع بشكل ملحوظ عند تعرض النبات للعديد من الاجهادات البيئية ومنها الاجهاد المائي قياساً بالاحماض الامينية الأخرى (5 و6) . أشار (7) الى ان التعديل الأوزموزي يعتبر آلية مهمة من اجل الحفاظ على الحالة المائية للنبات تحت ظروف الإجهاد المائي أو الأوزموزي إذ تتضمن هذه الآلية تراكم عدد من الجزيئات أو الأيونات (الذائبات) الفعالة أوزموزياً ومن ضمنها البرولين، ونتيجة لتراكم هذه الذائبات (مثل حامض البرولين) تحت ظروف الاجهاد المائي يحدث انخفاض للجهد الأوزموزي للخلية وبهذا يجذب الماء الى داخل الخلية مما يساعد في الحفاظ على أنتفاخها وبالتالي التقليل من تأثير الإجهاد المائي الذي يتعرض له النبات. فقد تناولت دراسات عديدة آلية تجمع حامض البرولين في أنسجة النبات وزيادة تحمل النبات للإجهادات البيئية ومنها الإجهاد المائي كما هو الحال في دراسة (8) على نبات الذرة الصفراء. إن هدف هذه الدراسة هو معرفة تأثير الرش الورقي بحامض البرولين في اختزال التأثيرات السلبية للإجهاد المائي في نبات الذرة الصفراء .

المواد وطرائق العمل

أجريت هذه التجربة كتجربة أصص في منطقة البركة التي تبعد حوالي (30) كم شمال شرق مدينة كربلاء المقدسة خلال العروتين الربيعية بتاريخ 2012/4/1 والخريفية بتاريخ 2012/7/22 ، حيث تم زراعة ثلاثة أصناف من الذرة الصفراء. تم تهيئة التربة للزراعة ، وتم أخذ عينات من التربة وبعمق (0-30) سم وأجريت لها التحاليل لتحديد بعض صفاتها الفيزيائية والكيميائية (الجدول 1)، ويوضح (الجدول 2) المعدلات الشهرية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة النسبية لمدينة كربلاء خلال فترة التجربة لعام 2012م. نفذت التجربة باستعمال أصص بلاستيكية سعة كل منها (10كغم) تربة وكان التصميم الإحصائي وفق التصميم التام العشوية Completely Randomized Design كتجربة عاملية (2x4x3) وبثلاث مكررات بحيث تضمنت العوامل التالية:-

1- ثلاثة أصناف من الذرة الصفراء (سرور، 5018، بغداد3).

2- اربعة تراكيز من حامض البرولين (0، 50، 100، 150) ملغم/لتر¹

3- الري بسعتين حقليتين (50، 100) %.

تم تسميد التربة الموجودة في الأصص قبل عملية زراعة البذور بسماد الفوسفات ثنائي الامونيوم Diammonium phosphate بمعدل 1غم/ اصيص¹ (9) . تم تقدير السعة الحقلية للتربة المستخدمة في الدراسة وذلك بأخذ ثلاثة أصص معبأة بـ 10 كغم / تربة و قد جففت هوائياً وشمسياً بصورة تامة ، إذ رويت التربة إلى حد الإشباع الكامل وتركت لمدة 48 ساعة مع مراعاة تقليل كمية بخار الماء وذلك بوضع غطاء بلاستيكي على كل أصيص وتركت حتى نزول آخر قطرة من الماء الجذبي عن طريق الثقوب السفلية للأصص ثم وزنت مرة أخرى وكانت طريقة الحساب كالآتي(10):

وزن الماء المفقود = وزن التربة الرطب – وزن التربة الجاف

النسبة المئوية للماء الموجود في 10 كغم / التربة = وزن الماء المفقود / وزن التربة الجاف 100x

حيث كانت السعة الحقلية = 22% .

تمت عملية الزراعة بعروتين (الربيعية والخريفية) حيث تمت زراعة البذور للعروة الربيعية والعروة الخريفية إذ زرعت 3 بذور تقريباً لكل أصص وبعد اكتمال بزوغ البادرات تم خف النباتات الى نبات واحد في كل اصيص، بدأ الري للوحدات التجريبية حسب المعاملات المطلوبة (100% و 50%) من السعة الحقلية المحسوبة. تم متابعة العمليات الزراعية من ري وإزالة الأدغال حتى عملية الحصاد. تم تحضير تراكيز حامض البرولين وذلك بوزن (50 و100 و150) ملغم حامض البرولين وأذابته في (1000) مل ماء مقطر. تم الرش بحامض البرولين في الصباح الباكر وحسب التراكيز المحضرة مسبقاً بعد مرور (45 يوماً) من زراعة البذور وكان الرش بصورة متساوية وحتى الإبتلال الكامل ، ورشت معاملات السيطرة بالماء المقطر مع استمرار الري حسب السعة الحقلية المطلوبة. بعد وصول نباتات الذرة الصفراء الى مرحلة النضج الكامل تم حصادها للعروة الربيعية بتاريخ 2012/7/20 والعروة الخريفية بتاريخ 2012/11/20 وذلك حسب معاملات الري (50 و 100) % من قيمة السعة الحقلية.

الصفات المدروسة :

1-معدل ارتفاع النبات (سم)

تم قياس ارتفاع النبات بشريط قياس مدرج من قاعدة النبات حتى قمة النورة الزهرية الذكرية في مرحلة النضج التام (11)

2-معدل عدد الاوراق. نبات¹-

تم عد الأوراق لكل نبات في مرحلة 100% تزهير وبعدها تم أستخراج المعدل لثلاث مكررات لكل معاملة.

الجدول (1) بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الدراسة بعمق (0 – 30) سم*

الصفة	الوحدة	القيمة
مفصولات التربة		
رمل	غم.كغم ¹ -	656
طين	غم.كغم ¹ -	60
غرين	غم.كغم ¹ -	284
نسجة التربة		رملية مزيجية
EC	ديسي سيمنز.م ¹ -	1.02
pH		7.2
المادة العضوية	غم.كغم ¹ -	8.0
النايتروجين الجاهز	ملغم.كغم ¹ -	120
الفسفور الجاهز	ملغم.كغم ¹ -	18.5
البوتاسيوم الجاهز	ملغم.كغم ¹ -	232
كربونات الكالسيوم	%	33

تمت التحاليل في مختبرات تحليل التربة في كلية الزراعة – جامعة الكوفة

الجدول (2) المعدلات الشهرية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة النسبية لمدينة كربلاء المقدسة خلال فترة التجربة لعام 2012*

الرطوبة النسبية (%)	درجة الحرارة الصغرى (°م)	درجة الحرارة العظمى (°م)	الشهر
38	19.1	33.3	نيسان
31	24.7	38.1	أيار
25	28.4	43.2	حزيران
21	31.0	46.0	تموز
27	29.2	44.4	أب
34	25.3	41.1	أيلول
43	21.4	34.6	تشرين الاول

*البيانات مأخوذة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي – بغداد

3-معدل مساحة ورقة العلم (م²)

حسبت مساحة ورقة العلم في مرحلة 100% تزهير. وذلك حسب المعادلة التي أتبعها (12) وهي كالآتي:-
المساحة الورقية (سم²) = 0.75 × طول الورقة (سم) × عرض الورقة (سم).

4-معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري (غم)

تم تجفيف العينات في الفرن الكهربائي oven بدرجة 72 م⁰ وحتى ثبات الوزن ، وتم وزن العينات بميزان حساس نوع Sartorius بعدها تم أستخراج معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري.

النتائج:

1- تأثير الصنف وتركيز البرولين والسعة الحقلية وتداخلاتها في ارتفاع نبات الذرة الصفراء للعروتين الربيعية والخريفية:

يبين الجدولان (3و4) وجود فروق معنوية بين الاصناف في صفة ارتفاع النبات وللعروتين الربيعية والخريفية اذ تفوق صنف 5018 بإعطائه اعلى معدل لهذه الصفة بلغ 108.46 و101.88 سمللعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب في حين اعطى صنف بغداد3 اقل معدل لارتفاع النبات بلغ 83.25 و78.75 سم للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب . كذلك كان للبرولين تأثيرا معنويا في هذه الصفة اذ تفوق تركيز 100 ملغم . لتر⁻¹ حامض البرولين على التراكيز الاخرى 0 و50 و150 ملغم . لتر⁻¹ وبنسب زيادة مقدارها 22.0% و10.3% و6.0% على الترتيب للعروة الربيعية ، و 23.0% و9.6% و7.5% على الترتيب للعروة الخريفية كما اشارت النتائج في نفس الجدولين وجود تأثير معنوي لمستوي السعة الحقلية في الصفة اعلاه حيث تفوق مستوى 100% سعة حقلية على المستوى الاخر 50% وبنسبتي زيادة مقدارها 9.4% و6.3% للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب.

أوضحت النتائج المبينة في الجدولين (3و4) ان التداخلات الثنائية بين كل من الصنف وتركيز البرولين ، الصنف والسعة الحقلية والسعة الحقلية وتركيز البرولين قد اعطت فروقا معنوية في تأثيرها في هذه الصفة أيضا، اذاعطى الصنف 5018 المستلم 100 ملغم

جدول (3) : تأثير الصنف و تركيز البرولين و السعة الحقلية و تداخلاتها في ارتفاع النبات (سم) لنبات الذرة الصفراء للعبوة الربيعية

الصنف × تركيز البرولين	السعة الحقلية (%)		تركيز البرولين ملغم/لتر ¹	الصنف
	100	50		
92.50	95.00	90.00	0	سرور
103.67	108.33	99.00	50	
113.83	118.00	109.67	100	
107.83	112.00	103.67	150	
98.17	101.33	95.00	0	5018
107.00	113.00	101.00	50	
117.83	124.00	111.67	100	
110.83	116.67	105.00	150	
74.00	77.00	71.00	0	بغداد3
82.00	86.33	77.67	50	
91.17	96.00	86.33	100	
85.83	90.00	81.67	150	
1.33	1.88			LSD(0.05)
معدل تأثير الصنف	103.14	94.31	معدل تأثير السعة الحقلية	
	0.54			LSD(0.05)
104.46	108.33	100.58	سرور	الصنف × السعة الحقلية
108.46	113.75	103.17	5018	
83.25	87.33	79.17	بغداد3	
0.66	0.94			LSD(0.05)
معدل تأثير تركيز البرولين				
88.22	91.11	85.33	0	تركيز البرولين × السعة الحقلية
97.56	102.56	92.56	50	
107.61	112.67	102.56	100	
101.50	106.22	96.78	150	
0.77	1.08			LSD(0.05)

جدول (4) : تأثير الصنف و تركيز البرولين و السعة الحقلية وتداخلاتها في ارتفاع النبات (سم) لنبات الذرة الصفراء للعبوة الخريفية

الصنف × تركيز البرولين	السعة الحقلية (%)		تركيز البرولين ملغم/لتر ¹	الصنف
	100	50		
98.00	91.00	87.00	0	سرور
99.00	101.00	97.00	50	
108.50	111.00	106.00	100	
100.67	104.00	97.33	150	
92.50	95.00	90.00	0	5018
101.50	104.00	99.00	50	
110.00	113.00	107.00	100	
103.50	104.00	103.00	150	
67.50	71.00	64.00	0	بغداد 3
79.00	83.00	75.00	50	
87.83	91.67	84.00	100	
80.67	85.33	76.00	150	
0.75	1.06			LSD _(0.05)
معدل تأثير الصنف	96.17	90.44	معدل تأثير السعة الحقلية	
	0.31		LSD _(0.05)	
99.29	101.75	96.83	سرور	الصنف × السعة الحقلية
101.88	104.00	99.75	5018	
78.75	82.75	74.75	بغداد 3	
0.37	0.53			LSD _(0.05)
معدل تأثير تركيز البرولين				
83.00	85.67	80.33	0	تركيز البرولين × السعة الحقلية
93.17	96.00	90.33	50	
102.11	105.22	99.00	100	
94.94	97.78	92.11	150	
0.43	0.61			LSD _(0.05)

لتر⁻¹ برولين اعلى معدل لارتفاع النبات اذ بلغ 117.83 و 110.00 سم للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب، بينما اعطى صنف بغداد3 والذي لم يعامل بالبرولين اقل معدل لارتفاع النبات بلغ 74.00 و 67.50 سم للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب

كما اعطى الصنف 5018 بسعة حقلية 100 % اعلى معدل لارتفاع النبات بلغ 113.75 و 104.00 سم للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب، بينما اعطى الصنف بغداد3 وبسعة حقلية 50 % اقل معدل لهذه الصفة بلغ 79.17 و 74.75 سم للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب.

لقد اعطت المعاملة بتركيز البرولين 100 ملغم . لتر⁻¹ وبسعة حقلية 100 % اعلى معدل لارتفاع النبات بلغ 112.67 و 105.22 سم للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب ، في حين اعطت معاملة التداخل بين التركيز 0 ملغم . لتر⁻¹ برولين و 50% سعة حقلية اقل معدل بلغ 85.33 و 80.33 سم للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب. اما بالنسبة للتداخل بين هذه العوامل الثلاثة فكان هو الاخر مؤثراً معنوياً في معدل هذه الصفة ، اذ اعطى الصنف 5018 عند تركيز برولين 100 ملغم . لتر⁻¹ وبسعة حقلية 100 % اعلى قيمة لارتفاع النبات بلغت 124.00 و 113.00 سم للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب، في حين اعطى الصنف بغداد3 اقل قيمة بلغت 71.00 و 64.00 سم للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب.

2- تأثير الصنف وتركيز البرولين والسعة الحقلية وتداخلاتها في عدد الاوراق (ورقة نبات⁻¹) لنبات الذرة الصفراء للعروتين الربيعية والخريفية:

يبين الجدولان (5 و 6) وجود فروق معنوية بين الاصناف في صفة عدد الاوراق للعروتين الربيعية والخريفية اذ تفوق صنف سرور بإعطائه اعلى معدل لهذه الصفة بلغ 14.21 و 12.29 ورقة نبات⁻¹ للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب في حين اعطى صنف 5018 اقل معدل لعدد الاوراق بلغ 12.79 و 11.00 ورقة نبات⁻¹ للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب . كذلك كان للبرولين تأثيراً معنوياً في هذه الصفة اذ تفوق تركيز 100 ملغم . لتر⁻¹ حامض البرولين على التراكيز الاخرى 0 و 50 و 150 ملغم . لتر⁻¹ وبنسب زيادة مقدارها 18.1% و 10.6% و 6.1% على الترتيب للعروة الربيعية ، و 21.0 % و 10.3% و 5.7% على الترتيب للعروة الخريفية .

كما اشارت النتائج في نفس الجدولان وجود تأثير معنوي لمستوي السعة الحقلية في الصفة اعلاه حيث تفوق مستوى 100% سعة حقلية على المستوى الاخر 50% وبنسبتي زيادة مقدارها 5.5% و 7.0% للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب. اوضحت النتائج المبينة في الجدولان (5 و 6) ان التداخلات الثنائية بين كل من الصنف وتركيز البرولين ، الصنف والسعة الحقلية والسعة الحقلية وتركيز البرولين قد اعطت فروقاً معنوية في تأثيرها في هذه الصفة ايضا، اذ اعطى الصنف سرور المستلم 100 ملغم . لتر⁻¹ برولين اعلى معدل لعدد الاوراق اذ بلغ 15.33 و 13.17 ورقة نبات⁻¹ للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب، بينما اعطى صنف 5018 والذي لم يعامل بالبرولين اقل معدل لعدد الاوراق بلغ 11.50 و 9.83 ورقة نبات⁻¹ للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب .

كما اعطى الصنف سرور بسعة حقلية 100 % اعلى معدل لعدد الاوراق بلغ 14.75 و 12.83 ورقة نبات⁻¹ للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب، بينما اعطى الصنف بغداد3 وبسعة حقلية 50 % اقل معدل لهذه الصفة بلغ 12.75 للعروة الربيعية ، واعطى الصنف 5018 عند السعة الحقلية 50 % اقل معدل بلغ 10.75 ورقة نبات⁻¹ للعروة الخريفية. لقد اعطت المعاملة بتركيز البرولين 100 ملغم . لتر⁻¹ وبسعة حقلية 100 % اعلى معدل لعدد الاوراق بلغ 11.64 و 11.84 ورقة نبات⁻¹ للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب ، في حين اعطت معاملة التداخل بين التركيز 0 ملغم . لتر⁻¹ برولين و 50% سعة حقلية اقل معدل بلغ 7.33 و 6.28 ورقة نبات⁻¹ للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب. اما بالنسبة للتداخل بين هذه العوامل الثلاثة فكان هو الاخر مؤثراً معنوياً في معدل هذه الصفة ، اذ اعطى الصنف 5018 عند تركيز برولين 100 ملغم . لتر⁻¹ وبسعة حقلية 100 % اعلى قيمة لعدد الاوراق بلغت 13.60 و 13.87 ورقة نبات⁻¹ للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب، في حين اعطى الصنف بغداد3 اقل قيمة بلغت 5.20 و 4.50 ورقة نبات⁻¹ للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب.

3- تأثير الصنف وتركيز البرولين والسعة الحقلية وتداخلاتها في المساحة الورقية لورقة العلم (م²) لنبات الذرة الصفراء للعروتين الربيعية والخريفية:

يبين الجدولان (7 و 8) وجود فروق معنوية بين الاصناف في صفة المساحة الورقية لورقة العلم للعروتين الربيعية والخريفية اذ تفوق صنف سرور بإعطائه اعلى معدل لهذه الصفة بلغ 0.019 و 0.014 م² للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب في حين اعطى صنف بغداد3 اقل معدل للمساحة الورقية لورقة العلم بلغ 0.013 و 0.008 م² للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب .

كذلك كان للبرولين تأثيراً معنوياً في هذه الصفة اذ تفوق تركيز 100 ملغم . لتر⁻¹ حامض البرولين على التراكيز الاخرى 0 و 50 و 150 ملغم . لتر⁻¹ وبنسب زيادة مقدارها 20.0% و 12.5% و 5.9% على الترتيب للعروة الربيعية ، و 30.0 % و 18.2% و 8.3% على الترتيب للعروة الخريفية

جدول (5) : تأثير الصنف و تركيز البرولين و السعة الحقلية وتداخلاتها في عدد الأوراق (ورقة . نبات¹⁻) لنبات الذرة الصفراء للحرثة الربيعية .

الصنف × تركيز البرولين	السعة الحقلية (%)		تركيز البرولين ملغم لتر ¹⁻	الصنف
	100	50		
13.33	14.33	12.33	0	سرور
14.00	14.67	13.33	50	
15.33	15.33	14.33	100	
14.17	14.67	13.67	150	
11.50	11.67	11.33	0	5018
12.17	12.33	12.00	50	
14.17	14.33	14.00	100	
13.33	13.33	13.33	150	
12.00	12.67	11.33	0	بغداد3
13.17	13.67	12.67	50	
14.00	14.33	13.67	100	
13.50	13.67	13.33	150	
0.72	1.02			LSD(0.05)
معدل تأثير الصنف	13.75	13.03	معدل تأثير السعة الحقلية	
	0.30		LSD(0.05)	
14.21	14.75	13.67	سرور	الصنف × السعة الحقلية
12.79	12.92	12.67	5018	
13.17	13.58	12.75	بغداد3	
0.36	0.51			LSD(0.05)
معدل تأثير تركيز البرولين				
12.28	12.89	11.67	0	تركيز البرولين × السعة الحقلية
13.11	13.56	12.67	50	
14.50	14.67	14.33	100	
13.67	13.89	13.44	150	

جدول (6): تأثير الصنف و تركيز البرولين و السعة الحقلية وتداخلاتها في عدد الأوراق (ورقة . نبات¹) لنبات الذرة الصفراء للعروة الخريفية

الصنف × تركيز البرولين	السعة الحقلية (%)		تركيز البرولين ملغم/لتر ¹	الصنف
	100	50		
11.17	11.67	10.67	0	سرور
12.17	12.67	11.67	50	
13.17	13.67	12.67	100	
12.67	13.33	12.00	150	
9.83	10.33	9.33	0	5018
10.83	11.33	10.33	50	
12.00	12.00	12.00	100	
11.33	11.33	11.00	150	
10.00	10.67	9.33	0	بغداد3
11.00	11.67	10.33	50	
12.33	12.67	12.00	100	
11.50	11.33	11.67	150	
0.77	1.09			LSD(0.05)
معدل تأثير الصنف	11.89	11.11	معدل تأثير السعة الحقلية	
	0.32		LSD(0.05)	
12.29	12.83	11.75	سرور	الصنف × السعة الحقلية
11.00	11.25	10.75	5018	
11.21	11.58	10.83	بغداد3	
0.39	0.55			LSD(0.05)
معدل تأثير تركيز البرولين				
10.33	10.89	9.78	0	تركيز البرولين × السعة الحقلية
11.33	11.89	10.78	50	
12.50	12.78	12.22	100	
11.83	12.00	11.67	150	
0.45	0.63			LSD(0.05)

كما اشارت النتائج في نفس الجدولان وجود تأثير معنوي لمستويي السعة الحقلية في الصفة اعلاه حيث تفوق مستوى 100% سعة حقلية على المستوى الاخر 50% وبنسبتي زيادة مقدارها 20.0% و20.0% للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب.

أوضحت النتائج المبينة في الجدولان (7و8) ان التداخلات الثنائية بين كل من الصنف وتركيز البرولين ، الصنف والسعة الحقلية والسعة الحقلية وتركيز البرولين قد اعطت فروقاً معنوية في تأثيرها في هذه الصفة ايضا، اذ اعطى الصنف سرور المستلم 100 ملغم . لتر⁻¹ برولين اعلى معدل للمساحة الورقية لورقة العلم اذ بلغ 0.021 و0.016م² للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب، بينما اعطى صنف بغداد3 والذي لم يعامل بالبرولين اقل معدل للمساحة الورقية لورقة العلم بلغ 0.012 و0.007 م² للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب .

كما اعطى الصنف سرور بسعة حقلية 100 % اعلى معدل للمساحة الورقية لورقة العلم بلغ 0.021 و0.016م² للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب، بينما اعطى الصنف بغداد3 وبسعة حقلية 50 % اقل معدل لهذه الصفة بلغ 0.013 و0.007م³ للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب.

لقد اعطت المعاملة بتركيز البرولين 100 ملغم . لتر⁻¹ وبسعة حقلية 100 % اعلى معدل للمساحة الورقية لورقة العلم بلغ 0.019 و0.014م² للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب ، في حين اعطت معاملة التداخل بين التركيز 0 ملغم . لتر⁻¹ برولين و50% سعة حقلية اقل معدل بلغ 0.014 و0.009م² للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب.

اما بالنسبة للتداخل بين هذه العوامل الثلاثة فكان هو الاخر مؤثراً معنوياً في معدل هذه الصفة ، اذ اعطى الصنف سرور عند تركيز برولين 100 ملغم . لتر⁻¹ وبسعة حقلية 100 % اعلى قيمة للمساحة الورقية لورقة العلم بلغت 0.022 و0.017م² للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب، في حين اعطى الصنف بغداد3 اقل قيمة بلغت 0.013 و0.006م² للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب.

4- تأثير الصنف وتركيز البرولين والسعة الحقلية وتداخلاتها في الوزن الجاف للمجموع الخضري (غم. نبات⁻¹) لنبات الذرة الصفراء للعروتين الربيعية والخريفية:

يبين الجدولان (9و10) وجود فروق معنوية بين الاصناف في صفة الوزن الجاف للمجموع الخضري لنبات الذرة الصفراء وللعروتين الربيعية والخريفية اذ تفوق صنف سرور بإعطائه اعلى معدل لهذه الصفة بلغ 24.88 و19.54غم. نبات⁻¹ للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب في حين اعطى صنف بغداد3 اقل معدل للوزن الجاف للمجموع الخضري بلغ 16.30 و12.78غم. نبات⁻¹ للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب .

كذلك كان للبرولين تأثيراً معنوياً في هذه الصفة اذ تفوق تركيز 100 ملغم . لتر⁻¹ حامض البرولين على التراكيز الاخرى 50 و150 ملغم . لتر⁻¹ وبنسب زيادة مقدارها 28.2% و13.5% و8.15% على الترتيب للعروة الربيعية ، و 33.8% و 15.7% و9.5% على الترتيب للعروة الخريفية .

كما اشارت النتائج في نفس الجدولان وجود تأثير معنوي لمستويي السعة الحقلية في الصفة اعلاه حيث تفوق مستوى 100% سعة حقلية على المستوى الاخر 50% وبنسبتي زيادة مقدارها 15.1% و7.5% للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب.

أوضحت النتائج المبينة في الجدولان (9و10) ان التداخلات الثنائية بين كل من الصنف وتركيز البرولين ، الصنف والسعة الحقلية والسعة الحقلية وتركيز البرولين قد اعطت فروقاً معنوية في تأثيرها في هذه الصفة ايضا، اذ اعطى الصنف سرور المستلم 100 ملغم . لتر⁻¹ برولين اعلى معدل للوزن الجاف للمجموع الخضري بلغ 27.50 و21.65غم. نبات⁻¹ للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب، بينما اعطى صنف بغداد3 والذي لم يعامل بالبرولين اقل معدل للوزن الجاف للمجموع الخضري بلغ 14.02 و9.95غم. نبات⁻¹ للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب .

كما اعطى الصنف سرور بسعة حقلية 100 % اعلى معدل للوزن الجاف للمجموع الخضري بلغ 26.25 و20.10غم. نبات⁻¹ للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب، بينما اعطى الصنف بغداد3 وبسعة حقلية 50 % اقل معدل لهذه الصفة بلغ 15.26 و12.43غم. نبات⁻¹ للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب.

لقد اعطت المعاملة بتركيز البرولين 100 ملغم . لتر⁻¹ وبسعة حقلية 100 % اعلى معدل للوزن الجاف للمجموع الخضري بلغ 24.10 و17.97غم. نبات⁻¹ للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب ، في حين اعطت معاملة التداخل بين التركيز 0 ملغم . لتر⁻¹ برولين و50% سعة حقلية اقل معدل بلغ 16.47 و12.32غم. نبات⁻¹ للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب.

اما بالنسبة للتداخل بين هذه العوامل الثلاثة فكان هو الاخر مؤثراً معنوياً في معدل هذه الصفة ، اذ اعطى الصنف سرور عند تركيز برولين 100 ملغم . لتر⁻¹ وبسعة حقلية 100 % اعلى قيمة للوزن الجاف للمجموع الخضري بلغت 29.00 و22.80غم. نبات⁻¹ للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب، في حين اعطى الصنف بغداد3 اقل قيمة بلغت 13.00 و9.60غم. نبات⁻¹ للعروتين الربيعية والخريفية على الترتيب.

جدول (7) : تأثير الصنف و تركيز البرولين و السعة الحقلية وتداخلاتها في المساحة الورقية لورقة العلم (م²) لنبات الذرة الصفراء للحرودة الربيعية .

الصنف × تركيز البرولين	السعة الحقلية (%)		تركيز البرولين ملغم/لتر ¹	الصنف
	100	50		
0.018	0.019	0.017	0	سرور
0.019	0.020	0.018	50	
0.021	0.022	0.019	100	
0.020	0.021	0.018	150	
0.016	0.017	0.014	0	5018
0.017	0.018	0.016	50	
0.019	0.020	0.017	100	
0.017	0.018	0.016	150	
0.012	0.013	0.011	0	بغداد3
0.013	0.014	0.012	50	
0.015	0.016	0.014	100	
0.014	0.014	0.013	150	
0.001	0.002			LSD(0.05)
معدل تأثير الصنف	0.018	0.015	معدل تأثير السعة الحقلية	
	0.002			LSD(0.05)
0.019	0.021	0.018	سرور	الصنف × السعة الحقلية
0.017	0.018	0.016	5018	
0.013	0.014	0.013	بغداد3	
0.002	0.002			LSD(0.05)
معدل تأثير تركيز البرولين				
0.015	0.016	0.014	0	تركيز البرولين × السعة الحقلية
0.016	0.017	0.015	50	
0.018	0.019	0.017	100	
0.017	0.018	0.016	150	
0.001	0.001			LSD(0.05)

جدول (8) : تأثير الصنف و تركيز البرولين و السعة الحقلية وتداخلاتها في المساحة الورقية لورقة العلم (م²) لنبات الذرة الصفراء لعروة الخريفية

الصنف × تركيز البرولين	السعة الحقلية (%)		تركيز البرولين ملغم/لتر ¹	الصنف
	100	50		
0.013	0.014	0.011	0	سرور
0.014	0.015	0.012	50	
0.016	0.017	0.014	100	
0.015	0.016	0.013	150	
0.010	0.011	0.009	0	5018
0.011	0.012	0.010	50	
0.013	0.014	0.012	100	
0.012	0.013	0.011	150	
0.007	0.007	0.006	0	بغداد3
0.008	0.009	0.007	500	
0.010	0.010	0.009	100	
0.008	0.009	0.007	150	
0.001	0.002			LSD(0.05)
معدل تأثير الصنف	0.012	0.010	معدل تأثير السعة الحقلية	
	0.001		LSD(0.05)	
0.014	0.016	0.013	سرور	الصنف × السعة الحقلية
0.012	0.013	0.011	5018	
0.008	0.009	0.007	بغداد3	
0.002	0.002			LSD(0.05)
معدل تأثير تركيز البرولين				
0.010	0.011	0.009	0	تركيز البرولين × السعة الحقلية
0.011	0.012	0.010	50	
0.013	0.014	0.012	100	
0.012	0.013	0.010	150	
0.001	0.001			LSD(0.05)

جدول (9) : تأثير الصنف وتركيز البرولين و السعة الحقلية وتداخلاتها في الوزن الجاف للمجموع الخضري (غم.نبات⁻¹) لنبات الذرة الصفراء للعروة الربيعية

الصنف × تركيز البرولين	السعة الحقلية (%)		تركيز البرولين ملغم لتر ⁻¹	الصنف
	100	50		
22.00	23.00	21.00	0	سرور
24.50	26.00	23.00	50	
27.50	29.00	26.00	100	
25.50	27.00	24.00	150	
16.75	18.10	15.40	0	5018
19.08	21.13	17.03	50	
22.00	24.00	20.00	100	
20.03	22.03	18.03	150	
14.02	15.03	13.00	0	بغداد3
16.02	17.00	15.03	50	
18.15	19.30	17.00	100	
17.02	18.03	16.00	150	
1.16	1.64			LSD _(0.05)
معدل تأثير الصنف	21.64	18.79	معدل تأثير السعة الحقلية	
	0.47		LSD _(0.05)	
24.88	26.25	23.50	سرور	الصنف × السعة الحقلية
19.47	21.32	17.62	5018	
16.30	17.34	15.26	بغداد3	
0.58	0.82			LSD _(0.05)
معدل تأثير تركيز البرولين				
17.59	18.71	16.47	0	تركيز البرولين × السعة الحقلية
19.87	21.38	18.36	50	
22.55	24.10	21.00	100	
20.85	22.36	19.34	150	
0.67	0.95			LSD _(0.05)

جدول (10) : تأثير الصنف و تركيز البرولين و السعة الحقلية وتداخلاتها فيالوزن الجاف للمجموع الخضري (غم.نبات⁻¹) لنبات الذرة الصفراء للعروة الخريفية

الصنف × تركيز البرولين	السعة الحقلية (%)		تركيز البرولين ملغم.لتر ⁻¹	الصنف
	100	50		
17.40	17.50	17.30	0	سرور
19.10	19.60	18.60	50	
21.65	22.80	20.50	100	
20.00	20.50	19.50	150	
11.55	13.03	10.07	0	5018
13.35	14.50	12.20	50	
15.32	16.03	14.60	100	
13.97	15.07	12.87	150	
9.95	10.30	9.60	0	بغداد3
12.55	12.80	12.30	50	
15.08	15.10	15.07	100	
13.55	13.70	13.40	150	
0.15	0.21			LSD _(0.05)
معدل تأثير الصنف	15.84	14.74	معدل تأثير السعة الحقلية	
	0.06		LSD _(0.05)	
19.54	20.10	18.98	سرور	الصنف × السعة الحقلية
13.55	14.66	12.43	5018	
12.78	12.80	12.77	بغداد3	
0.07	0.10			LSD _(0.05)
معدل تأثير تركيز البرولين				
12.97	13.61	12.32	0	تركيز البرولين × السعة الحقلية
15.00	15.47	14.53	50	
17.35	17.97	16.73	100	
15.84	16.32	15.36	150	
0.08	0.12			LSD _(0.05)

بينت النتائج في الجدولين (3 و4) اختلاف الأصناف معنوياً في صفة ارتفاع النبات للعروتين ، وقد يعود هذا إلى اختلاف أصناف الذرة الصفراء وراثياً في طول السلاميات ، وهي من الصفات المهمة التي تميز الأصناف عن بعضها في الارتفاع (13) . وهذا ما أكدته نتائج (14) من إن هناك تبايناً وراثياً عالياً بين 20 صنف من أصناف الذرة الصفراء المزروعة في العراق في الصفة أعلاه .

أظهرت النتائج الموضحة في الجداول (5-10) وجود فروقات معنوية بين أصناف الذرة الصفراء في صفة عدد الأوراق ومساحة ورقة العلم والوزن الجاف للمجموع الخضري للعروتين ، وهذا يختلف تبعاً لتركيبتها الوراثية . وهذا ما أكدته نتائج (15) على نبات الذرة الصفراء و (16) على نبات الذرة البيضاء الحبوبية حيث وجد أن الأصناف اختلفت فيما بينها في جميع صفات النمو الخضري .

إن الزيادة المعنوية في صفات النمو الخضري المتمثلة بارتفاع النبات وعدد الأوراق والمساحة الورقية (الجدول 3-10) نتيجة الرش بحامض البرولين يعود إلى دوره الإيجابي في تنظيم الجهد الأوزموزي من خلال تنظيم الجهد الضغطي والجهد المائي مما يزيد من قابلية الخلية على سحب الماء من وسط النمو ومن ثم زيادة نمو النبات وإدامة استطالة الخلايا وإدامة فتح الثغور وعملية البناء الضوئي بالإضافة إلى كون حامض البرولين يعد مصدراً للنيتروجين فهو يساهم في بناء البروتين ويلعب دوراً في تجهيز النباتات بالطاقة (17) ، تتماشى هذه النتائج مع النتائج التي توصل إليها (18) على نبات الحنطة إذ أكد إن الرش بحامض البرولين تأثير إيجابي في تحسين نمو النبات .

أوضح الجدولان (3 و4) أن صفة ارتفاع نبات الذرة الصفراء للعروتين شهدت انخفاضاً معنوياً بتأثير الإجهاد المائي ، وقد يعود السبب في انخفاض ارتفاع النبات بسبب الإجهاد إلى انخفاض النمو حيث أن نقص الماء يؤدي إلى تثبيط الانقسام الخلوي cell division والتميز الخلوي cell differentiation نتيجة فقدان الضغط الامتلائي Turgidity pressure وفقدان الاتساع الخلوي ونقص عدد الخلايا (17) أو قد يكون السبب في ذلك هو أن الإجهاد المائي يحث المايوتوكونديريا ، والبلاستيدات، والبيروكسومات على زيادة إنتاج الجذور الحرة من مجموعة الأوكسجين الفعالة والتي تؤدي إلى تحلل الأغشية الخلوية وأكسدة الإنزيمات وخفض تراكيز الأوكسينات، والجبرلينات، والسايوتوكاينينات، وأكسدة الأحماض النووية والأمينية مثل حامض Tryptophan، والذي يشكل أساس بناء الأوكسين، لاسيما في المناطق المرستيمية (19) وبالتالي ينخفض ارتفاع النبات ، وتتفق هذه النتائج مع نتائج (20) و(22) على نبات الذرة الصفراء .

كما أن الانخفاض المعنوي في عدد الأوراق للنبات في العروتين (الجدولان 5 و6) نتيجة الإجهاد المائي يعزى إلى انخفاض محتوى الماء النسبي للأوراق بسبب الإجهاد المصاحب لارتفاع درجات الحرارة (الجدول 2)، أو نتيجة تراكم حامض الأبيسيسيك (والذي يزداد عند تعرض النبات إلى إجهاد مائي) وتساقط الأوراق وغلغ الثغور ونقص في تمثيل CO_2 وزيادة تركيز انزيم IAA-Oxidase والذي يؤكسد الأوكسين الطبيعي في منطقة انفصال الورقة Abessission Zone بالإضافة إلى تراكم هرمون الاثيلين (22) . أكدت النتائج التي توصل إليها (23) و (21) على نبات الذرة الصفراء أن الإجهاد المائي أدى إلى انخفاض واضح في عدد الأوراق .

أوضحت نتائج الجدولين (7 و8) انصفة المساحة الورقية لورقة العلم للعروتين قد تأثرت بمستوي السعة الحقلية بصورة معنوية . حيث شهدت المساحة الورقية للعروتين انخفاضاً معنوياً بتأثير الإجهاد المائي ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض محتوى الماء النسبي للنبات وهذا ما أكدته (24) على نبات الذرة الصفراء ، وما للماء من دور مهم في عملية انقسام الخلايا واستطالتها ووفرة العناصر الغذائية في التربة وسهولة امتصاصها ومن ثم انخفاض عملية البناء الضوئي ونواتجها مما يؤدي بالتالي إلى انخفاض المساحة الورقية (25) أو قد يعزى إلى زيادة تركيز هرمون الأبيسيسيك والذي يزداد عند تعرض النبات إلى إجهاد مائي (26) .

يلحظ من النتائج في الجدولين (9 و10) انخفاضاً معنوياً في معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري للعروتين بتأثير الإجهاد المائي ، قد يعزى السبب في انخفاض الوزن الجاف للمجموع الخضري بتأثير الإجهاد المائي إلى أن مرحلة النمو الخضري مرحلة نشطة لنمو وتوسع الخلايا وانقسامها والتي تتأثر بنقص الماء ، حيث أن انخفاض النمو الخضري للعروتين الربيعية، والخريفية، والذي يشمل انخفاض ارتفاع النبات (الجدولان 3 و4) ، وقلة عدد الأوراق (الجدولان 5 و6) ، والمساحة الورقية (الجدولان 7 و8) وانخفاض كفاءة البناء الضوئي بالإضافة إلى قلة امتصاص العناصر المهمة في العمليات الحيوية هذا بالإضافة إلى التأثير المباشر لانخفاض محتوى التربة من الماء الجاهز مما يؤدي إلى إعاقة النمو الطبيعي للنبات والذي ينعكس تأثيره في انخفاض نواتج التمثيل الضوئي الضرورية في بناء الكربوهيدرات، والبروتينات ، وقلة تراكم المادة الجافة، فضلاً عن العديد من العمليات الكيموحيوية الأخرى (27 و28) ، بعبارة أخرى وجد أن إزالة الماء من البروتوبلازم يؤثر في الخصائص الغروانية له وهذا من شأنه أن يؤدي إلى هبوط العمليات الحيوية مثل البناء الضوئي والتنفس والكفاءة الانزيمية وغير ذلك ، كذلك فإن نقص الماء في بيئة النبات يؤدي إلى غلق الثغور وهبوط عملية التبادل الغازي خصوصاً دخول CO_2 إلى النسيج المتوسط هذا فضلاً عن تدمير التركيب الدقيق لنظام البناء الضوئي ، وبالتالي يؤدي هذا إلى انخفاض الوزن الجاف للنبات ، أو قد يعزى هذا الانخفاض إلى تثبيط النمو تحت ظروف الإجهاد المائي ويعزى هذا إلى تثبيط عملية الانقسام الخلوي وهذا من شأنه أن ينقص عدد الخلايا أو تثبيط عملية الاتساع الخلوي وهذا يقلل حجم الخلايا وبالتالي تقليل المساحة الورقية للنبات (الجدولان 7 و8) وتكون النتيجة انخفاض الوزن الجاف للنبات. وهذا ما أكدته النتائج التي توصل إليها (29) و(30) على نبات الذرة الصفراء من أن الإجهاد المائي قد خفض نمو النبات .

المصادر :

1. فرج، علي حسين(2007).استجابة محصول الذرة الصفراء للتسميد الارضي والورقي بالمغذيات NPK.مجلة الزراعة العراقية (عدد خاص)، 12(1):20-29.
2. Ali, Q. ; Elahi, M. ; Hussain , B. ; Khan, N.H. ; Ali, F. and Elahi, F. (2011). Genetic improvement of maize(*Zea mays* L.) against drought stress : An overview. Agri. Sci. Res. J. 1(10) : 228-237 .
3. ياسين ، بسام طه (2001) . أساسيات فسيولوجيا النبات . كلية العلوم ، جامعة قطر .
4. دلالي ، باسل كامل (1980) . أساسيات الكيمياء الحيوية . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل .
5. Jampeetong , A. and Brix , H. (2009) .Effects of NaCl salinity on growth , morphology,photosynthesis and proline accumulation of *Salvinianatans* . Aquatic,Bot.,91(3): 181-186 ..
6. Mattioli, R. (2009) .The proline biosynthetic genes P5CS1 and P5CS2 play overlapping roles in Arabidopsis flower transition but not in embryo development . Physiol. Plant ., 137:72-85..
- 7.Farhad , M. S. ; Babak, A. M. ; Reza, Z. M. ; Hassan, R. M. and Afshin, T. (2011) . Response of proline , soluble sugars, photosynthetic pigments and antioxidant enzymes in potato (*Solanumtuberosum* L.) to different irrigation regimes in greenhouse condition. Aust. J. of Crop Sci., 5(1): 55-60.
8. Ali, Q. ; Anwar, F. ; Ashraf, M. ; Saari, N. and Perveen, R. (2013). Ameliorating effects of exogenously applied proline on seed composition , seed oil quality and oil antioxidant activity of maize (*Zea mays* L.) under drought stress . Int. J. Mol. Sci. , 14: 818-835.
- 9.الصيمري ، خنساء عبد العالي شهيد (2009) . دراسة بيئية عن تأثير نسجة التربة وموعد الزراعة في النمو والحالة الغذائية لخمسة أصناف من الحنطة (*Triticumaestivum* L.) . رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة كربلاء .
10. Sutcliffe, J. (1979). Plants and Water . Studies in Biology no. 142nded .Pp.122.
11. الدليمي ، نهاد محمد عيود (2002) . استجابة عدة تراكيب وراثية من الذرة البيضاء لمستويات مختلفة من النتروجين في ظروف منطقة الرمادي . رسالة ماجستير ، كلية الزراعة ، جامعة الانبار .
- 12.Thomas,H.(1975).The growth response of weather of simulated vegetative swards of single genotype of *Loliumperenne* . J.Agric.Sci.Camb.84:333-343.
13. محمد ،هناة حسن (2000) .صفات نمو وحاصل ونوعية اصناف من حنطة الخبز بتاثير موعد الزراعة . أطروحة دكتوراه ، كلية الزراعة ، جامعة بغداد .
- 14.AL-Badeiry, N. A. H. (2013) . Molecular and cytological studies on some *Zea mays* varieties in Iraq . Ph.D. thesis , Kufa university , Iraq .
- 15.كاظم، خولة داود (2005) .دراسة تأثير الأصناف والمسافات وإزالة النورة الذكرية على الحاصل ومكوناته لمحصول الذرة الصفراء .مجلة البصرة للعلوم الزراعية .18(1): 87-94 .
- 16.جواد، عفاف مهدي محمد (2006) .تحليل معامل المسار في الذرة البيضاء الحبوبية.رسالة ماجستير .كلية الزراعة . جامعة بغداد .
17. ياسين ، بسام طه (1992) . فسلجة الشد المائي في النبات . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل .
- 18.الحمودي، مالك عبد الله عديبي (2011) .استجابة أربعة أصناف من الحنطة (*Triticum aestivum* L.) لتراكيز البرولين المضافة تحت مستويات إجهاد مائي مختلفة . رسالة ماجستير ، كلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة كربلاء .
- 19.Taiz , L. and Zeiger , E.(2010) . Plant Physiology . 5th(ed.) , Sianauer Associates , Sunderland , UK. : 629 P .
20. Miri, H. R. and Armin, M. (2013) . The interaction effect of drought and exogenous application of glycine bentaine on corn (*Zea mays* L.) . European J. of Experimental Biol., 3(5) : 197 – 206 .
- 21.Odiy, B. O.(2013) . The effects of flooding and drought stress on the growth of maize (*Zea mays* L.) seedlings . J. of Biol. And Food Sci. Rese. , 2(3) : 30 -32 .
- 22.Carbo , M. R. ; Taylor , N. L. , Giles , L. ; Busquets , S. ; Finnegan , P. M. ; Day , D. A. ; Lambers , H. ; Medrano , H. ; Berry , J. A. and Flexas , J. (2005) . Effect of water stress on respiration in Soybean leaves . Plant Physiol . , 139 : 466 – 437 .
- 23.Anand, A.;Nagarajan, S.;Verma,A.;Joshi,D.;Pathak,P.and Bhardwaj ,J.(2012).Pre-treatment of seeds with static magnetic field ameliorates soil water stress in seedling of maize(*Zea mays* L.).Indian J. of Biochem. and Biophysics.49 :63-70 .

24. طوشان، حياة، ومحمد زين الدين نعمة، ومحمد شيخ قروش (2013). تأثير مضاد النتح والإجهاد المائي في بعض المؤشرات الفيزيولوجية للذرة الصفراء المزروعة. مجلة العلوم الزراعية العراقية ، 44(3) : 340-331 .
25. Hsiao , T. C. (1973). Plant responses to water stress .Annu. Rev. Plant Physiol., 24:519-570 .
26. Cramer, G. R. ;Krishnan, K. and Abrams, S. R. (1998). Kinetics of maize leaf elongation. IV. Effects of(+) and (-) abscisic acid . J. Exp. Bot. , 49:191-198 .
27. شهاب ، الهام محمود و بشرى خليل شاكر (2001) . تأثير الشد المائي على انبات ونمو صنفين من حنطة الخبز، مجلة علوم الراءدين 12 (1) : 42 – 50 .
28. Abd El-Halim, A. A. and Abd El-Razek, U.A. (2014). Effect of different irrigation intervals on water saving , water productivity and grain yield of maize (*Zea mays* L.) under the double ridge-furrow planting technique. Arch. Agron. Soil Sci.,60(5) : 587-596.
29. الالوسي، عباس عجيل محمد عباس (2005) . استجابة سلالات وهجن من الذرة الصفراء تحت قلة وكفاية النتروجين والماء . أطروحة دكتوراه ، كلية الزراعة ، جامعة بغداد.
30. Shaddad, M. A. K. ; Abd El-Samad, H. M. and Mohammed, H. T. (2013) . Drought tolerance of some *Zea mays* genotypes at early growth stage .Academia J. of Biotechnology., 1(8) : 121 – 126 .