

Study of some morphological and anatomical characters of the *Convolvulus arvensis* L.(Convolvulaceae) in Iraq species

دراسة بعض الصفات المظهرية والتشريحية للنوع *Convolvulus arvensis* L. (Convolvulaceae) في العراق
أ.م بلقيس هادي هاشم الموسوي
كلية العلوم / علوم الحياة / جامعة كربلاء

الخلاصة

تضمن البحث الحالي دراسة بعض الصفات التصنيفية المظهرية والتشريحية للجنس *Convolvulus* L. في العراق وتمت دراسة نوع الجنس *Convolvulus arvensis* L. وهو (morning-glory) أي (المديد) تصنيفيا لأنشاره كأدغال ضارة للمحاصيل الزراعية في القطر وشملت الدراسة المظهرية صفات الجذور والسيقان وأروروس أزهري وأنورات والأزهار وألثمار وأبنور، أما الصفات التشريحية فقد تضمنت طبيعة جدران خلايا بشرة الورقة ونوع الطراز التغري . وقد أتضح بأن نوع الجنس *Convolvulus arvensis* ذات صفات مظهرية وتشريحية متميزة .

Abstract:

The present investigation comprises some of morphological & anatomical study for the genus *Convolvulus* L. in Iraq. One species belongs to this genus *C.arvensis* L . weed species has been systematically examined . Distribution herb weed on the crops in the country , the morphological study includes studying the characters of root ,stem, leaves,floweringheads,Inflorescence,flowers ,fruit,seed, Indumentum. Anatomical study showed epidermal cell of leaf and stomatal type .The results showed that *C.arvensis* L. species with distinct morphological , anatomical feature .

المقدمة :

ينتمي الجنس *Convolvulus* إلى عائلة البطاطا الحلوة او مجد الصباح morning glory family (Convolvulaceae) أو عائلة المديد العائلة العلاقة (اللفافية) (1) والتي تنتشر بواسطة الرايزومات وأبنور وهي من العائلات أزهريه عالمية لأنشار وتضم حوالي 50 جنساً و 1200 نوعاً موزعاً في المناطق الحارة والمعتدلة من العالم (2) وتضم هذه العائلة جنسين كبيرين (3) هما *Ipomoea* والمديد *Convolvulus* قيد الدراسة والذي يعد ثاني أكبر جناس هذه العائلة حسب ما أورده (4) ويقع هذا الجنس بصورة رئيسية في المناطق المدارية والحرارة وحوض البحر الأبيض المتوسط (5,6) أما موطنها الأصلي في آوربا وأسيا [Erasia] لكنه ذو انتشار واسع في العالم بحسب (7) ويعده كل من (8) و(9) و(10) أحد أشهر العشرة أدغال الضارة والمؤذية للغلال الزراعية في العالم ويتشر في 54 قطرًا موزعًا على 32 مجموعة مختلفة ومنها أي من هذه البلدان منطقة Chile الواقعه جنوب أمريكا وهي غنية بأنواع العائلة *Convolvulus* وجنس (11) ويعود هذا الجنس من النباتات المكتشفة مبكرًا بحسب ما ذكره (12) وهو منتشر كأدغال على طول القطر في (Chile) أما في الموسوعة النباتية الصينية فقد سجل 8 أنواع للجنس *Convolvulus* ويعد من النباتات ذات الأهمية الاقتصادية والطبية (13) وفي ايران يعد هذا النوع *C.arvensis* من الأدغال المؤذية والضار للغلال الزراعية(14) وفي آوربا وشمال وجنوب أمريكا يعد هذا النوع ضمن قائمة الأدغال التي تكافح بالسيطرة البيولوجية (15) ومنها الأحياء المجهرية وأنواع من الحشرات (16) وتسبب المشاكل الاقتصادية في العراق. وقد أشار (17) إلى أن العائلة العلاقة أو عائلة المديد تضم حوالي 50 جنساً موزعاً على 1800 نوعاً وتمثل بريا بجنسين فقط هما المديد *Convolvulus* الذي يضم حوالي 18 نوعاً أشهرها النوع *Convolvulus arvensis* حيث تحتاج نباتاته لحقول والمزارع والحدائق وألمتنزهات بشكل واسع وكأدغال مؤذية وضاره جداً للمحاصيل الزراعية وألجنس آخر هو الشوويل *Cressa* الذي ينمو في أغلب المناطق

المالحة من القطر. أما (18) فقد ذكر أن الجنس *Convolvulus* يحوي على 15 نوعاً في التوزيع الجغرافي للنباتات البرية في العراق ومنها النوع *Convolvulus arvensis* ، في حين سجل (19) في الثروة النباتية العراقية حوالي 16 نوعاً للجنس *Convolvulus* وبعد النوعين *Convolvulus arvensis* و *Convolvulus scamonia* من أشهرها وذو أهمية اقتصادية جيدة. ويعد هذا النوع اي *Convolvulus arvensis* هو احد الانواع التي ذكرها (20) والتي درست ضمن الجنس *Convolvulus* في العراق .

وأشتق اسم الجنس *Convolvulus* من الكلمة اللاتينية وهي convolere أو convolve وتعني الاشتباك أو الالتفاف وهي خاصية لسيقان هذا الجنس أما النوع *arvensis* فهو مشتق من الكلمة اللاتينية field وتعني الحقول أشاره لأنشاره فيها حسب ما ذكره كل من (21،22،23) وأشار (8) إلى النوع *Convolvulus arvensis* يمتلك حوالي 84 أسماء شائعاً ويطلق المصطلح bind weed أي لبلاب الحقول على جميع أنواع الجنس *Convolvulus* أما المصطلح Weed field bind يستخدم غالباً وبصورة خاصة كإشارة لنوع *C.arvensis* (23) ومن أسمائه الشائعة هي Creeping charlie (1) creeping Jenny (2) possession vine (3) official (4).

اما بخصوص اهم استعمالاته الشائعة فقد ذكر كل من (24) و(25) أن أزهار وجذور النوع *C.arvensis* تحوي على الراتنجات Resin ومادة Convolvuli وأسكريات وتستخدم أزهاره كمادة ملينة (مسهلة) ومحففة للحمى ومفيدة للجرح والعلبة تستخدم في علاج الصفراء والأبرو ومسهلة. وسجل كأعشاب ضارة للغلات الزراعية بسبب خاصية الالتفاف والاشتباك حولها وأستخدم قديماً من قبل رعاة الحيوانات للسيطرة على الأدغال ويسبب ألسمم لبعض الحيوانات وكغذاء للاغنام والجمال وسجل أنه يسبب الامراض للخنازير عند تناوله بكميات كبيرة (26).

المواد وطرق العمل Materials and Methods

اعتمد البحث الحالي في أغلب جوانبه وبالدرجة الأساس على العينات الطيرية والجافة والتي تم الحصول عليها من الحقل خلال المسوحات المتعددة ومن مناطق مختلفة للفترة من (2010-2011) وقد أودعت بعض هذه العينات في مختبر تصنيف النبات/كلية العلوم/جامعة كربلاء بعد أن دونت جميع المعلومات على هوية كل عينة (Label) وألمتضمنة : الاسم العلمي ومكان وتاريخ الجمع وبعض الملاحظات البينية أو الحقلية ، فضلاً عن بعض العينات الجافة والمودعة في معشب (مختبر كلية العلوم). وتمت دراسة الصفات المظهرية لعدد من العينات تتراوح بين (10-15) عينة لنوع الجنس *Convolvulus* وأخذت قياسات من كل عينة تراوحت بين (5-10) قياس لكل صفة ، وفحصت العينات النباتية بواسطة مجهر تشريح Dissecting microscope من نوع (Fuse) لدراسة الصفات المظهرية لنوع الجنس . كما استخدمت المسطرة العينية Ocular وألمربعات للقياسات الخاصة بالدراسة المظهرية كما وتم رسم بعض الأجزاء النباتية للتوضيح. أما الدراسة التشريحية للورقة فقد تمت بتحضير البشرة من عينات طرية وجافه بعد ان وضعت ب (NaOH) بتركيز 1% ولعدة دقائق وتم تحضير البشرة بطريقة القشط ، وصورت تحت المجهر المركب Olympus . وبين جدول رقم (1) موقع جمع العينات وتاريخ الجمع .

جدول رقم (1) يبين موقع جمع العينات وتاريخ الجمع

ت	موقع جمع العينات	تاریخ الجمع
1	حديقة جامعة كربلاء (كلية العلوم)	2010/5/ 2
2	منطقة أحسينية / كربلاء	2010/5/28
3	حي الامير / النجف	2010/6/22
4	حي العامل / بغداد	2011/7/17
5	المشاتل / القادسية	2011/8/10
6	أسيجة الحدائق / بابل	2011/8/19
7	جوانب الطرق / بابل	2011/9/20
8	حي العباس / كربلاء	2011/9/30

النتائج والمناقشة Results &Discussion

• الطبيعة والديمومة (مدة البقاء) Habitat and Duration

يمتاز أنواع *Convolvulus arvensis* بأنه دائمي ، عشبي ، عمر وهو متسلق أو ملتف ويزهر من بداية شهر آيار وحتى شهر أيلول.

• الجذر Root

الجذر وتدى، سميك يصل إلى عمق (3)m ويغور في التربة ويصل طوله (6.6)m أي يخترق التربة بعمق .

• الساق Stem

كانت الساق في النوع *C. arvensis* ضعيفة ومتسلقة أو ملتفة تستطيع الالتفاف وتبدو كأنها مشبكة كالسجاد ، ملساء أو مشعرة قليلا ، متفرعة الساق وبلغ طول ساق النبات من (0.5-2)m ، لوحه (1-c) و (2-a).

• الأوراق Leaves

وتبين من البحث الحالي أن للجنس *Convolvulus* أوراق متغيرة وهي تعكس التضارب البيئي في مزيج التربة والخصوصية وهي بيضوية- ومتطاولة أو بيضوية وقاعدتها سهمية أو مزراقبية ، متبادلة وذات ترتيب حلزوني ملساء أو مشعرة قليلا، خضراء فاتحة أو غامقة وهي معنفة وبلغ طول العنق حوالي من (3-1) cm وألعروق مرئية واضحة ، أما أبعادها فتراوحت بين (10-1) cm طولا و (2-6) cm عرضا رمحية- بيضوية ، لوحه (1-B) و (2-b).

• الانظمة الزهرية Inflorescences

النورات مفردة solitary محدودة أنمو تحوي من (3-2) أزهار أما أطوال أحواض مبلغت حوالي (6) cm وأقتابات صغيرة خطية ملساء- مشعرة طولها (4) mm مفصولة بواسطة حافة الكأس (1.5-2.5) mm. طولا و (2-6) cm عرضا رمحية- بيضوية ، لوحه (2-c,d,e).

A- الكأس / Calyx

الأوراق الكاسية خمسة غير متساوية متطاولة ومفصولة فتراوحت أبعادها بين (4-5) mm وعرضها (1.9-2.1) mm . لوحه (A-3) و (a-1).

A- التويج / Corolla

تمتلك الأزهار (5) أوراق توهجية عريضة ومتطاولة وتراوحت أطوالها بين (2.5-2) cm وعرضها (3) cm وهي بوقيبة الشكل أو قمعية Funnel shape ، بيضاء اللون إلى حمراء وردية . لوحه (3-B).

C- الأسدية / Stamens

يحتوي النوع *Convolvulus arvensis* على (5) أسدية خيطية ملتحمة عند القاعدة وغير متساوية بالطول ويصل معدلها . لوحه (C-3).cm(1).

D- المدقة / Pistil

المدقة مركبة تتكون من القلم والميس و المبيض ، المبيض بيضي (ovoid) أملس أو مشعر قليلا يبلغ طوله (2) mm ، والميس أسطواني يبدو بشكل خطي (6) mm أبيض اللون يبلغ أكثر من (1) cm طولا و يمتلك (2) ميسين طولها أكثر من (4) mm ، والمبيض محاط بحافة رقيقة برقالية أو صفراء اللون.

• الثمار Fruits

ملساء وتحتوي على (4) مصاريع على شكل علبة capsule مخروطية ومتفتحة يصل طولها (6) mm و عرضها حوالي (4) mm دائيرية بنية كما وتحوي ثمار هذا النوع على (2) من البذور . لوحه (2-F).

• البذور Seed

كانت بنية غامقة أو سوداء شبه بيضوية و تستطيع البقاء في التربة أقصى وقت ممكن ولمدة 20 سنة وتحوي على 500 بذرة لكل نبات ، أما بعد البذور فقد تراوحت بين (0.5-1.2) cm طولا و (3-4) mm عرضا ، ويختلف شكل البذور اعتمادا على عدد أنتاج الثمار حيث تكون دائيرية عندما تنتج بذرة واحدة وتكون نحيفه عندما تنتج أكثر من بذرة. لوحه (2-F).

الكساء السطحي Indumentum

جميع الأجزاء النباتية (الساق والأوراق والقتابات) للنوع *C. arvensis* كانت مغطاة بزغب (شعيرات صغيرة جدا وناعمه) ونادرًا ما يكون النبات املسا.

الدراسة التشريحية :

درست الصفات التشريحية التي تخص طبيعة الجدران العمودية لخلايا البشرة العلوية لخلايا البشرة العلوية للورقة حيث تبين ان الجدران العمودية لخلايا البشرة العليا منحنية – قليلة التموج وفيما يخص البشرة السفلية فإن جدار الخلايا فيها شديدة التموج- متنحجة . العلوي والسفلي في البشرة . وكانت إشكال الخلايا الحارسة كلوية الشكل Kidney shape وتراوحت بين الكلوي القصير العريض- الكلوي المتطاول هذا وان الأوراق كانت من النوع Amphistomatic leaf حيث توجد الثغور على السطح العلوي Abaxial surface والسطح السفلي Adaxial surface ، أما الطراز العلوي فهو من النوع الشاذ وفي كلا السطحين لوحه (4).

المناقشة :

يتبع من نتائج الدراسة النوع *C.arvensis* ومن خلال مقارنة الصفات المظهرية والتشريحية المختلفة للنوع قيد الدراسة. التباین في هذه الصفات لذا تظهر اهميتها في عزل النوع *C.arvensis* والعائد للجنس *Convolvulus*. وقد لوحظ أن لخاصية الطبيعة والبقاء في نوع الجنس أهمية تصنيفية في عزله وتشخيصه اذ تميز بطبيعة عشبيه دائميه ومعمره وقد أعتمدت هذه الصفة في معظم الموسوعات النباتية المعتمدة لوصف أنواع الاجناس كالتي وصفها (27). فقد لوحظ ان صفات الجذور كانت لها اهميه تصنيفية لا باس بها فقد كانت وتدية سميكه وتعود في اعماق التربه وهذا يوافق ما اورده كل من (21 او 21) في صفة سمك الجذر وغوره عميقا في التربه. كما وتبع من الدراسة الحالية أن للسيقان أهمية تصنيفية أكثر من الجذور وخاصة صفات الالتفاف وطبيعة النمو والتفرع والكساء السطحي. وبالنسبة لارتفاع السيقان فقد تراوحت بين (0.5-2) م وهذا وافق ما اورده (3) بخصوص طول النبات .


وبالنسبة لطبيعة الكساء السطحي فقد تباین بين الاملس والمشعر قليلا وهذا يتفق مع نتيجة ما اورده (28 ، 29) تكون هذا النوع يتباين الكساء السطحي فيه بين الاملس- المشعر قليلا جدا. بينما اظهرت صفات الاوراق اهمية يمكن الاعتماد عليها في عزل النوع واستغلالها كادله تصنيفية كشكل الورقه والقاعدة السهيميه والمزراقيه والكساء السطحي ، وتبع من البحث الحالى أن للجنس أوراق متغايرة وهي تعكس التضارب البيئي في مزيج التربة والخصوصية وهي بيوضوية. ومتطلولة أوبيوضوية وقادتها مخصصة سهيمية أو مزراقيه ، متبادلة ذات ترتيب حلزوني خطية ملساه أومشعرة قليلا، خضراء فاتحة أو غامقة وألتباين في أشكال وأنواع الأوراق ربما يعكس نموها تحت ظروف التوزيع الجغرافي حسب ماذكره (6) وهذا يتفق مع ماشار اليه (30) حيث ذكر أن الأوراق تتغير في الشكل والحجم في نفس النبات وبين نباتات نفس الانواع وأضاف أن صفات الاوراق تستعمل لتمييز وتشخيص النوع قيد الدراسة .

واظهرت صفات الاجزاء الزهريه بانها الافضل ضمن الصفات المظهرية التي يمكن استغلالها تصنيفيا ومن هذه الاجزاء صفات التورات والزهيرات في الراس الزهري والتي يمكن استغلالها كادله تصنيفية منميزة وخاصة الصفات المورفولوجيه الدقيقة كصفات الاسديه والمدققات والقلم والميسم حيث يلاحظ ثبوتيه هذه الصفات مما يجعلها صفات معول عليها اكثر من الصفات الاخرى في العديد من الانواع العائده للجنس *Convolvulus* .

واظهرت الثمار بانها يمكن استغلالها في عزل النوع بالاعتماد على الشكل الذي يكون املس ويحتوي على (4) مصاريع وعلى شكل علبة Capsule مخروطية ومتفتحة يصل طولها (6mm) وهذا يتفق مع كل من (6,7) كما وبلغ عرضها حوالي (4) mm دائريه بنية مضيئه وثمار هذا النوع تحوي (2) نوعين من البنور البنية غامقة او سوداء اللون وشببه البيوضوية الشكل وستطيع البقاء بالتربيه اقصى وقت ممكن ولمدة (20) عاما حيث أن أغلب النباتات الحقلية تبقى بذرها فعالة لمدة 20 سنة حسب ما اورده (31) ، واكثر من (50) كما وتحتوي على 500 بذره لكل نبات وهذا يوافق ماذكره كل من (10،5) كما ويختلف شكل البنور اعتمادا على عدد انتاج الثمار حيث تكون دائريه عندما تنتج بذرها واحدة وتكون نحيفه الشكل عندما تنتج اكثر من بذرها ويتتفق هذا مع ماورده (32).


وتبع من دراسة الصفات التشريحية انها اظهرت هي الاخر اهميه تصنيفية لايمكن اغفالها اذ يتبعن ان صفات خلايا البشرة العليا تختلف عن خلايا البشره السفلي حيث ان جدران الخلايا في البشرة العليا منحنية- قليله التموج في حين كانت جدران خلايا البشرة السفلي متتموجه- شديدة التموج فضلا عن اختلاف ابعد الخلايا بين السطحين.

وتبع من الدراسة ايضا بان خلايا البشرة السفلى للنوع كانت اكثر تموجا من خلايا البشرة العليا وهذا يتفق مع ماذكرته (33) من ان سبب ذلك يرتبط بطبيعة الأدمة ومقدار الضغط الذي تتعرض له الخلايا اثناء عملية تمييزها او ان ذلك ناتج عن التأثير بالظروف البيئية وهي درجات الحرارة وشدة الإضاءة ، فيما يذكر (34) لطبيعة النمو في اوراق ذوات الفاقدين دورا في تغيير أشكال جدرانها العمودية.اما الطراز التغري فهو من النوع الشاذ وفي كلا السطحين. كما اظهرت الدراسة اهميه لابس بها للكساء السطحي حيث كانت جميع الاجزاء النباتيه (الساق والاوراق والقنابات) للنوع *C.arvensis* مغطاة بزغب (شعيرات صغيرة جدا وناعمه) ونادرًا ما يكون النبات املسا. ويمكن استعمال هذه الصفة لدعم الصفات المظهرية في تشخيص النوع *C.arvensis*.



c

لوحة (1)



(A)



(B)



(C)

| 2cm



(D)



(E)



(F)

لوحة (2)

A



| 2cm




B







c

لوحة (3)



_____ 28 Mm

بشرة سفلی



بشرة عليا

**لوحة (4) التغيرات في اشكال جدران خلايا بشرة الورقه في النوع
*C. arvensis L.***

References :

- 1.Wiese,A.F & A.F phillis (1976). Field bind weed Today. 7:22-23.
- 2.Lawrence ,(1951). Toxonomy of vascular plants. the Macmillan company ,New york, 838 pp.
- 3.المياح،عبدالرضا أكبر، (2001) . تصنیف النباتات الحديث . مركز عبادي للدراسات والنشر ،صنعاء ،اليمن.
- 4-Cronquist ,A.,(1981). An Integrated system of classification of flowering plants Columbia University press. New york.
- 5-Austin,D.F. (1998). Convolvulaceae Inisteyermark, Berry,P.E.,Holst,B.K. (Eds.), Flora of the venezuelan Guyana. Caesalpinaceae- Ericaceae,4 Missouri botanical Garden Press,Stlouis ,pp.377-424.
- 6-Weaver, S.A & W.R Riley (1982).The Biology of Canadian weeds. 35.*Convolvulus arvensis L.* Canadian Journal of plant science62: 461-472.
- 7-Austin,D.F.(2000).Bindweed *Convolvulus arvensis L.* in North America from medicine to menace Bulletin of the Torrey Botanical Clab 127 (2):172-177 L.,D.L. planknehg J.V. Pancho, J.P. herpeger .(1977).

- 8- Holm, L., D.L. Plunknett, J.V. Pancho, J.P. Herberger. (1977). The world worst weed :Distribution and Biologu .University press of Hawais , Honolulu.
- 9- Swan, D.G (1980).Field bind weeds , *Convolvulus arvensis* L. Washington state University, College of Agriculture Research center ,Bulletin #0888.
- 10-Jepson ,W.L. (1953).A manual of flowering plants of California .University of California Press, Berkeley.
- 11- Omm Donell ,C.A. (1953).Convolvuloideas Chilenas . Bolsoc-Arg Bot. 6,143-184.p
- 12-Mattheio, A.K.(1995).Manual delas Malezas que Crecen Chile. ALfabta, Santiago.
- 13- Linnaeus, Species plantarum 1;153 (1753).In Flora of China *Convolvulus arvensis* 16: 289-291 (1995).
- 14-Shimi, &Termeh.(2004).Weeds of Iran Agricultare Research, Extension Organization :36 pp .
- 15.Rosenthal,S.S.& G.R. Buckingham (1982):Natural Enemieso of *Convolvulus arvensis* in Western Mediterranean Europe ,Hulgardia ,50:1-19.
16. Cromroy H.L,(1979) Eriophyoidea in Biological control of Weeds In .J.G. Rodriguezled Recent advances in Acarology, Vol. Academic press New york ,USA, 473-475pp.
- 17-ألموسوي , علي حسين,(1987) علم تصنيف النبات .وزارة التعليم العالي وأبحاث العلمي ، جامعة بغداد.
- 18-.AL-Rawi,A.H.(1964).Wild Plants of Iraq With their distribution . Tech.Bull.14,Dir Gen of Agr.Res. Iraq.Tech. plant.,15.Gover Bull .Press, Baghdad,109 pp.
- 19-Chakravarty, H.L. (1976). Plant wealth of Iraq.s:n.Guharay, Atsree saraq waty Press.LTD,505 pp.
- 20- العيداني ، طه ياسين ، (1998).دراسة تصنيفية لعائلة الطاطا الحلوة. اطروحة دكتوراه ، جامعة البصرة ، العراق .
- 21- Bailey,H.L(1963) .How plant Get their names. new York, new york,USA:Dover publication,Inc.
- 22-.Gray,A.(1970). Grays manual of Botany; ahandbook of the flowering plants and ferns of central and Northeastern United States and adjacent Canada,8th ed.D .van Nostrand Co.,New York.
- 23-Cox, H.R.(1915). the eradication of Bindweed, or wild morning-glory .U.S .Department of agriculture farmers bulletin 368.Government printing office ,Washington ,D.C.
- 24- AL-Rawi,A.H .&H.L.Chakravarty (1964). Medicinal plants of Iraq.Tech.Bull.,15.Gover.Press,Baghdad,109 pp.
- 25- مجید، سامي هاشم ومحمد، مهندجميل (1988) .النباتات والاعشاب العراقيه بين الطب الشعبي والبحث العلمي.مجلس البحث العلمي، بحوث علوم الحياة/قسم ألعاقير وتقدير الأدوية، الطبعة الاولى.
- 26- Callihan,R.H.,C.V. Eberlein,J.P.McCaffrey and Thill, D.C.(1990).Field bindweed:Biology and management.University of Idaho,cooperative Extension System,College of Agriculture Bulletin,# 719.

مجلة جامعة كربلاء العلمية – المجلد الثالث عشر - العدد الرابع / علمي / 2015

- 27-Grierson, A.J.C.(1975).In Davis ,P.H.(ED.),Flora of Turkey and East Aegean Islands.
Edinburgh, Univ.Press.Vol., 5:293-295 pp.
- 28- Gleason,H.A. and A.Cronquist. (1963). Manual of the Vascular Plants of the Northeastern United States and Adjacent Canada.D.Van Nostrand company,Inc.,Princeton ,NJ .
- 29- Fischer,B.B ,A.H.Lange and J.McCaskill.(1978) .Growers weed Identification Handbook.University of California,Agricultural Extension publication ,#4030.
- 30- Whitson , T.D.(1991). Sagebrush:Classification , Distribut , Ecology and control, James, L.F.(ED.). Noxious Range Weeds. Boulder (USA). West view Press .P. 334-341.
- 31-Brown, E.O.& R.H. Porter (1942). The viability and germination of seeds of *Convolvulus arvensis* L. and other perennial weeds.Agricultural Exp.Station,Iowa State College, Research Bulletin,#294.
- 32-Parsons,W.T.& E.G. Cuthbertson (2001).Noxious weeds of Australia .second Edition CSIRO publishing Victoria Australia.
- 33- Esau, K. (1965). Plant Anatomy. third ed., Toppan Company, Ltd., 763 pp.
- 34- Croxdal, J.L. (2000). Stomatal patterning in Angiosperms, Amer, J.Bot.87; 1069- 1080.