

**دور حامض الجبرلين والسماد المركب NPK في بعض صفات النمو والمركبات
الفعالة لصنفين من نبات البابونج Chamomile**

**The Role Of Gibberellic Acid And NPK Fertilizer On Some
Growth Characteristics And Active Compound From Two
Varieties Of Chamomile**

فاضل عليوي عطيه الريبي
مدیرية إعداد المعلمين - وزارة التربية

عباس جاسم حسين الساعدي
قسم علوم الحياة - كلية التربية (ابن الهيثم) جامعة بغداد

مستنـى من أطروحة الباحث الثاني

الخلاصة

نفذت التجربة باستخدام صنفين من نبات البابونج هما الصنف المحلي *Matricaria chamomilla L.* والصنف الألماني *Matricaria recutitia L.* في الحقل التابع للحديقة النباتية العائدة لقسم علوم الحياة في كلية التربية (ابن الهيثم) جامعة بغداد لموسم النمو 2009 – 2010 لدراسة تأثير ستة تراكيز من حامض الجبرلين (GA_3) هي (0 ، 25 ، 50 ، 75 ، 100 ، 125) جزء من المليون مع ثلاثة مستويات من السماد المركب (17:17:17) NPK هي (0 ، 50 ، 100) كغم / دونم وتدخلاتها في بعض صفات النمو والمركبات الفعالة ، وبتصميم القطاعات العشوائية الكاملة وبثلاث مكررات .

أظهرت النتائج إن تراكيز حامض الجبرلين ومستويات التسميد وتدخلاتها أثرت معمورياً في ارتفاع النبات وعدد الأفرع الخضرية وعدد النورات الزهرية والنسبة المئوية للزيت الطيار وتركيز المركبات الفعالة في الزيت الطيار لصنفي نبات البابونج . كما أظهرت النتائج تفوق الصنف المحلي على الصنف الألماني في عدد الأفرع الخضرية وعدد النورات الزهرية والنسبة المئوية للزيت الطيار فيما تفوق الصنف الألماني في صفة ارتفاع النبات . وقد أعطى التداخل بين تركيز حامض الجبرلين 75 جزء من المليون مع مستوى السماد 100 كغم / دونم أعلى القيم للصفات المدرستة .

Abstract

An experiment was conducted with the use of two varieties of chamomile plant , Local variety *Matricaria chamomilla L.* and German variety *Matricaria recutitia L.* in the field of Biological Department , College of Education (Ibn Al-Haitham) University of Baghdad for growing season of 2009-2010, to study the effect of 6 concentration of Gibberellic acid(GA_3)(0 , 25 ,50 , 75 , 100 and 125) ppm and 3 levels of NPK (17:17:17) fertilizer (0 , 50 and 100) Kg / d. and the interaction between them on some growth characteristics and active compounds according to the Randomized Complete Block Design (RCBD) with 3 replicates .

Results showed that GA_3 concentration and fertilizer level and their interaction had a significant effects on growth characteristics , plant height , number of branches and number of the inflorescence , percentage of oil and concentration of active compounds from the two varieties of chamomile especially at the concentration of 75 ppm from GA_3 and the level of 100 Kg / d. of NPK . Also, results showed , the Local variety surpassed the German variety in the number of branches , number of the inflorescence and percentage of oil, while German variety surpassed the Local variety in the height of plant.

المقدمة

يعد نبات البابونج من النباتات العشبية الشتوية الحولية ، يعود إلى العائلة المركبة Compositae ، يبلغ ارتفاعه 60 سم ، يحمل أزهار مركبة على شكل نورات زهرية ، موطنها الأصلي جنوب وشرق أوروبا (1) . ينتشر بصورة برية في شمال العراق والسهول الرسوبية الشرقي (2) . وصفه الأوروبيون بأنه الدواء أو العلاج لجميع الأمراض (3) ، الجزء الطبي المستعمل منه هو الأزهار التي تجفف لاستعمالها في الأغراض الطبية أو لإنتاج الزيت الطيار (4) .

ذكر البابونج في الموسوعة الصيدلانية لـ 26 قطراء (5) ، إذ تستعمل نورات البابونج لعلاج الكثير من الحالات المرضية المتعلقة بالمعدة والأمعاء لاحتوائها على زيت الازولين (Azulene) (6) ومفيد لحالات البرد والروماتزم والصداع والآلام الأعصاب ومضاد للالتهابات (7 ، 8 ، 9) .

يتميز نبات البابونج باحتوائه على الزيت الطيار العطري الذي يت弟兄 عند تعرضه للهواء وله رائحة عطرية ويشكل نسبة 0.5 - 1% من الوزن الجاف للنورة الزهرية ، إذ يحتوي زيته الطيار على عدد من المركبات الفعالة منها (Chamazulene ، α -bisaboloxide A Farnesene و α -bisaboloxide B) (10) .

ولقلة الدراسات حول التداخل بين حامض الجيرلين والتسميد على النباتات الطبية ، كان هذا البحث والذي يهدف إلى معرفة أفضل تركيز من حامض الجيرلين ومستوى السماد NPK للحصول على أفضل نمو ومادة فعالة في صنفي نبات البابونج .

المواد وطرق العمل

أجريت هذه التجربة في الحقل التابع للحديقة النباتية العائد لقسم علوم الحياة ، كلية التربية (ابن الهيثم) جامعة بغداد لموسم النمو 2009-2010 لغرض دراسة دور كل من حامض الجيرلين₃ GA₃ والسماد المركب NPK وتدخلاتها في بعض صفات النمو والمواد الفعالة لصنفين من نبات البابونج هما الصنف المحلي *Matricaria chamomilla L.* والصنف الألماني *Matricaria recutitia L.* . وقد استعملت ستة تراكيز من حامض الجيرلين (0 ، 25 ، 50 ، 75 ، 100 ، 125) جزء من المليون وثلاثة مستويات من السماد المركب (0 ، 50 ، 100) كغم / دونم . قسمت ارض التجربة إلى ستة أواحة رئيسية بأبعاد 3.5 × 1.5 م لكل لوح وقسم كل لوح إلى 18 وحدة تجريبية بمساحة (40 × 40) سم² حيث اخذ كل صنف من نبات البابونج ثلاثة أواحة رئيسية ، وقد انتظمت المعاملات في تصميم القطاعات العشوائية الكاملة RCBD بثلاث مكررات لكل صنف ، إذ تضمنت التجربة 108 وحدة تجريبية . أضيف السماد المركب NPK وحسب المستويات المذكورة أعلاه وعلى أساس مساحة الوحدة التجريبية تم زراعة البذور بتاريخ 1/11/2009 بعد خلطها مع قليل من التربة وتم متابعة التجربة من عمليات ري وإزالة الأدغال . تم رش التراكيز المذكورة من حامض الجيرلين لجميع الوحدات التجريبية على أوراق النباتات عندما أصبح عددها (6-4) ورقة ، وبعد مرور 84 يوم من تاريخ الزراعة أخذت عينة نباتية لكل وحدة تجريبية ممثلة بخمسة نباتات كاملة كحشة أولى رمز لها بالرمز H₁-D₈₄ ، وبعد مرور 112 يوم من تاريخ الزراعة أخذت عينة أخرى كحشة ثانية رمز لها بالرمز H₂-D₁₁₂ .

الصفات المدروسة :

- ارتفاع النبات (سم) : تم قياس ارتفاع النبات لكل وحدة تجريبية من سطح التربة ولغاية أعلى نقطة من النبات بمسطرة مدرجة وكلتا الحشتين .
- عدد الأفرع الخضرية : حسب عدد الأفرع الخضرية على كل نبات ، ثم استخرج المعدل لكل معاملة .
- عدد النورات الزهرية : تم حساب عدد النورات الزهرية الكلية المتكونة على الساق الرئيسية وتفرعاته لخمسة نباتات أخذت عشوائياً من كل وحدة تجريبية بعد 86 يوم من تاريخ الزراعة ومن ثم حساب عدد النورات الزهرية لكل نبات .
- النسبة المئوية للزيت الطيار : وزن 25 غرام من الأزهار الجافة ثم وضعت في الدورق الخاص بجهاز كليفنجر (Clevenger) وأضيف إليها 250 مل من الماء المقطر وأجريت عملية التقطر المائي Water distillation لمدة 3 ساعة لكل عينة لحين الحصول على أكبر كمية زيت ممكنة وحسب طريقة (11) ، ثم تم تقدير النسبة المئوية للزيت حسب ما ذكره (12) وفق المعادلة الآتية :

$$\text{وزن الزيت الناتج بالغرام}$$

$$\text{النسبة المئوية للزيت الطيار} = \frac{\text{وزن العينة من الأزهار بالغرام}}{100} \times \text{وزن العينة من الأزهار بالغرام}$$

- تم تشخيص المركبات الفعالة في الزيت الطيار لصنفي نبات البابونج باستعمال جهاز HPLC ، إذ تم انتقاء 48 عينة غطت 12 معاملة لكل صنف وفقاً لطريقة (13) .
- هذا وقد حللت النتائج إحصائياً حسب التصميم المتبع واستعمال أقل فرق معنوي LSD عند مستوى احتمال 95% (14) .

مجلة جامعة كربلاء العلمية – المجلد التاسع - العدد الرابع / علمي / 2011

النتائج والمناقشة

أشارت النتائج في الجدول (1) إلى تفوق الصنف الألماني معنوياً على الصنف المحلي في صفة ارتفاع النبات وبنسبة زيادة (70.01 و 34.36 %) في كلا الحشتين على التوالي . كما ازداد ارتفاع النبات بزيادة تركيز حامض الجبرلين مع تفوق التركيز 75 جزء من المليون معنوياً بإعطائه أعلى معدل في ارتفاع النبات وبنسبة زيادة (69.10 و 43.20 %) مقارنة بمعاملة السيطرة ، ولوحظ أيضاً إن معدل ارتفاع النبات قد ازداد معنوياً تحت تأثير مستوى التسميد مع تفوق مستوى التسميد 100 كغم / دونم وبنسبة زيادة (12.10 و 22.86 %) بالمقارنة مع معاملة السيطرة في كلا الحشتين ، على التوالي .

جدول (1) تأثير الصنف وتركيز حامض الجبرلين ومستوى السماد المركب (NPK) وتدخلاتها في ارتفاع النبات (سم) للحشتين لصنفي نبات البابونج

مستوى السماد NPK (كغم / دونم)								تركيز GA ₃ (ppm)	الصنف
H ₂ – D ₁₁₂			H ₁ – D ₈₄						
الصنف × تركيز GA ₃	100	50	0	الصنف × تركيز GA ₃	100	50	0		
32.48	37.40	34.00	26.05	11.52	16.07	10.07	8.11	0	محلي
37.37	40.80	36.40	34.90	13.70	17.21	13.75	10.15	25	
46.77	49.80	45.80	44.70	15.16	18.10	16.16	11.21	50	
52.40	54.40	52.20	50.60	18.24	21.09	20.42	13.22	75	
48.68	50.85	51.70	43.50	16.25	17.30	19.02	12.43	100	
45.43	44.00	49.30	43.00	13.57	13.93	15.56	11.21	125	
41.43	44.60	44.20	35.50	20.85	22.72	20.16	19.21	0	الماني
49.90	52.60	50.20	46.90	23.27	25.03	23.29	21.50	25	
65.43	69.00	68.50	58.80	26.07	27.77	26.68	23.75	50	
72.60	76.80	75.60	65.40	28.10	28.65	28.08	27.56	75	
64.13	63.30	64.80	64.30	26.77	26.06	27.60	26.66	100	
60.10	59.00	61.80	59.50	25.30	24.70	25.73	25.48	125	
5.688	n.s			n.s	n.s				LSD(0.05)
الصنف				الصنف					
43.86	46.21	44.90	40.46	14.74	17.28	15.88	11.05	محلي	الصنف × مستوى السماد NPK
58.93	60.88	60.85	55.07	25.06	25.82	25.33	24.03	الماني	
2.322	n.s			1.179	2.043				
تركيز GA ₃				تركيز GA ₃					
36.96	41.00	30.10	30.77	16.18	19.39	15.49	13.66	0	تركيز GA ₃ × مستوى NPK
43.63	46.70	43.30	40.90	18.49	21.12	18.52	15.82	25	
56.10	59.40	57.15	51.75	20.61	22.93	21.42	17.48	50	
62.50	65.60	63.90	58.00	23.17	24.87	24.25	20.39	75	
56.41	57.07	58.25	53.90	21.51	21.68	23.31	19.54	100	
52.77	51.50	55.55	51.25	19.43	19.31	20.64	18.34	125	
4.022	n.s			2.043	3.538				LSD(0.05)
	53.54	52.87	47.76		21.55	20.60	17.54	مستوى السماد NPK	
	2.844				1.444				LSD(0.05)

أما بخصوص تأثير التداخل الثنائي بين الصنف وتركيز حامض الجبرلين في هذه الصفة فقد كان غير معنوياً في الحشة الأولى ومحظياً في الحشة الثانية إذ تفوق الصنف الألماني على الصنف المحلي وبنسبة زيادة 38.55% عند تركيز حامض الجبرلين 75 جزء من المليون ، بينما كان تأثير التداخل الثنائي بين الصنف ومستوى التسميد في هذه الصفة معنوياً في الحشة الأولى وغير معنوياً في الحشة الثانية ، ففي الحشة الأولى تفوق الصنف الألماني عند مستوى التسميد 100 كغم / دونم وبنسبة زيادة 49.42% مقارنة بالصنف المحلي عند مستوى التسميد نفسه أعلاه . أما بالنسبة لتأثير التداخل الثنائي بين تركيز حامض الجبرلين ومستوى التسميد في هذه الصفة فقد كان معنوياً في الحشة الأولى وغير معنوياً في الحشة الثانية ، ففي الحشة الأولى تفوق تركيز حامض الجبرلين 75 جزء من المليون مع مستوى التسميد 100 كغم / دونم وبنسبة زيادة 82.06% مقارنة بمعاملة السيطرة ، بينما لم تكن هناك فروق معنوية لتأثير التداخل الثنائي بين الصنف وتركيز حامض الجبرلين ومستوى التسميد في صفة ارتفاع النبات ولكلتا الحشتين .

إن الاختلاف بين صنفي النبات في صفة الارتفاع يمكن أن يعزى إلى الاختلاف الوراثي بينهما ، إذ أن الأصناف النباتية تختلف وراثياً عن بعضها في صفات النمو الخضري ومنها صفة ارتفاع النبات . كما أن الزيادة في ارتفاع النبات لكلا الصنفين يعزى إلى دور حامض الجبرلين في زيادة انقسام واستطالة الخلايا

(15) إذ يؤثر حامض الجبرلين في زيادة مرنة جدران الخلايا فضلاً عن دوره في زيادة انقسام خلايا المنطقة تحت القبة للمرستيم القمي (16) . تتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه كل من (10 و 17) في دراستهم لنباتي البابونج والخردل ، على التوالي .

كما أن مستويات السماد NPK أثرت إيجابياً في صفة ارتفاع النبات ، وتعزى هذه الزيادة إلى دور العناصر الغذائية الثلاثة (N و P و K) في تحسيين الفعاليات الحيوية للنبات ، فالتنزوجين يحفز النبات على إنتاج الاوكسجين (IAA) مما يشجع الانقسام الخلوي واستطالة الخلايا وبذلك يزداد ارتفاع النبات (18) . فضلاً عن دور الفسفور في معظم الفعاليات الحيوية ومشاركته في تكوين المركبات الغنية بالطاقة مثل (CTP ، GTP ، UTP ، ATP) (19) .

أما بالنسبة لعدد الأفرع الخضرية فقد أظهرت النتائج في الجدول (2) تفوق الصنف المحلي على الصنف الألماني في هذه الصفة وبنسبة زيادة (42.81 و 32.42 %) في كلا الحشتين ، على التوالي . كما أكدت النتائج أن حامض الجبرلين أعطى زيادة معنوية في هذه الصفة وكان أفضلها عند التركيز 75 جزء من المليون وبنسبة زيادة (48.77 و 62.74 %) مقارنة بمعاملة السيطرة ولكلتا الحشتين ، على التوالي وازداد أيضاً عدد الأفرع الخضرية معنويًا بتأثير التسميد وكان أفضلها عند مستوى التسميد 100 كغم / دونم وبنسبة زيادة (25.22 و 26.60 %) بالمقارنة مع معاملة السيطرة ولكلتا الحشتين ، على التوالي . وفيما يخص التداخل الثنائي بين الصنف وتركيز حامض الجبرلين فقد كان تأثيره معنويًا في هذه الصفة ولكلتا الحشتين مع تفوق الصنف المحلي على الصنف الألماني وكان أفضلها عند التركيز 75 جزء من المليون إذ بلغ (4.82 و 4.32) فرع / نبات وللخشتين ، على التوالي ، بينما أعطى الصنف الألماني (3.75 و 4.27) فرع / نبات عند التركيز أعلاه نفسه من حامض الجبرلين . كما أن تأثير التداخل الثنائي بين الصنف ومستوى التسميد في هذه الصفة كان معنويًا في الحشة الأولى إذ تفوق الصنف المحلي عند مستوى التسميد (50 و 100) كغم / دونم وبنسبة زيادة (45.85 و 38.77 %) بالمقارنة مع الصنف الألماني عند مستوى التسميد ، على التوالي ، ولم يكون التأثير معنويًا في الحشة الثانية . كما أظهرت معاملات التداخل الثنائي بين تركيز حامض الجبرلين ومستوى التسميد زيادة معنوية في هذه الصفة ، مع تفوق تركيز حامض الجبرلين 75 جزء من المليون مع مستوى التسميد 100 كغم / دونم معنويًا على بقية المعاملات وبنسبة زيادة (140.00 و 115.38 %) مقارنة بمعاملة السيطرة ولكلتا الحشتين ، على التوالي . كذلك كانت الزيادة في هذه الصفة معنوية نتيجة التداخل الثنائي بين عوامل الدراسة مع تفوق الصنف المحلي عند تركيز حامض الجبرلين 75 جزء من المليون ومستوى التسميد (50 ، 100) كغم / دونم وبنسبة زيادة (32.00 و 25.88 %) بالنسبة للخشة الأولى و (33.33 و 24.00 %) بالنسبة للخشة الثانية مقارنة بالصنف الألماني عند مستوى التسميد أعلاه نفسه .

إن اختلاف صنفي البابونج في عدد الأفرع الخضرية ربما يعزى إلى اختلافهما وراثياً ، فضلاً عن العلاقة بين ارتفاع النبات وعدد تفرعاته ، فقد أشارت النتائج إلى أن الصنف المحلي أقل ارتفاعاً من الصنف الألماني (جدول 1) فكان الصنف المحلي أكثر عدداً للأفرع الخضرية بسبب توزيع المادة الغذائية في النبات (20) . كما تعزى الزيادة في عدد الأفرع الخضرية إلى دور كل من حامض الجبرلين في تحفيزه وتشجيعه للنمو الخضري وتحفيض حدة السيادة القمية وليس إلغائها (21) ، وإلى دور العناصر الغذائية (N و P و K) في تحسيين عملية البناء الضوئي وإنتاج السايتوكابينيات الخاصة بتشجيع نمو البراعم الجانبيّة ، فضلاً عن تأثيرها في زيادة مستوى الاوكسجين في النبات وبالتالي يعمل على تقليل السيادة القمية الظرفية ومن ثم تشجيع البراعم الجانبية على النمو (22) . تتفق هذه النتائج مع كل من (10 و 23 و 24) في نباتات البابونج والقرنفل والخلة الشيطاني ، على التوالي .

مجلة جامعة كريلاء العلمية – المجلد التاسع - العدد الرابع / علمي / 2011

جدول (2) تأثير الصنف وتركيز حامض الجبرلين ومستوى السماد المركب (NPK) وتدخلاتها في عدد الأفرع الخضرية / نبات للحشتين لصنفي نبات البابونج

مستوى السماد NPK (كغم / دونم)								تركيز GA ₃ (ppm)	الصنف				
H ₂ – D ₁₁₂			H ₁ – D ₈₄										
الصنف × تركيز GA ₃	100	50	0	الصنف × تركيز GA ₃	100	50	0						
3.77	4.45	3.85	3.00	3.17	4.00	3.25	2.25	0	محلي				
4.30	4.80	4.25	3.85	3.90	4.30	3.85	3.55	25					
4.68	5.15	4.75	4.15	4.25	4.74	4.15	3.85	50					
5.43	6.20	5.40	4.70	4.82	5.35	4.95	4.15	75					
4.40	4.25	4.80	4.15	4.38	4.70	4.45	4.00	100					
3.65	3.60	3.85	3.50	3.33	3.15	3.60	3.25	125					
2.75	3.25	2.80	2.20	2.10	2.50	2.05	1.75	0					
2.97	3.45	3.00	2.45	2.42	2.85	3.35	2.05	25					
3.32	3.90	3.30	2.75	2.68	3.15	2.65	2.25	50					
4.27	5.00	4.05	3.75	3.75	4.25	3.75	3.25	75					
3.57	3.90	3.70	3.10	3.12	3.60	3.05	2.70	100					
2.95	2.75	3.20	2.90	2.63	2.55	2.75	2.60	125					
0.142	0.245			0.107	0.186			LSD(0.05)					
الصنف				الصنف				الصنف × مستوى السماد NPK	الصنف × مستوى السماد NPK				
4.37	4.74	4.48	3.89	3.97	4.37	4.04	3.51						
3.30	3.71	3.34	2.86	2.78	3.15	2.77	2.43						
0.058	n.s			0.044	0.076								
تركيز GA ₃				تركيز GA ₃				تركيز GA ₃ × مستوى NPK	تركيز GA ₃ × مستوى NPK				
3.26	3.85	3.32	2.60	2.63	3.25	2.65	2.00						
3.63	4.12	3.62	3.15	3.16	3.57	3.10	2.80						
4.00	4.52	4.02	3.45	3.47	3.95	3.40	3.05						
4.85	5.60	4.72	4.22	4.28	4.80	4.35	3.70						
3.98	4.07	4.25	3.62	3.75	4.15	3.75	3.35						
3.30	3.17	3.52	3.20	2.98	2.85	3.17	2.92						
0.100	0.174			0.076	0.132								
								LSD(0.05)					
				4.22	3.91	3.37			مستوى السماد NPK				
				0.071				3.76	3.40	2.97			
								0.054	LSD(0.05)				

مجلة جامعة كريلاء العلمية – المجلد التاسع - العدد الرابع / علمي / 2011

أما بالنسبة لعدد النورات الزهرية فقد أشارت النتائج في الجدول (3) إلى تفوق الصنف المحلي معمونيا على الصنف الألماني وبنسبة زيادة 16.27 % ، كما كانت الزيادة معمونية لعدد النورات الزهرية بزيادة تركيز حامض الجبرلين وكان أفضلها عند التركيز 75 جزء من المليون وبنسبة زيادة 90.81 % مقارنة بمعاملة السيطرة . وعمونية أيضا بزيادة مستوى التسميد وكان أفضلها عند مستوى التسميد 100 كغم / دونم وبنسبة زيادة 14.50 % مقارنة بمعاملة السيطرة .

جدول (3) تأثير الصنف وتركيز حامض الجبرلين ومستوى السماد المركب (NPK) وتدخلاتها في عدد النورات الزهرية لصنفي نبات البابونج

الصنف × تركيز GA ₃	مستوى السماد NPK (كغم / دونم)			تركيز GA ₃ (ppm)	الصنف	
	100	50	0			
24.87	27.60	24.00	23.00	0	محلي	
31.73	36.15	31.95	27.10	25		
36.22	39.95	36.25	32.45	50		
46.92	50.20	47.95	42.60	75		
43.25	42.85	44.95	41.95	100		
39.92	39.30	40.00	40.45	125		
21.93	25.85	20.95	19.00	0	الماني	
27.32	31.05	26.90	24.00	25		
33.02	36.90	32.55	29.60	50		
42.38	48.60	41.65	36.90	75		
34.65	33.55	34.95	35.45	100		
32.38	30.40	33.00	33.75	125		
0.768	1.330			LSD(0.05)		
الصنف						
37.15	39.34	37.52	34.59	محلي	الصنف × مستوى السماد NPK	
31.95	34.39	31.67	29.78	الماني		
0.314	0.543			LSD(0.05)		
تركيز GA ₃						
23.40	26.72	22.47	21.00	0	تركيز GA ₃ × مستوى NPK	
29.52	33.60	29.42	25.55	25		
34.62	38.42	34.40	31.03	50		
44.65	49.40	44.80	39.75	75		
38.95	38.20	39.95	38.70	100		
36.15	34.85	36.50	37.10	125		
0.543	0.941			LSD(0.05)		
	36.86	34.59	32.19	مستوى السماد NPK		
	0.384			LSD(0.05)		

وأشار الجدول (3) أيضاً إلى وجود فروق معنوية نتيجة التداخل الثنائي بين الصنف وكل من تركيز حامض الجبرلين أو مع مستوى التسميد إذ تفوق الصنف المحلي على الصنف الألماني وكان أفضلها عند تركيز حامض الجبرلين 75 جزء من المليون وبنسبة زيادة 19.78 % بالمقارنة مع الصنف الألماني عند التركيز نفسه من حامض الجبرلين ، كذلك تفوق عند مستوى التسميد (50 و 100) كغم / دونم وبنسبة زيادة (14.39 و 18.47) % بالمقارنة مع الصنف الألماني عند مستوى التسميد أعلىه . أما التداخل الثنائي بين تركيز حامض الجبرلين ومستوى التسميد في هذه الصفة فقد كان معنوياً هو الآخر وقد سجل تركيز حامض الجبرلين 75 جزء من المليون مع مستوى التسميد (50 و 100) كغم / دونم تفوقاً على بقية المعاملات وبنسبة زيادة (13.33 و 13.24) % مقارنة بمعاملة السيطرة . كما أشار الجدول نفسه إلى تفوق الصنف المحلي على الصنف الألماني معنوياً نتيجة التداخل الثلاثي بين عوامل الدراسة وكان أفضلها عند التركيز 75 جزء من المليون من حامض الجبرلين ومستوى التسميد 100 كغم / دونم باعطائه أعلى القيم إذ بلغت 50.20 نورة زهرية فيما أعطى الصنف الألماني 48.60 نورة زهرية .

إن زيادة عدد النورات الزهرية عند المعاملة بحامض الجبرلين ربما تعزى إلى العلاقة الإيجابية بين دور حامض الجبرلين في زيادة النمو الخضري وزيادة عدد الأفرع الخضرية (جدول 2) مما انعكس ذلك على زيادة عدد النورات الزهرية ، فضلاً عن الخصائص الفسيولوجية لحامض الجبرلين في دوره في تحفيز هرمونات التزهير (الفلوريجين) وكسر السبات في البراعم الزهرية (25) . كما تعزى الزيادة إلى الدور الفعال للعناصر الغذائية (N و P و K) في العمليات الحيوية للنبات ومنها زيادة عدد الأفرع الخضرية والذي يعمل بدوره في زيادة عدد النورات الزهرية . تتفق هذه النتيجة مع ما حصل عليه (26) عند استخدامه السماد الفوسفاتي لنباتات الحبة السوداء وتتفق مع (27) عند استخدامه للسماد الفوسفاتي والبوتاسي لنباتات الأقوحان . كما أشارت النتائج في الجدول (4) إلى التفوق المعنوي للصنف المحلي على الصنف الألماني في النسبة المئوية للزيت الطيار بإعطائه أعلى معدل لهذه الصفة التي بلغت 0.87 % بينما أعطى الصنف الألماني معدل 0.83 % .

وبينت النتائج في الجدول نفسه إن تراكيز حامض الجبرلين أعطت زيادة معنوية في معدل النسبة المئوية للزيت الطيار وكان أفضلها عند التركيز 75 جزء من المليون وبنسبة زيادة 430.77 % بالمقارنة مع معاملة السيطرة وكذلك بزيادة مستويات التسميد و كان أفضلها عند مستوى التسميد 50 كغم / دونم إذ بلغ 0.88 % . وأشارت النتائج في الجدول (4) إلى تفوق الصنف المحلي على الصنف الألماني نتيجة التداخل الثنائي بين الصنف وتركيز حامض الجبرلين وكان أفضلها عند التركيز 75 جزء من المليون إذ بلغ 1.41 % بينما أعطى الصنف الألماني معدل 1.35 % ، ولم يكن التأثير معنوياً نتيجة التداخل الثنائي بين الصنف ومستوى التسميد في هذه الصفة . أما التداخل الثنائي بين تركيز حامض الجبرلين ومستوى التسميد في هذه الصفة فقد كان معنوياً ، وقد سجل تركيز حامض الجبرلين 75 جزء من المليون مع مستوى التسميد (50 و 100) كغم / دونم تفوقاً معنوياً على بقية المعاملات وبمعدل (1.40 و 1.47) % لمستوى التسميد أعلىه ، على التوالي فيما أعطت معاملة السيطرة أقل معدل النسبة المئوية للزيت الطيار . في حين لم يكن هناك فروق معنوية لتأثير التداخل الثلاثي بين عوامل الدراسة في هذه الصفة ، إلا أن الصنف المحلي أعطى أعلى القيم عند تراكيز جميع تركيزات الجبرلين ومستويات التسميد .

قد يعزى سبب زيادة نسبة الزيت الطيار نتيجة المعاملة بحامض الجبرلين إلى دوره في زيادة الانقسام الخلوي مما يؤدي إلى تكوين مراكز نمو ثانوية داخل النورة الزهرية ، فضلاً عن دوره في زيادة كفاءة البناء الضوئي والتحكم في توجيهه انقال المواد الغذائية من الأوراق إلى الأزهار (28) مما انعكس ذلك على زيادة نسبة الزيت الطيار الذي يعد من أهم المنتجات الثانوية لعملية البناء الضوئي . وقد يعزى أيضاً إلى دور العناصر الغذائية (N و P و K) في زيادة المجموع الخضري (جدول 1 و 2) الذي يؤدي إلى زيادة كفاءة البناء الضوئي والعمليات الحيوية الأخرى مما يؤدي إلى تراكم الكربوهيدرات فينعكس ذلك على زيادة المركبات الثانوية في النورة الزهرية والتي منها الزيوت الطيارة . تتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه (10) في دراستهم على نبات البابونج بعد رشه بحامض الجبرلين بتركيز 25 و 50 و 100 ملغم / لتر . كما تتفق مع ما توصل إليه (29) الذين أشاروا إلى أن توفر العناصر الغذائية المهمة كالنتروجين والفسفور كان سبباً في زيادة النمو الخضري والزهرى وقد انعكس ذلك على نسبة الزيت الطيار في أزهار البابونج .

مجلة جامعة كريلاء العلمية – المجلد التاسع - العدد الرابع / علمي / 2011

جدول (4) تأثير الصنف وتركيز حامض الجيرلين ومستوى السماد المركب (NPK) وتدخلاتها في النسبة المئوية للزيت الطيار (%) لصنفي نبات البابونج

الصنف × تركيز GA_3	مستوى السماد NPK (كغم / دونم)			تركيز GA_3 (ppm)	الصنف
	100	50	0		
0.27	0.36	0.24	0.20	0	محلي
0.57	0.66	0.54	0.50	25	
1.15	1.22	1.20	1.04	50	
1.41	1.50	1.45	1.29	75	
1.09	0.82	1.25	1.20	100	
0.76	0.65	0.81	0.81	125	
0.25	0.35	0.21	0.20	0	الماني
0.54	0.63	0.52	0.48	25	
1.12	1.17	1.14	1.04	50	
1.35	1.44	1.36	1.24	75	
1.03	0.77	1.17	1.16	100	
0.68	0.55	0.76	0.73	125	
0.019	n.s			LSD(0.05)	
الصنف					
0.87	0.87	0.91	0.84	محلي	الصنف × مستوى السماد NPK
0.83	0.82	0.86	0.81	الماني	
0.008	n.s			LSD(0.05)	
تركيز GA_3					
0.26	0.35	0.22	0.20	0	تركيز GA_3 × مستوى السماد NPK
0.55	0.64	0.53	0.49	25	
1.13	1.19	1.17	1.04	50	
1.38	1.47	1.40	1.26	75	
1.06	0.79	1.21	1.18	100	
0.72	0.60	0.78	0.77	125	
0.014	0.023			LSD(0.05)	
	0.84	0.88	0.82	مستوى السماد NPK	
	0.010			LSD(0.05)	

وأظهرت النتائج في الجدول (5) أن الزيت الطيار المستخلص من أزهار صنفي نبات البابونج احتوى على عشرة مركبات فعالة تم تشخيصها باستخدام تقنية HPLC وهي (Chamazulene ، Caryophyllene ، α-pinene ، p-Trans-B-α-bisabolene oxide A ، Limonene ، α-bisaboloxide A ، cymene Camphene ، farnesene) . وقد ازداد تركيز هذه المركبات بزيادة تراكيز حامض الجبرلين ومستويات التسميد بالمقارنة مع معاملة السيطرة ، مع تفوق تركيز حامض الجبرلين 75 جزء من المليون مع مستوى التسميد 100 كغم / دونم على بقية المعاملات بإعطائه أعلى تركيز لمعظم المركبات الفعالة ، وعندما تفوق الصنف المحلي على الصنف الألماني بإعطائه أعلى تركيز لخمسة مركبات فعالة هي (Limonene ، Trans-B-farnesene ، α-bisabolene oxide A ، p-cymene ، α-bisaboloxide A) وبنسبة زيادة (38.28 ، 28.28 ، 21.30 ، 14.63 ، 3.87) % ، على التوالي . بينما تفوق الصنف الألماني على الصنف المحلي بإعطائه أعلى تركيز للمركبات الفعالة الخمس الأخرى وهي (Chamazulene ، Caryophylrene ، α-pinene ، α-bisaboloxide A ، α-bisaboloxide B) وبنسبة زيادة (114.02 ، 103.97 ، 20.50 ، 74.59 ، 43.92) % ، على التوالي عند تركيز حامض الجبرلين نفسه ومستوى التسميد أعلى .

إن زيادة تركيز المركبات الفعالة قد يعزى إلى دور كل من حامض الجبرلين والعناصر الغذائية (N و P و K) في زيادة النمو الخضري والزهري مما أدى إلى زيادة النواتج الأساسية للتمثيل الغذائي والنواتج الثانوية المتمثلة بالمركبات الفعالة في الزيت الطيار ، إذ أن الطاقة الكيميائية الناتجة من عملية البناء الضوئي تستغل في عمليات أخرى داخل النبات ومنها إنتاج المركبات الرئيسية للزيت الطيار والناتجة من المسالك الأيضية الأولية مثل Acetyl CO A من خلال مسلك الميفالونك (Mevalonic acid) الذي تتكون منه مركبات أحادية الحلقة (Monoterpenes) ومركب Phosphoenol pyruvate (PEP) من خلال مسلك حامض الشكميك (Shikimic acid) الضروري لتكوين المركبات العطرية (15 و 30) ، فضلاً عن دور حامض الجبرلين في السيطرة على البناء الحيوي للزيت الطيار من خلال المسار الأيضي لحامض الميفالونك (10) . تتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه (10) الذين حصلوا على زيادة في نسبة المركبات الفعالة عند معاملة نبات البابونج بتراكيز متزايدة من حامض الجبرلين، وتتفق أيضاً مع ما توصل إليه كل من (31 ، 32) عند دراستهم باستخدام التسميد التتروجيني والفوسفاتي لنباتي الشبت والينسون ، على التوالي .

ما تقدم يستنتج أن المعاملة بحامض الجبرلين والسماد المركب NPK والتداخل بينهما أدى إلى زيادة قيم الصفات المدروسة لاسيما عند التركيز 75 جزء من المليون من حامض الجبرلين ومستوى التسميد 100 كغم / دونم .

المصادر

1. حسين ، فوزي طه قطب (1981) . النباتات الطبية زراعتها ومكوناتها . مطبعة دار المريخ للنشر ، الرياض ، السعودية .
2. Al-Rawi ,A. and Chakraverty , H.L. (1988). Medicinal Plants of Iraq . 2nd edn. Ministry of Agric . and Irrigation .Baghdad ,Iraq , pp . 109 .
3. Berry , M. (1995) . Herbal Products . part 6 . Chamomile Pharma. J., 254: 191- 193
4. الزبيدي ، زهير نجيب ؛ بابان ، هدى عبد الكريم وفليح ، فارس كاظم (1996) . دليل العلاج بالأعشاب الطبية العراقية ، شركة أب للطباعة الفنية المحدودة ، بغداد – العراق .
5. Doust , S.K. and Noorafshan , A. (2009). Antiulcerogenic effects of *Matricaria chamomilla* extract in experimental gastric ulcer in Mice . Iran J. Med. Sci., 34 (3) : 198-203 .
6. Khattab , M.E. and Omer E.A. (1999) . Cultivation of medical aromatic plants . National Research Center . Dokki .Egypt . J. Hort., 26 (3) : 248-265 .
7. مجید ، سامي هاشم و محمود ، مهند جميل (1988) . النباتات والأعشاب العراقية بين الطب الشعبي والبحث العلمي . مجلس البحث العلمي . مركز علوم الحياة ، قسم العقاقير وتقييم الأدوية .
8. Michelle , M. (1981) . Health Secrets of Medicinal Herbs . Arco Publishing . Inc. New York .
9. Evans , W.C. (2004) . Trease and Evans Pharmacognosy . 15th ed. Elsevier Limited pp: 227-283 .
10. Reda , F. ; Abd El-Wahed , M.S.A. and Gamal El-Din , K.M. (2010) . Effect of Indole acetic acid , Gibberellic acid and Kinetin on vegetative growth , flowering , essential oil pattern of chamomile plant (*Chamomile recutitia* L. Rausch). World J.Agric. Sci. , 6 (5) : 595-600 .
11. Chalchat , J.C. ; Garry , R.P. and Michet , A. (1991) . Chemical composition of essential oil of *Calendula officinalis* L. Flavour and Frogrance J. , 69 : 189-192 .
12. Guenther , E. (1972) . The Essential Oils . Van Nostrand Co. Inc. New York .
13. Chen , B. H. ; Vhuang , J. R. ; Lin , J. H. and Chiu , C. P. (1993) . Quantification of provitamin compounds in Chinese vegetables by high performance liquid chromatography , J. Food Protection , 56 (1) : 51-54 .
14. Little , L. P. and Hills , F. J. (1978) . Agricultural Experimentation Design and Analysis . John Wiley and Sons . New York .
15. Taiz , L. and Zeiger , E. (2002) . Plant Physiology , 3rd ed. 690 pp.
16. Jain , V. K. (2008) . Fundamental of Plant Physiology . S. Chand and Company . LTD . New Delhi , India .
17. Akter , A. ; Ali , E. ; Islam , M.M.Z. ; Karim , R. and Razzaque , A.H.M. (2007) . Effect of GA₃ on growth and yield of Mustard . Int. J. Sustain . Crop Produ., 2 (2) : 16 – 20 .
18. ارسلان ، عبد الحميد (1974) . الكراس النظري في خصوبة التربة والتسميد . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مؤسسة المعاهد الفنية ، المعهد الزراعي الفني – ابو غريب .
19. النعيمي ، سعد الله نجم عبد الله (1999) . الأسمدة وخصوبة التربة ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – العراق .
20. عطية ، حاتم جبار وجذوع ، خضير عباس (1999) . منظمات النمو النباتية ، النظرية والتطبيقية ، مطبعة المكتبة الوطنية . بغداد – العراق .
21. عبدالوهاب ، كريم صالح (1991) . فسيولوجيا النبات المتقدم ، الجزء الأول . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . جامعة صلاح الدين – العراق .
22. Hamman , R. A. ; Dami , E. ; Waish , T.M. and Stushnoff , C. (1996) . Seasonal carbohydrate changes and gold hardness of chardonnay and Riesling grapevines . Amer. J. Enol. Vitic. , 47 (1) : 43-48 .
23. الجلي ، عبد الرزاق عثمان حسن (2001) . تأثير السماد النتروجيني والبوتاسي في النمو الخضري والزهري لنبات القرنفل *Dianthus caryophyllus* L. . مجلة البصرة للعلوم الزراعية . 14 (3) : 56-49 .

مجلة جامعة كربلاء العلمية – المجلد التاسع - العدد الرابع / علمي / 2011

24. هدوان ، حميد علي ؛ عباس ، إبراهيم صالح ؛ عذافة ، عبد الكريم حسن ومطشر ، فيصل كاظم (2009) . تأثير التسميد النتروجيني والفوسفاتي في نمو وإنتجالية نبات الخلة الشيطاني *Ammi majus* L. مجلة الزراعة العراقية . 14 (9) : 176-181 .
25. ابو زيد ، نصر الشحات (2000) . الهرمونات النباتية والتطبيقات الزراعية . الدار العربية للنشر والتوزيع . القاهرة – مصر .
26. البياتي ، حسين على هندي (2003) . تأثير مستويات مختلفة من السماد الفوسفاتي والسماد العضوي في الحاصل ومكوناته وكمية الزيت الثابت والطيار لنبات الحبة السوداء *Nigella sativa* L. رسالة ماجستير . كلية الزراعة . جامعة تكريت – العراق .
27. عباس ، جمال احمد (2009) . تأثير الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية في النمو الخضري والزهري وحاصل البذور لنبات الأقحوان *Calendula officinalis* L. مجلة الزراعة العراقية 14 . (2) : 122 – 129 .
28. صالح ، مصلح محمد سعيد (1991) . فسيولوجيا منظمات النمو النباتية . الطبعة الأولى . دار الكتب للطباعة والنشر . جامعة صلاح الدين . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . العراق .
29. عباس ، إبراهيم صالح ؛ الشمام ، سحر ضياء ؛ هدوان علي وبديوي ، مزهر عبد الله (2009) . تأثير التسميد النتروجيني والفوسفاتي في نمو وحاصل ومحتوى زيت اليابونج *Matricaria chamomilla* L. مجلة الزراعة العراقية . 14 (7) : 194-199 .
30. Herrmann , K.M. and Weaver , L.M. (1999) . The shikimate pathway . Annu. Rev. Plant Physiol. Mol. Biol.,50: 473-503(Cited from Taiz and Zeiger , 2002) .
31. السامرائي ، مدحية حمودي حسين (2001) . تأثير التسميد النتروجيني والفوسفاتي وموعد الزراعة في نمو وكمية الزيت في نبات الشبنـت *Anethum graveolens* L. رسالة ماجستير . كلية الزراعة . جامعة بغداد-العراق .
32. الجار الله ، كفاح كامل حمزة (2001) . تأثير مواعيد الزراعة والتسميد النتروجيني على حاصل وكمية ونوعية المادة الفعالة لنبات البنـسون *Pimpinellea arism* L. رسالة ماجستير . كلية الزراعة . جامعة بغداد – العراق .

جدول (5) تأثير الصنف وتركيز حامض الجبرلين ومستوى السماد المركب (NPK) وتدخلاتها في تركيز المركبات الفعالة (مايكرو غرام . ملليلتر⁻¹) لعينات من الزيت الطيار لصنفي

المعاملات												المركبات المشخصة			
(100) NPK				(50) NPK				(0) NPK							
GA3 100ppm	GA3 75ppm	GA3 50ppm	GA3 (0)	GA3 100ppm	GA3 75ppm	GA3 50ppm	GA3 (0)	GA3 100ppm	GA3 75ppm	GA3 50ppm	GA3 (0)				
15.55	125.26	34.20	15.68	40.60	81.01	161.44	7.37	33.66	35.24	59.96	4.91	α -pinene			
86.34	95.40	68.45	43.81	2.54	94.02	126.74	28.91	10.21	38.88	52.05	24.49	Caryophylene			
115.77	154.43	67.98	51.65	104.73	138.55	101.17	35.80	25.99	0.26	62.20	41.53	Chamazulene			
247.19	623.06	636.65	41.50	275.64	199.97	114.98	183.92	118.53	288.62	164.73	118.89	p-cymene			
284.96	391.29	863.18	401.50	290.21	379.71	122.06	202.57	55.44	244.57	221.24	143.01	α -bisaboloxide A			
119.55	156.23	264.39	91.18	148.18	132.89	97.47	64.73	41.22	246.72	78.26	43.11	α -bisaboloxide B			
56.63	733.42	173.17	438.42	149.87	693.80	120.89	163.42	30.14	345.59	108.68	11.19	α -bisabolene oxide A			
130.51	359.64	45.39	161.71	147.47	396.97	200.45	70.75	93.04	833.76	93.81	53.78	Limonene			
59.50	977.74	333.79	62.70	99.98	187.03	155.56	48.47	103.67	185.69	78.09	36.68	Trans-B-farnesene			
58.53	376.29	89.47	54.83	104.31	116.65	100.59	32.46	51.89	202.09	48.91	9.33	camphene			
52.53	180.28	159.79	188.79	68.28	196.20	121.76	126.10	52.35	122.10	37.76	19.26	α -pinene			
40.72	166.56	124.00	135.84	45.35	182.73	76.03	59.82	44.37	59.54	28.03	16.21	Caryophylene			
33.38	186.09	152.61	103.11	20.42	137.00	71.26	51.89	38.67	90.49	27.22	13.85	Chamazulene			
216.57	599.82	196.80	309.87	132.25	579.68	385.59	280.70	186.54	338.28	207.21	133.61	p-cymene			
266.99	798.11	455.40	501.52	120.25	823.27	424.21	335.27	194.39	403.58	222.27	169.27	α -bisaboloxide A			
168.77	334.36	140.26	201.62	0.14	153.52	125.50	82.18	63.53	83.73	15.58	40.77	α -bisaboloxide B			
292.61	571.71	367.28	287.49	135.58	263.12	386.53	228.04	146.27	324.89	254.40	21.19	α -bisabolene oxide A			
107.19	313.75	295.52	0.83	96.27	226.48	150.95	139.93	69.15	110.94	67.44	31.52	Limonene			
213.77	806.07	251.58	25.91	140.94	629.21	260.22	177.73	123.59	308.18	173.89	67.17	Trans-B-farnesene			
84.94	272.12	157.60	529.65	86.84	195.11	107.23	130.02	72.01	79.75	66.94	29.61	Camphene			