

## **Prediction of Consistency Limits by using some of Soil Physio-chemical properties for chosen soils in Basrah province**

### **التبؤ بحدود القوام من خلال تقييم بعض الخصائص الفيزيوكيميائية لتراب مختارة من محافظة البصرة**

كوثر عزيز الموسوي

علوم التربة والموارد المائية – كلية الزراعة – جامعة البصرة

#### **الخلاصة**

اجريت هذه الدراسة للتبؤ عن حدود القوام (حد الانكمash وحد اللدانة وحد السيولة ودليل اللدانة) من خلال ايجاد العلاقات بين هذه الحدود كدالة لبعض خصائص التربة المتمثلة بنسبة الطين والمادة العضوية وكarbonات الكالسيوم ونسبة امتراز الصوديوم والايصالية الكهربائية لمجموعة ترب متباعدة في هذه الخصائص وبواقع ثمان ترب من محافظة البصرة وهي تربة كل من الفاو والسيبة وابو الخصيب والبراضعية والتقومة والهارثة والدير والقرنة .

اظهرت النتائج ان قيم حد الانكمash تراوحت بين ( 2.0 - 8.5 ) % لكل من تربتي الدير والقرنة على التوالي ، اما معدلات حد اللدانة فقد تراوحت بين ( 22.03 - 25.88 ) % لترب الدير وابو الخصيب في حين تراوحت قيم حد السيولة بين ( 38.00 - 49.00 ) % ودليل اللدانة بين ( 12.43 - 23.12 ) % لتربيتي السيبة وابو الخصيب، على التوالي .

بينت النتائج ان كمية الطين تراوحت بين ( 511.73 - 95.24 ) غم كغم<sup>-1</sup> لتربيتي القرنة وابو الخصيب، على التوالي ، وترأوحت كمية المادة العضوية لتربيتي التقومة والبراضعية بين ( 38.85 - 2.68 ) غم كغم<sup>-1</sup> على التوالي ، اما كarbonات الكالسيوم فقد تراوحت بين ( 427.80 - 206.20 ) غم كغم<sup>-1</sup> لترب البراضعية والسيبة، على التوالي . سجلت تربة الدير اقل القيم لنسبة امتراز الصوديوم والايصالية الكهربائية وكانت 3.08 و 5.12 ديسيسيمتر م<sup>-1</sup> على التوالي في حين اعطت تربة الهارثة اعلى القيم وبلغت 9.26 و 120.00 ديسيسيمتر م<sup>-1</sup> ، على التوالي .

اظهرت النتائج وجود علاقة خطية بسيطة بين حد الانكمash ونسبة امتراز الصوديوم وبمعامل ارتباط  $r = 0.927$  وزاد معامل الارتباط بين حد الانكمash ونسبة امتراز الصوديوم والايصالية الكهربائية ليصل الى  $r = 0.976$ . اما العلاقة المتعددة الحدود بين حد الانكمash وكمية كل من المادة العضوية ونسبة امتراز الصوديوم مع الايصالية الكهربائية وكانت عالية المعنوية وبمعامل ارتباط مقداره  $r = 0.968$  وبادخل كمية كarbonات الكالسيوم مع المكونات السابقة ظهر لها تأثير عالي المعنوية في حد الانكمash إذ ادى الى ارتفاع قيمة معامل الارتباط بشكل كبير جدا وكان  $r = 0.988$ .

بينت النتائج عدم وجود علاقة بين كل من ( حد اللدانة وحد السيولة ودليل اللدانة ) والخصائص الفيزيائية والكميائية للترب المدروسة .

#### **Abstract**

This study was conducted to predict the soil consistency limits ( shrinkage , plasticity, liquid limits and plasticity index ) by using the relationship between these limits as functions for some soil properties such as clay fraction ,organic matter , calcium carbonate ,sodium adsorption ratio and electrical conductivity . Eight soil samples type were taken from Al-faw,Al-Seiba, Abu - Alkhasib , Al- Bradaea, Al-Tanuma , Al-Hartha , Al-Deer and Al-Kurna districts .

Results showed that shrinkage limit values were between 2.0 and 8.5 % for Al-Deer and Al-Kurna soils, respectively .where as the averages of plasticity limits were between 22.03 and 25.88 %for Al- Deer and Abu- Alkhasib . The liquid limit values were between 38.0 and 49.00 % and the plasticity index were between 12.43 and 23.12 %for Al- Seiba and Abu- Alkasib soils, respectively

Results also showed that the clay fraction was between 95.24 and 511.73 g kg<sup>-1</sup> for Al- Kurna and Abu -Al Khaseb, respectively . The organic matter amount is 2.68 and 38.85 g kg<sup>-1</sup> for the soils of Al-Tanuma and Al-Bradaea respectively . Calcium carbonate amount was 206.20- 427.80 g kg<sup>-1</sup> for Al – Bradaea and Al Seiba, respectively . Al- deer soil had the lowest values of sodium adsorption ratio and electrical conductivity which was 3.08 and 5.12 ds m<sup>-1</sup> while the highest values were 9.26 and 120.00 ds m<sup>-1</sup> for Al-Hartha soil, respectively .

Results showed that, there is linear relationship between the shrinkage limit and sodium adsorption ratio with correlation coefficient of 0.762 .The correlation coefficient between the two previous factors increased to  $r=0.927$  when the electrical conductivity was taken into account . It increased farther to  $r= 0.968$  which is highly significantly when the organic matter inter the equation . Mean were when the calcium carbonate was taken into account with the other factors the correlation coefficient of the relationship mentioned above increased significantly to  $r= 0.988$  .

However , there is no relationship between plasticity limit in liquid limit and plasticity index with soil physio- chemical properties .

### **المقدمة**

قوام التربة هي ظاهرة تحدد القوة الفيزيائية لكل من التلاصق والتماسك التي تحدث للتربة عند المستويات الرطوبية المختلفة ، ومن العوامل المؤثرة على حدود القوام هي المحتوى الطيني ونوعية معادن الطين بالإضافة إلى المادة العضوية وكarbonات الكالسيوم فضلاً عن الكاتيونات المعدضة وغيرها (1) في دراسة قام بها (2) حول اللدانة لاحظ زيادة دليل اللدانة مع زيادة دقائق الطين في التربة في حين انخفض دليل اللدانة مع زيادة كمية الرمل وقد يصل إلى الصفر عندما تزداد نسبة الرمل عن 50% في التربة وأكد (3) زيادة حدود السائلة واللدانة مع زيادة نسبة الطين وعزى ذلك إلى امتلاك دقائق الطين مساحة نوعية عالية مع ارتفاع كثافة الشحنة السطحية مما يؤدي إلى زيادة الطبقة الكهربائية المزدوجة ورفع اللزوجة التي تعطي صفة اللدانة لدقائق التربة ، ان وجود الاطيان بكميات كبيرة تزيد من قابلية التربة للاحتفاظ بالماء وزيادة دليل اللدانة بينما زيادة نسبة الغرين تؤدي إلى انخفاض حد السائلة (4) .

للمخلفات العضوية القدرة العالية على امتصاص الماء وتساعد على تكوين اغلفة مائية حول دقائق التربة المعدنية ومن ثم زيادة حدود اللدانة للتربة (5 و 4) وأشار (6) إلى ارتفاع حدود القوام مع زيادة نسبة المخلفات العضوية وعلى ذلك إلى تحل المخلفات العضوية وزيادة قابليتها على امتصاص الماء مما يؤدي إلى زيادة قابلية التربة على الاحتفاظ الماء . وتوصلت (7) إلى وجود علاقة ارتباط موجبة وعالية المعنية بين كarbonات الكالسيوم وحد اللدانة .


ان حد السائلة يتاثر بشكل كبير بنسبة الاملاح ودرجة تفاعل التربة ونوع الشحنة الموجبة المعدضة على اسطح غرويات التربة (8) فعند تسبيع التربة بايون الصوديوم يقل حدي اللدانة والسائلة وعند التسبيع بايوني الكالسيوم والمغنيسيوم يزداد حدي اللدانة والسائلة (9) وتوصل (10) إلى وجود علاقة ارتباط خطية بين حدي الانكمash وللدانة والسعنة التبادلية الكاتيونية وبمعامل ارتباط مقداره  $R=0.94$  ومن ناحية أخرى اشارت (11) إلى انخفاض حدود السائلة وللدانة الانكمash مع زيادة الابصالية الكهربائية للتربة ونسبة امتصاص الصوديوم .

ونظراً لأهمية حدود القوام باعتبارها دليلاً لمدى قابلية التربة للاحتفاظ بالرطوبة مع ارتباطها بخصائص التربة الفيزيائية والكيميائية المهمة هدفت هذه التجربة إلى دراسة هذه الحدود والعوامل المؤثرة عليها لبعض ترب اختيرت من مناطق مختلفة من محافظة البصرة تتباين في نسجتها وخصائصها الأخرى

### **المواد وطرائق العمل**

جمعت نماذج من التربة بواقع ثمان نماذج من مواقع مختلفة من محافظة البصرة وللعمق (0 - 30) سم والمتمثلة بمواقع الفاو والسيبة وأبو الخصيب والبراضعة والتوفة والمهارثة والدير والقرنة (شكل 1) والمصنفة وفقاً لما جاء في (12) والموضحة في الجدول (1) .

جفت نماذج التربة هوائياً وأخذ جزء منها ونخل من منخل قطر فتحاته 2 ملم لاجراء التحليلات الفيزيائية والكيميائية الاولية للتربيه والموضحة نتائجها في الجدول (2). قدر توزيع حجوم الدقائق بطريقة الماصة الحجمية وحسب طريقة Day الموصوفة في (13) . قدرت المادة العضوية كنسبة مئوية من خلال تغير الكarbonات العضوي باستخدام طريقة Walkely black الموصوفة في (14). أما النسبة المئوية لكاربونات الكالسيوم الكلية فقدرته بمعادلة  $1\text{NNaOH} \times 1\text{NHCl}$  مع  $1\text{NNaOH}$  باستخدام دليل الفينونفثالين (14) وقدرت الايونات الموجبة والسلبية الذائبة في مستخلص عجينة التربة المشبعة حيث تم تقدير الكالسيوم والمغنيسيوم بطريقة التسخين مع 0.01 عياري من  $\text{Na}_2\text{EDTA}$  حسب طريقة (14) .



شكل (1): خارطة تمثل مواقع جمع العينات

جدول (1) : تصنیف الترب المدرّوسة

التصنيف	الموقع
Fine clayey mixed active calcareous hyperthermic Typic Torrifluvents	الفاو
Silt loam mixed active calcareous hyperthermic Typic Torrifluvents *	السيبية
Silt loam mixed active calcareous hyperthermic Typic Torrifluvents	ابو الخصيب
Loam mixed active calcareous hyperthermic Typic Torrifluvents *	البراضعية
Coarse loamy mixed active calcareous hyperthermic Typic Torrifluvents	التنومة
Clay mixed active calcareous hyperthermic Typic Torrifluvents*	الهارثة
Silty mixed active calcareous hyperthermic Typic Torrifluvents *	الدير
Fine loamy mixed active calcareous hyperthermic Typic Torrifluvents	القرنة

\* العطّب ، صلاح مهدي (بحث غير منشور).

## مجلة جامعة كربلاء العلمية – المجلد التاسع - العدد الثالث / علمي / 2011

قدر الصوديوم باستخدام جهاز اللهب الضوئي Flam photometer وحسب موصفه (14) وقدرت ايونات الكاربونات والبيكاربونات بطريقة التسخين مع 0.01 عياري من حامض الكبريتิก ( $H_2SO_4$ ) وكما وصفها (15) وقدرت الكلوريدات بالتسخين مع 0.05 عياري من نترات الفضة ( $AgNO_3$ ) حسب طريقة (14)، حسبت نسبة امتزاز الصوديوم (SAR) من المعادلة التالية وكما وصفه (19) :

$$SAR = \frac{Na}{\sqrt{\frac{Ca + Mg}{2}}}$$

جدول (2): بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لنماذج الترب قيد الدراسة


القرنة	الدير	الهارثة	التنومة	البراضعية	ابو الخصيب	السيبة	الفاو	الوحدات	الخصائص
180.13	107.44	173.1 5	57.85	167.70	45.84	78.51	85.1 3	gm kg <sup>-1</sup>	رمل
724.63	619.83	620.2	495.8 7	331.26	442.43	537.19	451. 3	gm kg <sup>-1</sup>	غرين
95.24	272.73	206.6 5	446.2 8	501.04	511.73	384.3	463. 6	gm kg <sup>-1</sup>	طين
Silt loam	Silty clay loam	Silt loam	Silty clay	clay	Silty clay	Silty clay loam	Silty clay	-----	النسبة
20.10	26.80	21.44	2.68	38.85	18.76	31.49	20.1 0	gm kg <sup>-1</sup>	المادة العضوية
360.80	371.10	378.9 0	366.0 0	206.20	376.30	427.80	321. 4	gm kg <sup>-1</sup>	كاربونات كالسيوم
40.50	10.25	42.13	17.88	25.38	25.25	26.13	25.0 0	mmole L <sup>-1</sup>	Ca <sup>+2</sup>
13.88	7.88	48.88	11.94	7.75	14.13	9.75	6.63	mmole L <sup>-1</sup>	Mg <sup>+2</sup>
66.30	13.09	88.35	19.57	22.17	34.17	38.09	41.3	mmole L <sup>-1</sup>	Na <sup>+1</sup>
00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	mmole L <sup>-1</sup>	Co <sub>3</sub> <sup>-2</sup>
6.75	6.65	3.75	5.75	5.25	6.50	9.00	7.00	mmole L <sup>-1</sup>	HCO <sub>3</sub> <sup>-1</sup>
571.25	28.25	863.7 5	98.75	106.25	187.50	177.50	227. 0	mmole L <sup>-1</sup>	Cl <sup>-1</sup>
8.99	3.08	9.26	3.58	3.85	5.45	6.36	7.34	-----	SAR
59.00	5.12	120.0 0	8.20	13.20	21.30	21.50	25.0 0	dsm <sup>-1</sup>	EC
7.27	7.39	7.42	7.53	7.15	7.15	7.21	7.22	-----	pH

تم قياس درجة تفاعل التربة في معلق 1:1 تربة:ماء باستخدام جهاز pH-meter وكما وصفه (14). قيست الاصحالية الكهربائية في مستخلص عجينة التربة المشبعة باستخدام جهاز EC-meter تحت درجة حرارة 25 درجة مئوية وكما موضحة في (16). قدرت حدود القوام Consistency Limit بعد نخل التربة من منخل قطر فتحاته 0.425 ملم، حيث قدر حد السائلة Liquid Limit باستخدام جهاز Casagrande apparatus اما حد الانكمash Shrinkage Limit فقدر باستخدام جهاز Mould P.I = L.L - P.L

**النتائج والمناقشة**


**حد الانكمash Shrinkage Limit**

تم تعين حد الانكمash لجميع الترب المدروسة من العلاقة بين الانكمash الطولي والمحتوى الرطوبى للترفة وكما موضحة في الاشكال (2، 3 و4).




شكل(2): العلاقة بين الانكمash الطولي والمحتوى الرطوبى لترف ( الفاو والسيبة وابو الخصيب )

**مجلة جامعة كريلاء العلمية – المجلد التاسع - العدد الثالث / علمي / 2011**




شكل (3): العلاقة بين الانكماش الطولي والمحنوي الرطوبوي لتراب ( البراضعية والتنومة والهازرة )



شكل (4): العلاقة بين الانكماش الطولي والمحتوى الرطوبى لتراب ( الدير ، القرنة )

النتائج الموضحة في الشكل (5) تشير الى ارتفاع قيم حد الانكماش لتربيتي القرنة والفاو مقارنة بترسب المناطق الاخرى وبقيم مقدارها 7.5 و 8.5 %، على التوالي وقد يعود سبب ارتفاع حد الانكماش لتربة القرنة الى نوعية معادن الطين السائدة حيث وجد (12) نسبة عالية من معدن المونتموريونايت في المنطقة وبلغة 30.3 % اذ يتميز هذا المعدن بالقدرة العالية على الانفراخ والانكماش والتقطيب نظراً لاتساع السطوح الداخلية والخارجية له حيث يمتلك هذا المعدن بحدود اربعة او اكثر من جزيئات الماء اثناء عملية التقطيب (18)، اما ارتفاع الحاصل في حد الانكماش لتربة الفاو فقد يعود الى ارتفاع كمية الطين والتي بلغت 463.59 غم كغم<sup>1</sup>- فضلاً عن سيادة معدن المونتموريونايت في هذه المنطقة والتي قدرت بحدود 49.1 % (12). ويلاحظ من الشكل (3) انخفاض حد الانكماش لتربة الدير وكانت 2.0 % وربما يعزى ذلك الى ارتفاع نسبة الغرين او سيادة المعادن غير المتمدة في هذه الترب.



وللتتبؤ بقيمة حد الانكمash، تم ادخال خصائص الترب المدروسة والمتمثلة بنسبة الطين والمادة العضوية وكarbonات الكالسيوم ونسبة امتراز الصوديوم والايصالية الكهربائية في معادلات خطية متعددة الحدود ، حيث يتبيّن من النتائج ارتفاع قيم معامل الارتباط ولا غالب خصائص الترب قيد الدراسة وكما موضحة في المعادلات التنبؤية التالية :


$$\begin{aligned} \text{Sh.L} &= 0.99 + 0.7 \text{ SAR} & r &= 0.762 \\ \text{Sh.L} &= -1.427 + 1.411 \text{ SAR} - 0.054 \text{ EC} & r &= 0.927 \end{aligned}$$

$$\text{Sh.L} = 0.172 - 0.069 \text{ O.M} + 1.408 \text{ SAR} - 0.055 \text{ EC} \quad r=0.984$$

$$\text{Sh.L} = 1.46 - 0.078 \text{ O.M} - 0.004 \text{ CaCO}_3 + 1.44 \text{ SAR} - 0.055 \text{ EC} \quad r=0.988$$


### حد اللدانة Plasticity Limit

يوضح الشكل (6) وجود اختلافات بسيطة في قيم حد اللدانة بين المواقع المختلفة، فقد سجلت تربة ابو الخصيب اعلى قيمة لحد اللدانة ومقدارها 25.88 %. وقد يعزى سبب ذلك الى ارتفاع نسبة الطين البالغة 511.73 غم كغم<sup>-1</sup> فضلا عن وجود نسبة عالية من كarbonات الكالسيوم في التربة التي بلغت 376.3 غم/كغم . اما ارتفاع حد اللدانة لتربة السيبة فقد يعود الى الزيادة الحاصلة في المادة العضوية والتي بلغت 31.49 غم كغم<sup>-1</sup>. وهنا يظهر دور المادة العضوية في القدرة العالية على امتصاص الماء ولما تتمتع به من سعة تبادلية كاتيونية عالية تقدر 150-300 سنتيمول كغم<sup>-1</sup>. هذا فضلا عن زيادة المساحة السطحية النوعية لها والبالغ 800-900 م<sup>2</sup> غم<sup>-1</sup> (19) ، وان النسبة العالية لكاربونات الكالسيوم ربما قد سببت في زيادة حد اللدانة لتربة السيبة ، ويلاحظ من الشكل انخفاض حد اللدانة لتربة الدير ومقدارها 22.03 % .




### حد السيولة Liquid Limit

يبين الشكل (7) ان اعلى قيمة لحد السيولة سجلتها تربة ابو الخصيب وبلغت 49.00 %، والسبب يرجع الى كمية الطين العالية والتي قيمتها 511.73 غم كغم <sup>1</sup>- فضلا عن نوع المعدن السائد وحسب ماجاء في (6) حيث وجد ان معدن المونتموريلونايت المتدخل مع معدن الكلورايت هو السائد في المنطقة وبنسبة 46.80 % وهذا ماكده (20)، وان وجود 376.30 غم كغم <sup>1</sup>- من كاربونات الكالسيوم ربما ساهمت في رفع حد السيولة هذا فضلا عن انخفاض نسبة امتصاص الصوديوم والمبيبة نسبتها في جدول (2). وهذا يتفق مع (11) إذ وجدت علاقة عكسية بين حد السيولة ونسبة امتصاص الصوديوم . وعلى الرغم من ارتفاع نسبة المادة العضوية وكarbonات الكالسيوم في تربة السيبة ولكن انخفض حد السيولة الى 38.00 %، وقد يعزى السبب في ذلك الى ارتفاع كمية الغرين البالغة 537.19 غم كغم <sup>1</sup>- مع انخفاض كمية معدن الطين ونوعيتها السطحية المتمندة ذات المساحة النوعية والسعية التبادلية الكاتيونية العالية التي تزيد من قابلية التربة على الاحتفاظ بالرطوبة.



### دليل اللدانة Plasticity Index

تشير البيانات الموضحة في الشكل (8) الى ان تربة ابو الخصيب سجلت اعلى قيمة لدليل اللدانة وكانت 23.12 % في حين كانت اقل قيمة سجلتها تربة السيبة 12.43 %. وتعود الزيادة والانخفاض في قيم دليل اللدانة لتوافقها مع نتائج حد السيولة .



شكل (8) دليل الدانة للترب قيد الدراسة

وللتتبّع بقيم حدي الدانة والسيولة ودليل الدانة لم يتم التوصل أحصائيًّا في هذه الدراسة الى وجود علاقة بين هذه الحدود والخصائص الفيزيائية والكيميائية للترب المدروسة .

#### المصادر

- 1-Hillel ,D. ,1980 .Fundamentals of Soil Physics . Academic press .New York .
- 2- SKempton ,A. W. and R. D. Northy , 1952 .The Sensitivity of Clays. Geotechneque, 3: 30- 53.
- 3- الباهلي، ناجي خير الله مصطفى ، 1997 . الخواص الفيزيائية والميكانيكية لرواسب قناة سط العرب وتأثيرها على التعرية ، رسالة ماجستير ، كلية الزراعة ، جامعة البصرة .
- 4 - دحام ، هدى احمد ، 2010 . الخصائص الفيزيوكيميائية لبعض ترب السباح لمناطق مختلفة من البصرة وتأثيرها على المنشآت الهندسية . مجلة ابحاث البصرة (العلوميات ) العدد (26) (الجزء 6) .
- 5 - حسن، هشام محمد ،1990. تأثير المخلفات العضوية على الخواص المائية للترب.مجلة زراعة الرافدين، 26 (4): 43 - 46 .
- 6 - المراد ، حسين علي شهاب ،1998 . تأثير رص التربة على تغير بعض الصفات الفيزيائية والميكانيكية وعلاقته بالاستهلاك المائي لنبات الشعير . رسالة ماجستير ، كلية الزراعة ، جامعة البصرة .
- 7 - عبد الرسول ، أبتسام عبد الزهرة ،2008 . دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية لبعض ترب جنوب العراق والعوامل المؤثرة في لدانة الترب.مجلة ابحاث ميسان ، 4 (8): 304- 322 .
- 8- Al-Badran ,A.,1987.Factors influencing river bank stability in the Tigris and Shatt Al-Arab Water Ways .Ph.D.Thesis ,Univ .of Dundee.
- 9- Baver,L.D.;W.H.Gardner and W.R.Gardner ,1972. Soil Physics . 4<sup>th</sup> ed.John Wiley and Sons., New York .
- 10- Comelis ,W.M.; J. Corluy ;H.Medina; R.Hartmann ;M.Vanmeirvenne and M.E.Ruiz, 2006.A simplified parametric model to describe the magnitude and geometry of soil shrinkage. European Journal of soil Science ,57(2): 258-268.
- 11 - الموسوي ، كوثير عزيز حميد ، 2007 .تأثير مناوبة نوعية مياه الري ومحتوى رطوبة التربة في بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لترابة هور الحمار والاستهلاك المائي لمحصول الذرة البيضاء ، اطروحة دكتوراه ، كلية الزراعة ، جامعة البصرة .

## مجلة جامعة كربلاء العلمية – المجلد التاسع - العدد الثالث / علمي / 2011

- 12- العطب، صلاح مهدي سلطان، 2008 . التغير في خصائص التربة وتصنيفها لبعض مناطق محافظة البصرة . اطروحة دكتوراه ، كلية الزراعة ، جامعة البصرة .
- 13 - Black , C.A.; D.D. Evans ; J.L. Whit ; L.E. Ensminger and F.E. Clark, (1965) Methods of Soil Analysis. PartI, No. 9. Am. Soc. Agron. Madison, Wisconsin , USA.
- 14-Jackson, M.L., (1958) Soil Chemical Analysis Hall, Inc. Engle wood cliffs, N.J. USA.
- 15- Richards , L.A., (1954) Diagnosis and improvement of Saline and Alkaline Soils. U.S. Dept. of Agric. Handbook No.60.
- 16- Page, A.L. ; R.H.Miller and D.R.Keeney , (1982) Methods of Soil Analysis , Part (2), 2<sup>nd</sup> .ed. Agronomy 9.
- 17- Head, K.H.,1980. Manual of Soil Laboratory Testing .Vol .1 .Pantech press, London .
- 18- عواد ، كاظم مشحوت ، 1986. مبادئ كيمياء التربة .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة البصرة ، كلية الزراعة .
- 19- الخطيب ، السيد أحمد ، 1998. أساسيات علم الاراضي ، كلية الزراعة ، جامعة الإسكندرية .جمهورية مصر العربية .
- 20- ياسين ، محمد مالك ، 2010 . تأثير منطقة المحيط الجذري (الرايزوسفير) للنخيل *Phoenix dactylifera* على بعض الترب الكلسية .  
*Ziziphus spinachrithi* في بعض الخصائص المعدنية والكيميائية والفيزيائية والحيوية لبعض الترب الكلسية .  
اطروحة دكتوراه ، كلية الزراعة ، جامعة البصرة .