

The Study of antioxidant and Anti-abnormality activities for Liquid-Methanolic Extract of Honey Bee Pollen Grains on White Mice

دراسة الفعالية المضادة للأكسدة والفعالية المضادة لتشوهات النطف للمستخلص الميثانولي المائي لحبوب لقاح نحل العسل في الفئران البيض

* ستار جاسم حتروش

** علي حمود السعدي

* باسم كاظم بريسم
* محافظة واسط – العراق .

** قسم علوم الحياة , كلية العلوم – جامعة بابل , العراق .

*** قسم علوم الحياة , كلية العلوم – جامعة كربلاء , العراق .

* البحث مستقل من رسالة ماجستير للباحث الاول .

لخلاصة

تضمنت الدراسة الحالية اختبار فعالية المستخلص الميثانولي المائي لحبوب اللقاح كمضاد للأكسدة ولتشوهات النطف ، إذ تم الكشف عن التأثيرات الضارة لعقار السايكلوفوسفاميد ومحاولة الحد منها باستخدام هذا المستخلص .

اما عند اجراء اختبار الكشف عن التشوهات في رؤوس الحيوانات المنوية فقد تبين بان الجرعة 5 ملغم / كغم في التداخل الاول والثاني أدت الى حدوث فرق معنوي ($P < 0.01$) مقارنة مع السيطرة الموجبة . في حين لم يؤدّ التداخل الثالث الى خلافات معنوية ، وعند اجراء الجرعة 15 ملغم/كغم تبين أن التداخلين الاول والثاني ادى الى حدوث اختلافات معنوي ، في حين لم يؤدّ التداخل الثالث الى حدوث اختلافات معنوية ، وعند الجرعة 30 ملغم/كغم فقد ادى التداخل الاول والثاني الى حدوث خلافات معنوية ($P < 0.01$) ، في حين لم يؤدّ التداخل الثالث الى فرق معنوي .

ومن نتائج الدراسة الحالية يمكن ان نستنتج أن المستخلص الميثانولي المائي لحبوب اللقاح يمتلك فعالية مضادة للأكسدة ولتشوهات النطف عند اعطائه قبل ومع المطفر وبجرعه واطئه في الخلايا الجرثومية .

Summary

The current study was included the test of the activity of methanol water extract of pollen grains as an antioxidant and anti-abnormality of sperms. As it has been detected the harmful effects of drug and try to cyclophosphamide and try to reduce them by using this extract.

when testing for abnormalities in sperm. It turns out that the dose of 5 mg \ kg in the first and second interactions led to a significant difference($P<0.01$) compared with positive control , while the third interaction did not lead to significant difference . At a dose of 15 mg \ kg showed the first and second interactions resulted in a significant difference . While the third interaction did not lead to differences. And at a dose of 30 mg \ kg the first and second interaction led to occurrence of significant differences ($P<0.01$) . While the third interaction does not lead to significant difference .

As a result of the present study, we can conclude that a methanol water extract of pollen grains has activity antioxidant and anti-abnormality of sperms when given before and with of mutagen and low doses in germ cells.

المقدمة Introduction

تعد حبوب اللقاح (Pollen grains) وحدات تكاثرية ذكرية صغيرة تتكون في متن ازهار النباتات وتقوم عاملات النحل بجمعها من مصادر نباتية متباعدة وتحتوي على العديد من المغذيات الدقيقة والمركبات الغنية بالطاقة (12) ، يتدرج اللون في حبوب اللقاح من الابيض المصفر الى الازرق الغامق بحسب النوع بسبب احتوائهما على كثير من الصبغات النباتية مثل الكاروتينات (Carotenes) والفالفوزانثينات (Flavoxanthins) والزانثوفيلات (Xanthophylls) (Anthocyanins) (Cryptoxanthins) واسترات الليوتين (Lutein esters) والانثوسانيات (Anthocyanins) (Precursor A) لفيتامين A بالإضافة الى فعاليته كمضادة للأكسدة (18) . كذلك أشار Martin وجماعته (15) ان حبوب لقاح نحل العسل تمتلك فعالية مضادة للأكسدة عالية لاحتواءها على العديد من المركبات المضادة للأكسدة كالفيتامينات والفيتيلولات المتعددة .

تحتوي حبوب اللقاح على كثير من المواد ذات التأثيرات المختلفة مثل المواد المضادة للأكسدة كالفيتيلولات والفيتامينات والاحماض الدهنية غير المشبعة وكذلك تحوي على الاحماض الامينية والكريبوهيدرات والبروتينات والتي اضافت عليها اهمية خاصة فهي بالإضافة الى استخدامها كغذاء تمتلك بعض الخواص المهمة منها الفعالية المضادة للأكسدة ، تحتوي حبوب اللقاح على العديد من المركبات الفينولية المضادة للأكسدة مثل Flavanoids وبصورة رئيسية الفلافونولات Flavonols والفالفونات Flavanones والفالفونونات Flavones وهذه المركبات من العوامل المضادة للتطير وانها من المواد المضادة للأكسدة والتي تضفي عليها اهمية في الوقاية من السرطان في الفئران والجرذان في المراحل الاولى من نشوءه (16) . وقد هدفت الدراسة الحالية الى فحص الفعالية المضادة للأكسدة للمستخلص الميثانولي المائي لحبوب لقاح نحل العسل ، ودراسة تأثير مطفر السايكلوفوسفاميد (Cyclophosphamide) في رؤوس الحيوانات المنوية لذكور الفئران.

المواد وطرق العمل Material and Methods

1. المواد

1.1. مصدر المستخلص

استخدمت حبوب لقاح نحل العسل المتجمعة من اصول نباتية مختلفة وتم جلبه من العديد من النحالين في محافظة كربلاء ومحافظة بابل.

1.2. حيوانات التجارب

استخدمت في هذه الدراسة ذكور الفئران البيض السويسري البالغة والتي تراوحت اعمارها بين 8-10 اسابيع والتي تم الحصول عليها من معهد ابحاث الاجنة وعلاج العقم التابع لجامعة النهرین في بغداد .

1.3. السايكلوفوسفاميد

استخدمت حبوب السايكلوفوسفاميد شركة (Baxter) الالمانية الموجودة في الصيدليات المحلي .

2. طرائق العمل Methods

2.1. تحضير المستخلص النباتي

حضر مستخلص حبوب لقاح نحل العسل ، حسب طريقة Sato وجماعته (21) مع بعض التحوير إذ تم اخذ وزن محدد من الحبوب الجافة وخلط بمعدل 1 غ من الحبوب:3 مل من محلول الاستخلاص (1 ميثanol:4 ماء مقطر V/V)، وتم مجانسته بواسطة خلاط كهربائي ولمدة نصف ساعة، رشح المحلول الناتج بوساطة قماش شاش ورکز الراشح باستخدام المبشر الدوار ووضع في الحاضنة على درجة حرارة 50 ° م لمندة 24 ساعة للحصول على المستخلص الجاف، حفظ المستخلص في مكان جاف لحين الاستخدام .

2.2. توصيف المستخلص النباتي بوساطة كروماتوغرافية الطبقة الرقيقة TLC

نشطت صفائح السيليكون بوضعها في الفرن لمدة ساعة عند درجة حرارة 105 ° م وتم وضع حجم ما يقارب (100, 300, 500) ميكروليتر من المستخلص بعد اذابته بنفس الطور السائل المستخدم (بنسبة 1 غم من المستخلص لكل 3 مل من المذيب) عند قاعدة الصفيحة ، إذ استخدمت ثلاثة انظمة من المذيبات كطوط سائل لعملية الفصل وهي: 1. بتروليوم ايثر:ميثanol:بنزين:كلوروفورم ، بنسب حجمية 1:1:1:1 . 2. ايثر:ايثانول:كلوروفورم:بنزين ، بنسب حجمية 1:1:1:1 . 3. هكسان:ايثانول:كلوروفورم ، بنسب حجمية 1:1:1 . وتم مراقبة عملية ارتفاع الطور السائل على الصفائح حتى وصوله بالقرب من الحافة العليا ، اخرجت الصفائح من الحوض وتركت لفترة معينة بدرجة حرارة الغرفة إلى أن تجف وأجريت عملية الفحص تحت الضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية وتم تصويرها بوساطة كاميرا رقمية (23) ، إذ تم تحديد عامل الاعاقة R_f (Retardation Factor) للحزم المتكونة بالإضافة إلى اللون وعدد تلك الحزم مع العلم بأن:

$$R_f = \frac{\text{المسافة التي قطعها الحزمة}}{\text{المسافة التي قطعها الطور السائل}}$$

3.2. اختبار الفعالية المضادة للأكسدة بطريقة الرش بالبيتاكاروتين (β -carotene Spray Method)
أجريت عملية اختبار الفعالية المضادة للأكسدة على صفائح TLC باستخدام طريقة الرش بالبيتاكاروتين المشار إليها من قبل (15) ، فقد أذيب 9 ملغم من البيتاكاروتين في 30 مل من الكلوروفورم ثم أضيف إلى الخليط قطرتين من حامض الـιنوليك التقى و 60 مل من الأيتانول ، وتم رش هذا الخليط على صفائح TLC وبعد ثم عرضت الصفائح إلى الضوء العادي حتى تم تصر لون الأرضية (6-2 ساعات) ، ان الحزم التي تحفظ باللون الأصفر لأطول فترة ممكناً تتمثل مكونات مضادة للأكسدة بحيث تتناسب كثافتها اللونية مع الفعالية .

4.2. تحديد الجرعة المثلث للسايكلوفوسفاميد
تم استخدام الجرعة المثلث للسايكلوفوسفاميد وهي الجرعة التي تمتلك قوة تطفييرية عالية بحيث تتناسب مع وزن الفأر والمتمثلة ب 20 ملغم/كغم من وزن الجسم (22) .

5.2. تحضير المحاليل الخاصة باختبارات رؤوس الحيوانات المنوية

5.2.1. محلول السايكلوفوسفاميد Cyclophosphamide Solution
حضر باذابة حبة (50) ملغم من السايكلوفوسفاميد في 1 مل وجرع كل حيوان 50 مايكروليتر فموياً .

5.2.2. محلاليل المستخلص الميثانولي المائي لحبوب اللقاح Pollen grain Solution
تم تحضير ثلاثة جرع (30,15,5) ملغم / كغم من المستخلص الميثانولي المائي لحبوب اللقاح بعد اذابة وزن منها في 1 مل من الماء المقطر وجሩت فموياً (8) .

5.2.3. محلول ملون ازرق المثنين Methylene Blue Stain

لتحضير 100 مل منه تم اذابة 0.5 غ من الصبغة و 1.6 غ من اوكيزالات البوتاسيوم و 1 مل فورمالين في 70 مل من الماء المقطر ثم اكمل الحجم الى 100 مل من الماء المقطر وحفظ بدرجة حرارة الغرفة لحين الاستعمال (9) .

5.2.4. محلول داريء الفوسفات الملحي (PBS) Phosphate Buffer Saline

لتحضير 1000 مل منه تم اذابة 8 غ من NaCl و 0.015 غ من Na_2HPO_4 و 0.2 غ من KH_2PO_4 و 0.2 غ من KC1 في 500 مل ثم اكمل الحجم الى 1000 مل من الماء مقطر وضبط pH على 7.2 وعمق بالمؤصلة وحفظ بدرجة حرارة 4 °C (10) .

6.2. تحضير الحيوانات المنوية للفتران

اتبعت طريقة (9) مع بعض التحوير إذ قص الجلد أسفل التجويف البطني للحيوان ، واستخرج البربخ وقطع في طبق بتري وتم عمل مسحة شريحية منه وثم تركت لكي تجف في الهواء وثبتت بوساطة قطرة من الميثانول لمدة دقيقة ، ولونت الشريحة بوساطة ملون ازرق المثنين لمدة من 10 - 12 دقيقة ومن ثم تركت الشريحة تجف ومن ثم غسلت بوساطة PBS وفحست الشرائح تحت المجهر الضوئي لحصر التشوّهات في رؤوس الحيوانات المنوية لكل 1000 خلية .

7.2. التحليل الاحصائي Statical Analysis

تم تحليل النتائج وفق نموذج التصميم العشوائي الكامل (Complete Randomized Design) باستخدام اختبار F للإسداخ على المعنوية واستخدام اختبار أقل فرق معنوي L.S.D. لإظهار معنوية النتائج وتم أيضاً استخراج المتوسط الحسابي M والخطأ القياسي Se (Standard error) (2) .


Results and Discussion

1.4. توصيف المستخلص الميثانولي المائي لحبوب اللقاح باستخدام كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة (TLC) :
تبين الأشكال (3,2,1) نمط ترحيل الـ TLC للمستخلص الميثانولي المائي لحبوب اللقاح عند فحصه بالضوء الاعتيادي والأشعة فوق البنفسجية التي تم تلخيصها في الجداول (3,2,1) والتي تبين خصائص الحزم من ناحية الـ R_f واللون وعدد الحزم الظاهرة ، إذ لوحظ ظهور 5 حزم عند الفحص بالضوء الاعتيادي للطور السائل (بنزين، ميثانول، بنزرين، كلوروفورم V/V/V 1:1:1) وقد تراوحت قيم الـ R_f بين 0.89-0.07 في حين لوحظ ظهور 7 حزم عند الفحص بالأشعة فوق البنفسجية وتراوحت قيم الـ R_f لها بين 0.89-0.07 . أما عند استخدام الطور السائل (ايثر، ايثانول، كلوروفورم، بنزرين V/V/V 1:1:1) فقد لوحظ ظهور 7 حزم عند الفحص بالضوء الاعتيادي وتراوحت قيم الـ R_f بين 0.87-0.08 في حين لوحظ ظهور 12 حزمة عن الفحص بالأشعة فوق البنفسجية تراوحت قيم الـ R_f بين 0.08-0.78 . وعند استخدام الطور السائل (هكسان، ايثانول، كلوروفورم V/V/V 1:1:1) لوحظ ظهور 5 حزم عند الفحص بالضوء الاعتيادي وتراوحت قيم الـ R_f بين 0.09-0.9 . وكذلك لوحظ ظهور 9 حزم عند الفحص بالأشعة فوق البنفسجية تراوحت قيم الـ R_f بين 0.05-0.95 . إذ تبين هذه النتائج وجود أكثر من مكون للمستخلص الميثانولي المائي لحبوب اللقاح عند استخدام عدة اطوار سائلة مختلفة . ويمكن تفسير ذلك بأن حبوب اللقاح تحتوى على العديد من المكونات والتي من اهمها المغذيات مثل الاحماظ الامينية والاحماظ الدهنية والانزيمات ومرافق الانزيمات والفيتامينات والمركبات الفينولية والصبغات النباتية ، فقد وجد ان حبوب اللقاح تحتوى على فيتامينات مثل حامض البانتوثينيك وفيتامين C و E والكيمباوليات الضوئية وبقية المغذيات مثل الكاروتينات والفالافونيدات والستيرولات وان 20% من حبوب اللقاح تتكون من احماظ امينية وتحتوي ايضاً على اكثر من 5000 انزيم ومرافق انزيمي (4) .

فضلاً عن ذلك أشار(17) ومن خلال الاعتماد على نتائج التحليل الكروموتوغرافي من نوع كروموجرافيا السائل ذو الكفاءة العالية (HPLC) وبوساطة الطيف الكتني ان حبوب اللقاح تحتوي على عدة صبغات مختلفة منها: (Anthocyanin) و (Petunidin-3-o-glucoside) و (Delphinidin) و (Cyanidin) و (Petunidin-3-o-rutinoside), وايضاً أشير ان حبوب لقاح نحل العسل تتألف من الكربوهيدرات بنسبة 55% والبروتين 35% والفيتامينات والمعادن 3% والاحماس الدهنية 2% وبقية المكونات 5% وتحتوي حبوب اللقاح على ما لا يقل عن 15 مركب مضاد للاكسدة والتي من اهمها الفلافونات (11). وقد ذكر الباحث Roman وجماعته (20) ان مستخلص حبوب اللقاح يحتوي على عدة مركبات فينولية تم الكشف عنها بوساطة تقنية الترحيل الكهربائي الشعري المقترن مع تقنية الرش الكهربائي الاليوني للطيف الكتني ومن اهم الفينولات Galloyl Glucoside و Genistein و Acetin glucoside و Apigenin و Quercetin - 3 - rutinoside و Hesperetin و Naringenin و Luteolin و Myricetin و على : Apigenin و Quercetin و Luteolin-3-methylether و Methoxykaempferol . جدول (1) توصيف الحزم المتكونة على صفائح TLC للمستخلص الميثانولي المائي لحبوب اللقاح باستخدام الطور السائل (بنزوليم ايثر , ميثانول , بنزين , كلوروفورم)(V/V/V1:1:1:1).

العدد	خصائص الحزم		طريقة الفحص
	اللون	R _f	
5	بني مخضر	0.07*	لضوء الاعتيادي (المرأي)
	بني مخضر	0.18*	
	بني فاتح	0.47*	
	بني فاتح	0.73	
	بني مصفر	0.89*	
7	ازرق مخضر	0.07*	الأشعة فوق البنفسجية
	ازرق فاتح	0.18*	
	ازرق فاتح	0.47*	
	ازرق مخضر	0.64	
	ازرق مخضر	0.7	
	ازرق فاتح	0.81	
	ازرق فاتح	0.89*	

• **الحزم المشتركة عند الفحص بالضوء الاعتيادي المرأي والأشعة فوق البنفسجية**




شكل (1) ترحيل المستخلص الميثانولي المائي لحبوب اللقاح في صفائح TLC باستخدام الطور السائل (بنزوليم ايثر, ميثانول, بنزين, كلوروفورم) (V/V/V1:1:1:1). a. عند الفحص بالضوء الاعتيادي . b. عند الفحص بالأشعة فوق البنفسجية . الاوسم تشير الى موقع الحزم . * . الحزم المشتركة عند الفحص بالضوء الاعتيادي والأشعة فوق البنفسجية .

مجلة جامعة كريلاء العلمية – المجلد التاسع - العدد الثالث / علمي / 2011

جدول (2) توصيف الحزم المتكونة على صفائح TLC للمستخلص الميثانولي المائي لحبوب اللقاح باستخدام الطور السائل (ايثر : ايثانول : كلوروفورم: بنزين) (V/V/V/V 1:1:1:1).

العدد	خصائص الحزم		طريقة الفحص
	اللون	R _f	
7	بني مخضر	0.08*	الضوء الاعتيادي (المرئي)
	بني مخضر	0.16*	
	بني فاتح	0.30*	
	بني فاتح	0.5	
	بني فاتح	0.64*	
	بني مصفر	0.82	
	بني مصفر	0.82	
12	ازرق مخضر	0.08*	الأشعة فوق البنفسجية
	ازرق فاتح	0.10	
	ازرق فاتح	0.16*	
	ازرق فاتح	0.21	
	ازرق مخضر	0.25	
	ازرق مخضر	0.30*	
	ازرق مخضر	0.32	
	ازرق فاتح	0.37	
	ازرق مخضر	0.64*	
	ازرق مخضر	0.68	
	ازرق مخضر	0.75	
	ازرق مخضر	0.78	

* الحزم المشتركة عند الفحص بالضوء الاعتيادي المرئي والأشعة فوق البنفسجية




شكل (2) ترحيل المستخلص الميثانولي المائي لحبوب اللقاح في صفائح TLC باستخدام الطور السائل (ايثر, ايثانول, كلوروفورم, بنزين) (V/V/V/V 1:1:1:1). a. عند الفحص بالضوء الاعتيادي . b. عند الفحص بالأشعة فوق البنفسجية . الاسهم تشير الى موقع الحزم . *الحزم المشتركة عند الفحص بالضوء الاعتيادي والأشعة فوق البنفسجية .

جدول (3) توصيف الحزم المتكونة على صفائح TLC للمستخلص الميثانولي المائي لحبوب اللقاح باستخدام الطور السائل (هكسان ، ايثانول ، كلوروفورم) (V/V/V 1:1:1) ،

العدد	خصائص الحزم		طريقة الفحص
	اللون	R _f	
5	بني مخضر	0.09*	الضوء الاعتيادي (المرئي)
	بني فاتح	0.19	
	بني فاتح	0.44	
	بني مصفر	0.84*	
	بني مصفر	0.9	
9	ازرق مخضر	0.05	الأشعة فوق البنفسجية
	ازرق فاتح	0.09*	
	ازرق مخضر	0.23	
	ازرق مخضر	0.25	
	ازرق فاتح	0.52	
	ازرق فاتح	0.72	
	ازرق	0.80	
	ازرق مخضر	0.84*	
	ازرق فاتح	0.95	

* الحزم المشتركة عند الفحص بالضوء الاعتيادي المرئي والأشعة فوق البنفسجية .



شكل (3) ترحيل المستخلص الميثانولي المائي لحبوب اللقاح في صفائح TLC باستخدام الطور السائل (هكسان، ايثانول، كلوروفورم) (V/V/V 1:1:1) . a. عند الفحص بالضوء الاعتيادي . b. عند الفحص بالأشعة فوق البنفسجية . الاسهم تشير الى موقع الحزم . الحزم المشتركة عند الفحص بالضوء الاعتيادي والأشعة فوق البنفسجية .

4.2. دراسة التشوهات في رؤوس النطف :

يبين جدول (7) التغيرات في معدلات التشوهات في رؤوس النطف لذكور الفران المعاملة بجرع (30,15,5) ملغم / كغم من المستخلص الميثانولي المائي لحبوب اللقاح و 20 ملغم / كغم من السايكلوفوسفاميد ، إذ تبين بان التداخل الاول والثاني من الجرع الجرعة 5 و 15 ملغم / كغم في التداخل الاول والثاني أدى الى حدوث اختلاف معنوي ($P < 0.01$) مقارنة مع السيطرة الموجة ، اما الجرعة 30 ملغم / كغم فقد ادى التداخل الاول الى حدوث اختلاف معنوي ، اما التداخل الثاني فلم يؤدّ الى فروق معنوية باستثناء التشوه من نوع نطف فاقدة للرأس في حين لم يؤدّ التداخل الثالث الى فرق معنوي باستثناء التشوه من نوع نطف فاقدة للذنب ، وهذه النتائج تتفق مع ما أشار اليه (7) ان مستخلص حبوب لقاح الخيل يعمل على تقليل التشوهات في رؤوس الحيوانات المنوية لذكور الجرذان ، وايضاً ذكر (6) انه لزيت بذور الكتان وزيت بذور العنبر تأثيرات مخفضة للتشوهات في رؤوس الحيوانات المنوية المستحثة بواسطة


مجلة جامعة كربلاء العلمية – المجلد التاسع - العدد الثالث / علمي / 2011

السايكلوفوسفاميد في الفئران ، اما بخصوص التداخل الثالث من كل جرعة فقد أشار (1) إلى فشل الكفاءة التثبيطية لمستخلص التمر اتجاه التأثيرات السمية والتطفيরية للمطفر سايكلوفوسفاميد عند استخدام المستخلص بعد المطفر .

جدول (7) التغيرات في معدلات التشوهات في رؤوس النطف لذكور الفئران المعاملة بجرع (30,15,5) ملغم / كغم من المستخلص الميثانولي المائي لحبوب اللقاح و 20 ملغم / كغم من السايكلوفوسفاميد.

رأس كروي (per 1000 cell)	فأقدمة كلاب الرأس (per 1000 cell)	فأقدمة الذنب (per 1000 cell)	فأقدمة الرأس (per 1000 cell)	التشوه المعاملة
7.2 \pm 0.800*	10.4 \pm 0.678*	18.0 \pm 0.707*	10.6 \pm 0.297*	السيطرة السالبة
51.0 \pm 3.807	53.8 \pm 1.593	48.2 \pm 1.319	79.2 \pm 3.469	السيطرة الموجبة
11.2 \pm 0.734*	16.4 \pm 0.509*	23.8 \pm 1.655*	11.8 \pm 0.969*	جرعة 5ملغم/كغم التداخل الاول
31.2 \pm 1.280*	28.6 \pm 0.812*	25.2 \pm 1.428*	17.6 \pm 0.871*	التداخل الثاني
54.6 \pm 2.803	48.6 \pm 3.043	51.6 \pm 2.638	77.8 \pm 3.426	التداخل الثالث
29.8 \pm 1.462*	33.4 \pm 0.927*	27.0 \pm 2.549*	37.6 \pm 1.720*	الجرعة 15ملغم/كغم التداخل الاول
40.2 \pm 1.157*	39.2 \pm 1.200*	36.8 \pm 3.624*	43.2 \pm 1.428*	التداخل الثاني
51.2 \pm 1.496	49.2 \pm 2.576	48.6 \pm 1.568	81.2 \pm 2.083	التداخل الثالث
49.4 \pm 2.767	50.6 \pm 2.063	52.4 \pm 1.077	60.6 \pm 1.166*	الجرعة 30ملغم/كغم التداخل الاول
50.4 \pm 1.964	53.8 \pm 1.280	53.3 \pm 3.352	61.2 \pm 0.734*	التداخل الثاني
54.4 \pm 4.308	52.6 \pm 2.657	58.2 \pm 2.130*	81.2 \pm 2.222	التداخل الثالث

*فرق معنوي عند مستوى ($P < 0.01$) ، الخطأ القياسي \pm المعدل (M. \pm S.e.) ،



- (A) شكل (7) نطفة فاقدة للرأس لذكور الفئران المعاملة بالسيكلوفوسفاميد وتراكيز مختلفة من المستخلص الميثانولي المائي لحبوب اللقاح (قوة التكبير X 1600 ، ملون ازرق المثيلين) .
- (B) شكل (8) G. نطفة فاقدة للذنب F. نطفة فاقدة للرأس لذكور الفئران المعاملة بالسيكلوفوسفاميد وتراكيز مختلفة من المستخلص الميثانولي المائي لحبوب اللقاح (قوة التكبير X 1600 ، ملون ازرق المثيلين) .
- (C) شكل (9) نطفة فاقدة كلاب الرأس لذكور الفئران المعاملة بالسيكلوفوسفاميد وتراكيز مختلفة من المستخلص الميثانولي المائي لحبوب اللقاح (قوة التكبير X 1600 ، ملون ازرق المثيلين) .
- (D) شكل (10) نطفة ذات رأس كروي لذكور الفئران المعاملة بالسيكلوفوسفاميد وتراكيز مختلفة من المستخلص الميثانولي المائي لحبوب اللقاح (قوة التكبير X 1600 ، ملون ازرق المثيلين) .

المصادر

References

1. السعدي ، محمد حمود . (1996) . تثبيط التطفيير الوراثي لبعض المسرطنات الكيميائية باستخدام مستخلص تمر الزهدى . رساله ماجستير ، كلية العلوم ، جامعة بغداد .
2. الراوي , خاشع محمود . (2000) . مدخل الى الاحصاء . كلية الزراعة والغابات , جامعة الموصل.
3. Albritton ,T.(2004) . The benefits of bee products revealed ,Vitamin Cottage Natural Grocers ,Inc., pp1-3 .
4. Asita ,A.O. , Dingann ,M.E. and Magama ,S. (2008) . Lack of modulatory effect of asparagus ,tomato and grape juice on cyclophosphamide induced genotoxicity in mice . J. African Biotechnol ., 7 : 3383-3388
5. Bahmanpour ,S. , Talaei ,T. , Vojdani ,Z. , Panjehshahin ,M.R. , Poostpasand ,A. , Zareei ,S. and Chaeminia ,M. (2006) . Effect of *phoenix dactylifera* pollen on sperm parameters and reproductive system of adult male rats . J. Iran Med., 31(4) :208-212.
6. British herbal pharmacopeia. (1983) . British herbal medicine association .pp244-245.
7. Coles, E. H. (1980) . Veterinary clinical pathology 3rd ed. W. B. Sauhders Company. London
8. Cruickshank, R., Duguid, J. P., Mormion, B. P. and Swain, R. H. A., (1975). Medical Microbiology, Vol. 2, 12th ed. Edinburgh: Churchil Living Stone.
9. Deuster ,P. , Maier ,S. , Moore ,V. , Paton ,J. , Simmons ,R. and Vawter ,S. (2004) .Dietary supplements and military divers a synopsis for undersea medical officer . Uniformed Services University of the Heart Sciences . pp: 16-18.
10. El-Siddig,K. , Gunasena ,H.P , Prasad ,B.A. , Pushpakumara ,D.K. , Ramana ,K.V. , Vijayanand ,P. and Williams J.T.(2006). Tamarind, *Tamarindus indica*. Southampton Centre for Underutilised Crops, Southampton, UK.
11. Hegazi ,A.G. and Abd El-Hady .(2007) . Influence of honey on the suppression of human low density lipoprotein (LDL) peroxidation (*In vitor*) .J. eCAM .6(1) :113-121 .
12. Martin ,P. , Lorente ,G. , Hortiguela ,V. and Carretero ,L. (2006) . Influence of different pollen conservation conditions ,preliminary studies . Bee Research Institute Dol. , p:112-113 .
13. Naranjo ,R. , Sanchez ,J. , Paramas ,G. and Gonzalo ,J. (2004). Analysis of bee pollen pigments by HPLC and mass spectrum . J. of Chroma , 1054(1):205-210.
14. Owayss ,A.A. , Rady, M.M. , Gadallah , F.M. (2004) . Pigmentation of some honey bee *Apis mellifera* L. products . J. Fayoum , 18(2)121-130 .
15. Pratt , D . E . and Miller , E . E . (1984). A flavonoid antioxidant in Spanish peanuts . JAOCs., 61(6) : 1064 – 1071 .
16. Roman ,D. , Zurek ,G. , Babmann ,C. , Abarca , N. , Quirantes ,R. , Carretero , A. and Gutierrez ,A. (2007). Identification of phenolic compounds from pollen extracts using capillary electrophoresis – electrospray time of flight mass spectrum . J. Arial Bioanal Chem ., 389:1909-1917.
17. Sato, T., Onse, Y., Nagase, H. and Kito, H. (1990). Mechanism of antimutagenicity of aquatic plant extracts against (benzo (a) yrene) in the *Samonella* assay .J. Mut. Res ., 241:283-290 .
18. Shubber, E. K. (1981). The genetic hazard of ten antiparasitic drugs compared to radiation. Ph. D. Thesis, Harvard Univ., cambridge, U. S. A :p 28.
19. Vekiari, S. A., Orcopoulo, V. and Thomopoulos, C. D. (1993). Oregano flavonoids as lipid antioxidants.J. JAOCs., 70 (5) : 483-487.