

New Formula of Linear Interpolation

صيغة جديدة للاندراج الخطي

م.م سمية عبد العباس صيفي
جامعة كربلاء - كلية الصيدلة

م.م محمد يحيى عبد
جامعة كربلاء قسم الرياضيات- كلية التربية

Abstract:-

In this paper we have developed the method of Linear Interpolation which is considered the simplest way of the interpolation methods. We have been able to deduct a new interpolation formula that termed (New Formula of linear Interpolation). It has been proved, through the new formula that the results obtained are more accurate than the results obtained by using the Linear Interpolation. Moreover there is no need to reduce the value of (h) to have a good approximate value.

For comparison purposes, other methods were used like: Lagrange Interpolation, Taylor Interpolation and Linear Interpolation.

On the other hand, the researchers have used the Law of Error of interpolation.

المستخلص:

في هذا البحث قمت بتطوير طريقة الاندراج الخطي (Linear Interpolation) والتي تعتبر من ابسط طرق الاندراجم فتمكننا من الحصول على قانون جديد في الاندراجم أسميناه صيغة جديدة لاندراج الخطي (New Formula of linear Interpolation) ولاحظنا ومن خلال القانون الجديد أن النتائج التي حصلنا عليها أكثر دقة من النتائج التي نحصل عليها عندما نستخدم قانون الاندراجم الخطي، بالإضافة إلى ذلك فأنت لا تحتاج إلى تقليل قيمة (h)كي تحصل على تقرير حيد. وأجل المقارنة استخدمنا طرق أخرى مثل (Lagrange Interpolation)، (Taylor Interpolation) (Linear Interpolation) كما سيأتي توضيح ذلك من خلال الأمثلة حيث ان نتائج قانون الاندراجم الخطي المطور أكثر دقة وأحيانا تصاهي طريقة الاندراجم لاكرانج.

1-المقدمة:

قبل الشروع بالبحث سوف ادرج وبشيء من الاختصار بعض القوانين التي تحتاجها في البحث:

1-1. قانون الاندراجم الخطي. [1]

$$f(x) = f(x_i) + \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} [f(x_{i+1}) - f(x_i)] \dots \quad (1-1)$$

حيث أن x هي النقطة المطلوب إيجاد قيمه الدالة عندها و x_i هي النقطة التي تكون قبل نقطه x .
و x_{i+1} هي النقطة التي تكون بعد نقطه x .

2-1 . قانون لاكرانج في الاندراجم [2] قانون لاكرانج من الدرجة الاولى

$$p_1(x) = f(x_0)L_0(x) + f(x_1)L_1(x) \quad \dots \quad (1-2)$$

بحيث

$$L_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} , \quad L_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

Or $p_2(x) = f(x_0)L_0(x) + f(x_1)L_1(x) + f(x_2)L_2(x)$

بحيث

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} , \quad L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} , \quad L_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

[3-1] قانون تايلر في الاندراج

$$T_2(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} \quad \dots (1-3)$$

2- شرح اشتقاق قانون الاندراج الخطى المطور مع الامثله:

اذا كانت لدينا القيم المجدولة كما ياتي

$$\frac{x}{f(x)} \left| \begin{array}{c} x_0 \\ f(x_0) \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} x_1 \\ f(x_1) \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} x_{i-1} \\ f(x_{i-1}) \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} x_i \\ f(x_i) \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} x_{i+1} \\ f(x_{i+1}) \end{array} \right| \dots$$

نفرض اننا نريد ان نجد $f(x)$ عندما تكون x بين x_{i-1} و x_i فيمكن ذلك خلال طريقة الاندراج الخطى (linear interpolation) حيث


$$f(x) = f(x_i) + \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} [f(x_{i+1}) - f(x_i)]$$

وهذا القانون اشتق من الجزء رقم 1 المشار اليه بالرسم أدناه حيث تمكنت من ايجاد $f^I(x)$ والتي تساوي تقريباً قيمة $f(x)$ اي ان

$$f^I(x) = f(x_i) + \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} [f(x_{i+1}) - f(x_i)]$$

حيث أن $f^I(x)$ موضحة في الرسم أدناه على أنها قيمة الدالة المراد معرفتها عند (x)

اما من خلال بحثي فتمكنت من الحصول على $f^D(x)$ والتي هي تساوي تقريباً قيمة $f(x)$ وكما موضح بالجزء 2 المشار إليه بالرسم أدناه



حتى نحصل على قيمة $f(x)$ نرسم خط مستقيم من النقطه A إلى النقطه E ثم إلى النقطه D ثم نكمل رسم المثلث كما في الجزء 2

الموضح بالرسم فنحصل على تطابق المثلثين ومن التطابق نحصل على $\frac{AB}{AC} = \frac{EB}{DC}$ وهذا يؤدي

$$\frac{\frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{f(x) - f(x_{i-1})}}{\frac{x_i - x_{i-1}}{x - x_{i-1}}} \Rightarrow f(x) = f(x_{i-1}) + \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}} [f(x_i) - f(x_{i-1})]$$

ثم بعدها قمت بایجاد المعدل وذلك بجمع القيمتين المقربتين لـ $f(x)$ فحصلت على

$$f(x) = \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2}$$

والتي هي قريبة جداً من النقطه المطلوبه على المنحني

$$\therefore f(x) = \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} + \frac{(x - x_{i-1})(f(x_i) - f(x_{i-1}))}{2(x_i - x_{i-1})} + \frac{(x - x_i)(f(x_{i+1}) - f(x_i))}{2(x_{i+1} - x_i)}$$

والقانون الاخير هو قانون الاندراج الخطى الجديد (New Formula of Linear Interpolation)

مثال 1 // اذا كان لدينا الجدول التالي

x	9	9.5	10
$\ln x$	2.1970	2.2510	2.3026

المطلوب ايجاد قيمة $\ln 9.21$ ؟

مجلة جامعة كريلاء العلمية – المجلد التاسع - العدد الثالث / علمي / 2011

الحل:

1- قيمة $\ln 9.21$ بواسطة الحاسبة اليدوية هي 2.22028985

2- الحل باستخدام الطرق الاندراج الممثلة بالمعادلات (1-1),(Li),(1-2),(Gi),(1-3) وكذلك الطريقة الجديدة في هذا البحث (1-4)(Mi). وكما موضح في الجدول (1) أدناه.

Li	Gi	Ti	Mi
2.166376	2.21968	1.5	2.220376

3- في الجدول (2) أدناه سوف نقوم بالمقارنة بين الخطأ التقريري والخطأ حسب قانون الاندراج حيث ان

$$\left| \text{الخطأ التقريري} - \text{القيمة الحقيقية} \right| = \text{القيمة التقريرية}$$

والخطأ حسب قانون الاندراج

$$\text{Exact error} = \binom{x}{n+1} h^{n+1} f^{(n+1)} \quad (1-5)$$

$$\text{Ex err} = \binom{x}{2} h^2 f''(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{2!} h^2 \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 0.000089744$$

e_L	e_g	e_t	e_m	e_{exact}
0.05391385	0.00060985	0.72028985	0.00008615	0.000089744

فنلاحظ ان نتيجة الحل باستخدام طريقة الاندراج الخطى المطور اقرب الى الجواب الحقيقى من بقية الطرق وهذا موضح من خلال الجدول (2) اعلاه.

مثال 2:- اذا كانت لدينا القيم المجدولة

x	0	0.5	1	1.5
$\sin x$	0	0.008726	0.01745	0.02617

المطلوب هو معرفة $(\sin 0.3)$.

الحل:

1- القيمة الحقيقية ل $\sin 0.3$ باستخدام الحاسبة اليدوية 0.005235963.

2- الحل باستخدام الطرق الاندراج الممثلة بالمعادلات (1-1),(Li),(1-2),(Gi),(1-3) وكذلك الطريقة الجديدة في هذا البحث (1-4)(Mi). وكما موضح في الجدول (3) التالي.

Li	Gi	Ti	Mi
0.005237	0.005237	0.3	0.0052366

3-في الجدول (4) أدناه سوف نقوم بالمقارنة بين الخطأ التقريري والخطأ حسب قانون الاندراج حيث ان

$$\text{الخطأ التقريري} = \left| \frac{\text{القيمة الحقيقية}}{\text{القيمة التقريرية}} - 1 \right|$$

والخطأ حسب قانون الاندراج

$$\text{Exact error} = \binom{x}{n+1} h^{n+1} f^{(n+1)}$$

e_L	e_g	e_t	e_m	e_{exact}
0.000001	0.000001	0.2947640	0.0000006	0.000039

فلاحظ أن نتيجة الحل باستخدام طريقة الاندراج الخطى المطور اقرب الى الحل الصحيح منه عندما نستخدم الاندراج الخطى.

مع هذا تبقى لكل مسألة ظروفها في استخدام أي القوانين الأفضل إلى الحل أي ربما يكون استخدام قانون الاندراج الخطى أفضل من القانون الخطى المطور لكن يمكننا ان نعتمد القانون الخطى المطور كطريقة كما لاحظنا الأمثلة أعلاه.

وآخر ما نقول انه أفضل القوانين إلى الحل هو الذي يكون فيه مقدار الخطأ اقل ما يمكن.

References:

1-Alshallah Khalid "Lecture of Numerical Analysis" , Third class, Mathematics Dept.
Education College, Babylon University, 2000.

2- Curtis F. Gerald/Patrick O.Wheatly "Applied numerical analysis". Third edition. California polytechnic State University, San Luis Obispo, 1985.

3-Richard L.Burden "Numerical analysis". Seven edition, Brooks/ Cole product, USA, 2001.

4-Steven E." Numerical Methods Course Notes" Dept. of Math. Univ. of California
At San Diego 2004.