

## Effect of defferent Aphids density on dvelopment of larvae and morphological charactres of adults of two Coccinellid species

### تأثير كثافات من مختلفة في تطور يرقات نوعان من الدعاسيق وبعض صفات البالغات

أ.م.د. سعدي محمد هلال \* أ.م.د. عايد نعمه عويد\*\* م. يوسف دخيل راشد\*\*  
\* جامعة بابل – كلية العلوم – موم البنات  
\* هيئة التعليم التقني – الكليه التقنيه المسيب

#### المستخلص :

في دراسته مختبريه نفذت في الموسم الربيعي لعام ٢٠٠٨ ، غذيت يرقات الاول لكل من الدعسوقه ذات النقاط السبع *Coccinella septempunctata* L. و الدعسوقه ذات النقاط الاحدى عشر *C. undempunctata* L. على كثافات من مختلفه ( ٠ ، ٤ ، ٨ ، ١٦ ، ٣٢ ، ٦٤ حوريه ) من حوريات العمر الحوري الاخير لحشرة من الباقلاء الاسود *Aphis fabae* لبيان مدى تأثيرها في مدة تطور الدور اليرقي وبزوغ البالغات وخصوبة الاناث ومعدل طول وعرض ووزن البالغات الناتجه . اوضحت النتائج :  
انخفاض معدل مدة كل طور يرقي ولكل دعسوقه وبفروقات معنويه مع ازدياد كثافة المن المجهزه مع اختلاف حجم الدعاسيق البالغه الناتجه عن التغذيه على كثافات من مختلفه اثناء الدور اليرقي وبشكل معنوي وبأختلاف كثافات المن المجهزه وازدياد عدد البيض الذي تضعه الاناث ابتداءا من تغذية الطور اليرقي على كثافة من 64 حوريه صعودا كما لوحظ وجود علاقته طرديه بين معدلات طول وعرض ووزن البالغات مع كثافة المن المجهزه لكل طور يرقي ووجود علاقته عكسيه بين معدل طول فترة ما قبل وضع البيض وكثافة المن المجهزه لليرقات بينما كانت هنالك علاقته طرديه بين طول مدة حياة البالغات وكثافة المن المجهزه .

#### Abstract :-

The effect of defferent number of aphids ( 0,2,4,8,16,32 and 64 ) daily supplied to 1<sup>st</sup> larvae instar of *C. septempunctata* L. and *C. undempunctata* L. were studies during spring season 2008 , the results showed :

The average life – sparn of each larval instar was reduced signaficantly as the number of daily supplied aphid increased . The size of emerged adult ladybird beetles resulted from feding on different aphid densities were signaficantly different .The number of eggs from each femal resulted from feding on differen aphid densities were increased when 1<sup>st</sup> larval fed on 64 nymph .There was a relationship between the averge of coccinellidadult length and weight with densities of aphid supplied daily to 1<sup>st</sup> larvl instar . The average life –sparn of each adult stage was increased signaficantly as the numbe of aphid supplied daily increased .preoviposition period was reduced signaficantly as the number of aphid supplied daily increased .

#### المقدمة

تعد الدعاسيق من اكثر انواع الخنافس ذات التغذيه الحيوانيه .وهي تعود الى عائلة الدعاسيق Coccinellidae. سجل منها أكثر من ٦٠ نوع في العراق [١] ولها دورا " مهما " في مجال المكافحة الطبيعية لعدد كبير من الافات الزراعية لاسيما ذات الاجسام الصغيرة والرهيفة كحشرات المن والذباب الابيض وغيرها وهي ذات مدى واسع من العوائل الحشرية وعلى أدوارها المختلفة [ ٢ و ٣ ] ان اهم عامل حيوي يؤثر في كمية الغذاء المستهلك هو كثافة الضحية حيث وجد [ ٤ و ٥ ] بأن هنالك علاقة ايجابية بين استهلاك الغذاء من قبل الدعسوقه ذات النقاط السبع *C. septempunctata* L. وكثافة حشرات المن حيث يزداد الاستهلاك من قبل الدعاسيق بازدياد الكثافة العددية لحشرات المن كذلك وجد ان كمية الغذاء المستهلكة في الدور اليرقي ودور البالغة للدعسوقه ذات النقاط السبع ذات علاقة بدرجات الحرارة حيث يزداد الاستهلاك بزيادتها [٦]. وجد [ ٧ ] ان الاستهلاك يزداد مع انخفاض نسبة الرطوبة في الهواء ولاحظ [ ٤ و ٨ ] ان كمية الغذاء المستهلكة من قبل الدعسوقه ذات النقاط السبع كان اكبر خلال مدة الضياء مقارنة مما هو عليه الحال خلال مدة الظلام وان اليرقات كانت نشطة في التغذية على المن خلال كلا الفترتين ( الضياء والظلام ) هذا وقد بين [ ٩ ] ان يرقة الدعاسيق تستهلك حوالي ٤٠٠ حشرة من متوسطة الحجم خلال تطورها الى مرحلة العذراء وبالغاتها تستهلك ٣٠٠ حشرة من متوسطة الحجم خلال حيلتها . وأشار [ ١٠ ] الى ان معدل عدد حشرات المن المستهلكه خلال مدة

الدور اليرقي للمفترس *C. undecimpunctata* بلغت ١٨٦ ، ١٧١.٧٥ ، ١٧٣.٧٥ و ١٤٤.٧٥ حوريه عند تغذيتها على من الباقلاء الاسود ، من الدفله ، من الخوخ الاخضر ومن اوراق الذره على التوالي كما وجد [١١] ان للمفترس *C. undecimpunctata* كفاءه افتراسيه عاليه تجاه حشرات المن وان كفاءته في استهلاك الفريسه تزداد بزيديتها . ووضح [١٢] ان معدل عدد حشرات من الباقلاء الاسود المفترسه يوميا من قبل الدعسوقه *C. undecimpunctata* تزداد بزيادة كثافة المن المجهزه يوميا وان اعلى معدل لعدد حشرات المن المفترسه بلغ ٢٨٠ حشرة من / يوم وادنى معدل ١٥ حشرة من وان المفترس يفضل حشرة من الباقلاء الاسود على انواع المن الاخرى في التغذية كمن الداوودي ومن الدفله ومن المشمش. وبناءا على ما تقدم فقد اجري هذا البحث الذي يهدف الى دراسة تأثير كثافات مختلفه من حشرات من الباقلاء الاسود *Aphis faba* مقدمة كغذاء في تطور يرقات كلا الدعسوقتين ذي النقاط السبع وذي النقاط الاحدى عشر وتأثير التغذية في صفات البالغات لنتاجه .

## المواد وطرائق العمل

تهيئة مستعمرة الدعاسيق

جلبت اعداد من ذكور واناث بالغات الدعسوقه ذات النقاط السبع *Coccinella septempunctata* L. والدعسوقه ذات النقاط الاحدى عشر *C. undempunctata* L. من حقول محصول الجت في منطقة المسيب خلال شهر اذار من عام ٢٠٠٨ ربيت كل منهما على انفراد في اقفاص تربيه خشبيه الصنع قياس ٦٠×٦٠×٦٠ سم ، تحتوي بعض اوجها زجاج شفاف والبعض الاخر قماش موسلين ومزود بفتحه يمكن من خلالها التحكم بفتحه وغلقه او ادخال الحشرات واخراجها او ادخال الغذاء وازالة الفضلات. زود كل صندوق يوميا بكميات كافية من الغذاء الطبيعي ( حوريات من الباقلاء الاسود ) يجلب من الحقول المجاورة. رتب مكان ملائم لوضع البيض داخل كل صندوق من قبل اناث الدعاسيق يتكون من طبقتين من قطعة من الكارتون المموج يحتوي اثنتاءات من احد جهتيه وذو قياس ١٥×١٠ سم ولمنع الافتراس الذاتي ترفع البيوض يوميا" وتحفظ في اطاق لحين الاستعمال [٤] .

تأثير كثافات مختلفه من حوريات حشرة المن في تطور يرقات الدعاسيق

تم الحصول على يرقات بعمر يوم واحد من اقفاص التربية من الفقرة السابقة وكلا الدعسوقتين بحيث وضعت كل يرقة في وعاء بلاستيكي قطر ٦ سم وعمق ٣ سم وكلا على انفراد . جهزت كل يرقة يوميا" بأعداد مختلفه من حوريات العمر الحوري الاخير لحشرة من الباقلاء الاسود ( ٠ ، ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٦ ، ٣٢ ، ٦٤ ، ١٢٨ ) حورية وبواقع خمس مكررات لكل معاملة ثم سدت فتحات الاطباق بقطعة من قماش المورسولين وثبت برابط مطاطي . وضعت جميع الاطباق بصورة عشوائية في الحاضنه وعلى درجة حرارة ٢٦±٢ م وبفترة اضاءة ١٢ ساعة ضوء يوميا" . احصي عدد حشرات المن المفترسه يوميا" من قبل كل يرقة لحين انسلاخها الى الطور اللاحق وحسبت مدة تطور الدور اليرقي وعدد الاعمار اليرقية ، كذلك ملاحظة بزوغ البالغات أو فشلها في الخروج من دور العذراء ، وطول فترة ما قبل وضع البيض ومدة حياة البالغة إضافة الى تأثير التغذية في خصوبة الاناث وفي معدل طول و عرض ووزن بالغة كل دعسوقه .

## التحليل الإحصائي

صممت التجارب وفق التصميم التام التعشيه ( C.R.D ) وحللت النتائج باستخدام جدول تحليل التباين وقرنت المتوسطات الحسابية باستخدام أقل فرق معنوي اصغر (L.S.D) تحت مستوى معنوية ٠.٠٥ لاختبار معنوية النتائج . [١٣] .

## النتائج والمناقشة

تأثير كثافات من مختلفه في تطور يرقات الدعاسيق

تشير نتائج جدول(١) الى موت يرقات الطور الاول للدعسوقه ذات النقاط السبع بعد مرور يوم واحد من بدأ التغذية في حالة عدم توفر الغذاء وذلك اعتمادا على الغذاء الذي حصلت عليه اليرقة بعد فقسها من قشرة البيضة وان اقل عدد من الحشرات الذي يجب توفره ليرقات الطور الاول لكي تتمكن من الانسلاخ والوصول الى الطور اللاحق هو ٢ حورية / يرقة / يوم وقد استغرق العمر اليرقي الاول ٣ يوم عند جميع الكثافات المجهزه ( ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٦ ، ٣٢ ) وبدون فروقات معنوية . أما يرقات الطور الثاني فقد امتد عمرها الى ٢.٨ يوم عندما جهزت كل يرقة بحوريتين من يوميا" وبفارق معنوي عن باقيه المعاملات التي استغرق فيها هذا الطور ٢ يوم فقط وفيما يتعلق بمدة تطور يرقات العمر الثالث فان اعلى مدة تطور بلغت ٥.٦ يوم عند الكثافة ٢ حورية / يرقة / يوم ، ولكنها فشلت في الوصول الى الطور الرابع حيث ماتت تلك اليرقات قبل الانسلاخ في حين اكملت يرقات هذا العمر وانسلخت الى العمر الرابع عند التغذية على الكثافات ٤ و ٨ حوريه حيث بلغت مدة الطور لكل منهما ٥.٠ و ٤.٠ يوم على التوالي وبلغت مدة الطور ٣.٠ يوم عند الكثافات ١٦ ، ٣٢ و ٦٤ حورية / يرقة / يوم على التوالي وبفارق معنوي عن معاملة المقارنة و بقية الكثافات. اما بالنسبة لتطور يرقات العمر الرابع فان اعلى مدة تطور بلغت ٨.٨ يوم عند التغذية على ٨ حورية من و اقل مدة تطور ٤.٠ يوم عند التغذية على كثافة من ٦٤ حوريه وان اليرقات المتغذيه على ٤ حوريه ماتت قبل ان تدخل في دور العذراء لكن اليرقات

جدول (١) تأثير كثافات من مختلفة في تطور يرقات الدعسوقة ذات النقاط السبع *C. septempunctata* وطول العمر اليرقي .

معدل العمر للدور اليرقي/يوم				عدد حوريات المن المجهزة يومياً/يرقة
العمر اليرقي الرابع	العمر اليرقي الثالث	العمر اليرقي الثاني	العمر اليرقي الأول	
٠.٠	٠.٠	0.0*	1.0	٠
٠.٠**	٠.٦	٢.٨	3.0	٢
٠.٤***	٠.٠	٢.٠	3.0	٤
٨.٨	٤.٠	٢.٠	3.0	٨
٧.٢	٣.٠	٢.٠	3.0	١٦
٥.٠	٣.٠	٢.٠	3.0	٣٢
٤.٠	٣.٠	٢.٠	3.0	٦٤
١.١٦٩	٠.٤٣٨	٠.٢١٩	0.001	L.S.D 0.05

\* ماتت قبل أن تصل الى الطور اللاحق

\*\* ماتت قبل ان تدخل في دور العذراء

\*\*\* فشلت في الخروج الى البالغة من دور العذراء

المتغذية على ٨ حورية فشلت في الخروج الى البالغة من دور العذراء , كما اظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين مدة الطور وكثافة المن المجهزة يومياً لكل يرقة حيث انخفضت مدة الطور الرابع على سبيل المثال الى ٤.٠ و ٥.٠ يوم عند التغذية على الكثافات ٦٤ و ٣٢ حورية من / يرقة / يوم ، بالمقارنة مع ٧.٢ و ٨.٨ يوم عند الكثافات ١٦ و ٨ حورية من / يرقة / يوم على التوالي وبفروقات معنوية . كما اشارت النتائج ايضا الى ان اقل عدد من حوريات المن التي يجب ان تجهز يومياً لكل يرقة من يرقات الدعسوقة ذات النقاط السبع لكي تتمكن من الوصول الى دور العذراء بشكل طبيعي وتخرج منه بالغات سليمة هو ١٦ حورية من . أما نتائج جدول (٢) فقد اشارت الى ان اقل عدد من الحوريات الذي يجب توفره ليرقات الطور الاول للدعسوقة *C. undempunctata* L . لكي تتمكن من الانسلاخ والوصول الى دور العذراء هو ٤ حورية من / يرقة / يوم . أما في الكثافات من ٨ - ٦٤ حورية فإن اليرقات تمكنت من التطور والانسلاخ الى الاطوار اللاحقة والوصول الى دور العذراء ومن ثم خروج البالغة وقد استغرق الطور اليرقي الاول ٤ يوم عند الكثافة ٢ حورية من/ يرقة في حين بلغ معدل مدة الطور اليرقي الاول ٣ يوم عند بقية الكثافات ٤ - ٦٤ حورية

جدول (٢) تأثير كثافات من مختلفة في تطور يرقات الدعسوقة ذات النقاط الاحدى عشر . *C. undempunctata*

معدل العمر للدور اليرقي				عدد حوريات المن المجهزة يومياً/ يرقة
العمر اليرقي الرابع	العمر اليرقي الثالث	العمر اليرقي الثاني	العمر اليرقي الأول	
٠.٠	٠.٠	٠.٠*	١.٠	٠
٠.٠**	٦.٠	٣.٠	٤.٠	٢
١٢.٢	٤.٢	٢.٠	٣.٠	٤
٥.٨	٤.٠	٢.٠	٣.٠	٨
٤.٠	٣.٠	٢.٠	٣.٠	١٦
٢.٠	٣.٠	٢.٠	٣.٠	٣٢
٢.٠	٣.٠	٢.٠	٣.٠	٦٤
٢.٠	٠.٠٠٢	٠.٠٠٢	٠.٠٠١	L.S.D 0.05

\* ماتت قبل أن تصل الى الطور اللاحق

\*\* ماتت قبل ان تدخل في دور العذراء

وبفروقات معنوية . اما فيما يخص الطور اليرقي الثاني لها فقد استغرق ٣ يوم و ٢ يوم عندما جهز بـ ٢ حورية وللكتافات ٤ - ٦٤ حورية على التوالي وبفروقات معنوية . وقد استغرق الطور اليرقي الثالث ٦.٠ , ٤.٢ و ٤.٠ عند الكثافات ٢ , ٤ و ٨ على التوالي وبفروقات معنوية واضحة في حين استغرق الطور اليرقي الثالث ٣ يوم عند الكثافات ١٦ , ٣٢ و ٦٤ حورية. أما يرقات العمر الرابع فأنها لم تتمكن من الوصول الى دور العذراء عند الكثافة ٢ حورية في حين نجحت في بقية الكثافات من ٤ - ٦٤ حورية والوصول الى دور العذراء فعند الكثافة ٤ حورية بلغ ١٢.٢ يوم ولاتوجد فروقات معنوية بين بقية الكثافات ٨ - ٦٤ حورية حيث تراوحت بين ٥.٨ - ٢.٠ يوم كذلك اظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين مدة الطور وكثافة حوريات المن المجهزه يوميا" حيث انخفضت مدة الطور الرابع من ١٢.٢ يوم عند الكثافة ٤ حورية الى ٢.٠ يوم عند الكثافة ٦٤ حورية وبفروقات معنوية واضحة .

تأثير كثافات من مختلفه في خصوبة اناث الدعاسيق

تشير نتائج جدول (٣) الى ان اقل عدد من حوريات المن التي يجب ان تجهز لأناث الدعاسيق لكي تتمكن

جدول(٣) تأثير كثافات من مختلفه في خصوبة الدعسوقه ذات النقاط الاحدى عشر. *C. undempunctata* والدعسوقه

ذات النقاط السبع. *C. septempunctata*

معدل مجموع عدد البيوض الموضوع / انثى		عدد حوريات المن المجهزة يوميا" / يرقة
الدعسوقه ذات النقاط الاحدى عشر	الدعسوقه ذات النقاط السبع	
-	-	٠
-	-	٢
-	-	٤
-	-	٨
-	-	١٦
٥٠٤.٣	٢٢٣.٣	٣٢
١٤٩٨.٣	١٢٣٣.٣	٦٤
١٧.٥٩	٤٠.١	L.S.D

من وضع البيوض هو ٣٢ حورية من /يرقه / يوم , حيث بلغ معدل عدد البيوض الذي وضعته كلا الدعسوقيتين ذات النقاط السبع وذات النقاط الاحدى عشر عند هذه الكثافة ٦٤ حورية من كان ٢٢٣.٣ و ٥٠٤.٠ بيضه على التوالي ولم تتمكن بالغات الدعسوقه ذات النقاط السبع المتغذيه على كثافة ١٦ حورية من وضع البيوض وكذلك الحال مع الدعسوقه ذات النقاط الاحدى عشر اما الحالات الاخرى فان الدعاسيق هلكت قبل الوصول الى الدور الكامل. وقد بلغ اعلى معدل عدد البيوض الذي وضعته الاناث للدعسوقيتين ذات النقاط السبع وذات النقاط الاحدى عشر ١٢٣٣.٣ و ١٤٩٨.٣ بيضه عندما جهزت بكثافته ١٢٨ حورية من وهذه النتائج تتطابق مع ما ذكره [ ١٤ ] بان اناث الدعسوقه ذات النقاط السبع تميزت بوضع اعداد كبيره من البيوض عند توفر الغذاء الكافي لها وهو من المشمش حيث فاق وزن البيوض الموضوع وزن الانثى نفسها .

تأثير كثافات من مختلفه في معدل طول وعرض ووزن بالغات الدعاسيق

تشير نتائج جدول (٤) الى وجود علاقة طرديه بين معدلات طول وعرض ووزن بالغات الدعسوقه ذات النقاط السبع الناتجه من يرقات جهزت بكثافات من مختلفه حيث وجد بأن معدل طول وعرض ووزن بالغات الدعسوقه ذات النقاط السبع قد تضاعف عندما ازدادت كثافة المن المجهزه يوميا لكل طور يرقي من ١٦ - ٦٤ حورية

جدول (٤) تأثير تغذية يرقات العمر الاول للدعسوقه ذات النقاط السبع *C. septempunctata* والدعسوقه ذات النقاط الاحدى عشر *C. undempunctata* L بكثافات من مختلفه في معدل طول وعرض ووزن البالغات الناتجه

معدل وزن البالغه (ملغم)		معدل العرض (ملم)		معدل الطول (ملم)		عدد حوريات المن المجهزة يوميا" / يرقة
الدعسوقه ذات النقاط الاحدى عشر	الدعسوقه ذات النقاط السبع	الدعسوقه ذات النقاط الاحدى عشر	الدعسوقه ذات النقاط السبع	الدعسوقه ذات النقاط الاحدى عشر	الدعسوقه ذات النقاط السبع	
0.0	٠.٠	0.0	٠.٠	*0.0	*٠.٠	٠
0.0	٠.٠	0.0	٠.٠	0.0	٠.٠	٢
1.4	٠.٠	0.4	٠.٠	0.8	٠.٠	٤
6.4	٠.٠	1.5	٠.٠	3.4	٠.٠	٨
11.2	٢٥.٠٤	2.3	٢.٩٠	5.2	٥.٣٢	١٦
17.9	٤٠.٨٠	3.1	٣.٣٠	6.2	٦.٦٠	٣٢
20.8	٤٨.٣٦	3.6	٤.٣٥	7.4	٨.٨٠	٦٤

١.٨٦	٣.٥٨	0.371	٠.٢٠	0.630	٠.٤٨	L.S.D 0.05
------	------	-------	------	-------	------	---------------

ماتت قبل وصولها دور البالغة

/ يوم وبفروقات معنوية بين المعاملات. ونفس الجدول اشار ايضا الى ان معدلات طول وعرض ووزن بالغت الدعسوقة ذات النقاط الاحدى عشر عند الكثافة ٦٤ حوريه / يرقه / يوم قد ارتفع عما هو عليه الحال عند الكثافة ٤ حوريه من / يرقه / يوم وان معدل وزن البالغات الناتجة من تغذية يرقات العمر الاول عند الكثافة ٦٤ حوريه كان كبيرا نسبيا ٢٠.٨ ملغم مقارنة بـ ١.٤ ملغم عند الكثافة ٤ حورية من / يرقه / يوم .

تأثير تغذية يرقات العمر الاول للدعاسيق بكثافات من مختلفه في نسب خروج البالغات وطول فترة ما قبل وضع البيض وطول مدة الحياة

يبين جدول (٥) بأن نسب خروج البالغات للدعسوقة ذات النقاط السبع *C. septempunctata* عند تغذية اليرقات على الكثافات ١٦, ٣٢ و ٦٤ حوريه من / يرقه / يوم قد بلغ ١٠٠% اما معدل طول فترة ما قبل البيض فقد بلغ اعلى مده ١٤ يوم عند الكثافة ١٦ حوريه في حين انخفض الى اقل من ١١ يوم عند الكثافة ٦٤ حوريه وهذا يعني وجود علاقه عكسيه بين معدل طول فترة ما قبل وضع البيض وكثافة المن المجهزه لليرقات . اما طول مدة الحياة فأتضح بان هنالك علاقه طرديه بين طول مدة الحياة وكثافة المن المجهزه , حيث بلغ اقل معدل طول مدة الحياة ٢٦ يوم عند الكثافة ١٦ حوريه في حين بلغ اعلى معدل لطول مدة الحياة اكثر من ٦٠ يوم عند الكثافة ٦٤ حوريه . واتضح من الجدول (٥) ايضا ان نسبة خروج بالغات الدعسوقة ذات النقاط الاحدى عشر *C. undempunctata* كان ٤٠, ١٠٠, ١٠٠, ١٠٠, ١٠٠ و ١٠٠% عند الكثافات ٤, ٨, ١٦, ٣٢ و ٦٤ حوريه من / يرقه / يوم على التوالي . وان بالغات الدعسوقة الناتجة عن يرقات غذيت على كثافه ٤ حوريه من قد فشلت في وضع البيض وماتت جميعا بعد مرور ١٢ يوما من خروجها من دور العذراء في حين انخفض معدل طول فترة ما قبل وضع البيض الى ٩ يوم عند الكثافة ٦٤ حورية من مقارنة بـ ١٤ يوم عند الكثافة ٨ حوريه من / يرقه / يوم وان اعلى معدل طول في مدة حياة البالغات الناتجة من يرقات ربيت على كثافات من عاليه ٦٤ حوريه بلغ اكثر من ٦٠ يوم مقارنة بأقل معدل طول مدة حياة البالغات التي ربيت على كثافة ٤ حوريه من قد بلغ ١٦ يوم . ان البالغات الناتجة عن اليرقات والتي ربيت على كثافات واطنه من المن ٨- ١٦ قد وضعت عددا قليلا من البيوض وبشكل مبثر وليس على شكل كتل كما هو الحال في الحاله الطبيعيه وان تلك البالغات انخفض عمرها مقارنة مع البالغات ذات التغذية على كثافات اعلى. وقد ذكر [١٥] بأنه يجب الاخذ بنظر الاعتبار بان المفترس ذو معدل التغذية العالي قد لا يكون بالضروره هو العدو الطبيعي المناسب حيث ان مثل هذا النوع من المفترسات قد يحتاج الى كثافات من عاليه والتي قد تفوق مستوى التحمل الاقتصادي وبصوره عامه يمكن القول بأن الدعسوقة ذات النقاط السبع *septempunctata* و *C. undempunctata* ذات النقاط الاحدى عشر *C. undempunctata* هما عوامل مكافحه حيويه فعاله ومؤثره ضد حشرات المن ولكن طاقتهما قد تتحدد بعدد كبير من العوامل منها كثافة المن التي على الارجح العامل الاكثر اهميه حيث ان الحد الادنى لكثافة المن التي تحتاجها هذه الدعاسيق لكي تبقى على قيد الحياة او لكي تتطور وتنمو وتضع بيضا خصبا هو نوعا ما عالي , وقد لا يكون هذا المستوى من الكثافه موجودا في الحقل ونتيجة لذلك فان الفعاليه وكفاءة المفترس سوف تكون منخفضه .

جدول (٥) تأثير تغذية يرقات العمر الاول للدعسوقة ذات النقاط السبع *C. septempunctata* و *C. undempunctata* بكثافات من مختلفه في نسب خروج البالغات ومعدل طول فترة ما قبل وضع البيض ومعدل مدة الحياة

معدل طول مدة الحياة		معدل طول فترة ما قبل وضع البيض		% لخروج بالغات الدعسوقة		عدد حوريات المن المجهزة يوميا/ يرقه
ذات النقاط الاحدى عشر	ذات النقاط السبع	ذات النقاط الاحدى عشر	ذات النقاط السبع	ذات النقاط الاحدى عشر	ذات النقاط السبع	
٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	*٠.٠	*٠.٠	٠
٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٢
١٢	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٤٠	٠.٠	٤
٢٩	٠.٠	١٤	٠.٠	١٠٠	٠.٠	٨
٣٨	٢٦	١٣	١٤	١٠٠	١٠٠	١٦
٤٨	٣٢	١١	١٣	١٠٠	١٠٠	٣٢
اكثر من ٦٠ يوما	اكثر من ٦٠ يوما	٩	١١	١٠٠	١٠٠	٦٤

ماتت قبل وصولها دور البالغة

المصادر

1. Ali , H. A.; Abdul-Russoul M.S. and Swail M.A. (1990) Systematic list of Coccinellidae recorded for Iraq , by Iraq nut . his mus. 8 (3) 45 -51
٢. الزبيدي , حمزه كاظم : عواد شعبان داوود و محمد فريح عيدان (١٩٩١) . دراسة الكثافة الافتراسيه لحشرة الدعسوقه ذات النقطة السبع *Coccinella septempunctata* لمن اوراق المشمش مع دراسة حساسيتها للمبيدات الكيماويه , مجلة زراعة الرافدين مجلد ٣٢ عدد (٤) كلية الزراعة والغابات – جامعة الموصل .
٣. العلاق , محمد : مريم البصله : عادل المفتي ونورا حسيني . (٢٠٠٤) . التربيـــــــــه المختبريه للدعسوقه المقترسه ( ابو العيد ذو الســـــــــبع نقط ) *Coccinella septempunctata* (Coleoptera : Coccinlidae) . المؤتمر العربي الاول لتطبيقات المكافحه البيولوجيه جامعة القاهرة ٥ -٧ نيسان ٢٠٠٤ .
- 4 .Hilal, S.M. (1983) Biology and behaviour of *C. septempunctata* L, In relation to the control of the genus peach aphid *Myzuz persica*.( Su 12) Ph . D. Thesis , Newcastle Univ. V. R.r. 178 -181
- 5.Popov, P. (1960). Role of *C. septempunctata* L,in the biological control of aphid Selskostop misul Sofiya 152 -153 ( in Bulgarium) cited by Hdek, I. 1973
6. Hoder, I. (1973). Biology of Coccinellidae . Academic czechost - Ovakia. Prague 260 pp.
7. Hodek, J. ; Novak, K. Sokuhravy, V. and Holman, J.( 1965) . The predation of *C. septempunctata* L. on *Aphis fabae* scop. On sugar beet. Acta. Entomol. Bohemo Solv. 62 : 11 -22 .
8. Asgari , A. (1966) . Exogenous and endogenous components in the area of Hobenheim near Stuttgartas the most importan predators of *Aphis pomi* .Z Angew Zool. 53 ;35 – 93 .
9. Roy, V. and Bellows, T. S. (1996) . Biological Control . Springer Press . 539 pp.
١٠. مؤنس , عبدالله حسين . ( ٢٠٠٧ ) تأثير الفريسه في بعض جوانب الاداء الحياتي للدعسوقه ذات النقاط الاحدى عشر *Coccinella undempunctata* . اطروحة دكتوراه / كلية التربية - جامعة القادسيه.
11. Carbral , S. ; Soares , A. O. And Patricia , G. (2009) .Predation by *Coccinella undempunctata* ( Coleoptera : coccinellidae ) on *Myzus persica* Sulzer ( Homoptera : Aphididae) . Effect of prey density . J. of Biological Control . 50 (1) : 25 -29.
١٢. الجبوري , عمــــــــار كريم خـــــــــضير . (٢٠١٠) دراسة حياتية وبيئية المقترس متشابهة الاجنحه Homoptera . رسالة ماجستير / الكلية التقنية المسيب - هيئة التعليم التقني .
١٣. محمد , نعيم ثاني ; احمد عبدالرحيم و حلمي حامد خضير . (١٩٩٢) . الاحصاء وتخطيط التجارب الزراعيه . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – هيئة المعاهد الفنيه ٢٦٥ صفحه
١٤. الزبيدي , حمزه كاظم . (١٩٩٢) . المقاومه الحيويه للافات , دار الطباعة للنشر – جامعة الموصل ٤٣٧ صفحه .
15. Kuenen,D.J. 1947 .On the ecological significance of two predators of *Metatetranychus ulmi* . Tiodschr . Entomol. 88 : 303 – 312 .