

Study of fungal population in *Citrus aurantium* root soil

دراسة المجتمع الفطري لترابة جذور نبات النارنج

م. م . صابرین عبد الامیر کمال
کلیة العلوم للبنات / جامعة بابل

الخلاصة:

شملت هذه الدراسة جمع 44 عينة تربة لنبات النارنج بواقع 22 عينة من منطقة التربة البعيدة عن الجذور بمسافة 15-10 سم وعن سطح التربة بمسافة 55-50 سم و 22 عينة من المنطقة الملائمة لسطح الجذور بعمق 50-55 سم عن سطح التربة من ناحية ابی غرق في محافظة بابل لغرض دراسة المجتمع الفطري ودراسة الظروف البيئية من حيث درجة الحرارة والرطوبة خلال مدة الدراسة والتي امتدت من شهر تشرين الاول / 2011 لغاية نهاية شهر شباط / 2012 وقد تم عزل 678 عزله فطرية تعود الى 10 أنواع اضافية الى الخمائر وعزلات فطرية لم يتم تشخيصها ، شكلت الفطريات الناقصة Deutromycota نسبة 72,91 % و البصيلية Oomycota 40,1 % و اللافجية Zygomycota 6,89 % و الكيسية Ascomycota 6,49 % . كان الفطر Aspergillus niger هو الاكثر ترددًا في المنطقتين بنسبة 53,8 % والفطر Mucor وهو الاقل ترددًا بنسبة 0,5% من مجموع الفطريات المسجلة.

Abstract :

In this study , we collected 44 soil samples of *Citrus aurantium*, (22 samples from non – rhizosphere and 22 samples from rhizoplane) from Abi- Gharaq in Babylon province to Study fungal population & Environmental conditions which include temperature & Humidity from October / 2011 to February / 2012. We obtained 678 fungal strain back to 10 genera and yeasts and some strain didn't diagnosis . Deutromycota was the higher ratio with 72.91 % then Oomycota with 40.1 % , Zygomycota 6.89 % finally Ascomycota 6.49 % . This study showed that *Aspergillus niger* was the higher frequency in both zone with 53.8 % and *Mucor* was the lower frequency from registered fungi with ratio 0.5% .

المقدمة :

دراسة الفطريات والتعرف عليها أمر في غاية الاهمية لما لها من علاقة وطيدة بحياة الانسان والحيوان والنبات والبيئة بصورة عامة (1) ، تحتل الحمضيات المركز الاول في الانتاج العالمي اذ بلغ عام 1999 نحو 98258000 طن (2) وبذلك تعد ثمار الحمضيات ذات مكانه اقتصادية مهمة ، ومن هذه الثمار نبات النارنج او ما يعرف بالبرقال المر، اصل النارنج من الصين وان زراعته انتشرت في البلدان المجاورة ونقله العرب الى اسبانيا وزرع فيها عدة سنوات قبل البرقال (3) يتوقف نجاح زراعة النارنج على حسن اختيار منطقة الزراعة نظراً لأهمية الظروف المناخية على نمو الاشجار ، وفي العراق نجحت زراعة النارنج وذلك لقدرته على تحمل الطقس الحار ، ولذا يكثر استخدام النارنج في الاطباق العراقية كبديل لعصير الليمون (4) وفي دراسة Mishra & kanaujia في العام 1973 بيّنت ان جذور النباتات هي الموقعا الاساس للحصول على المادة العضوية وبالتالي هي الموقع الاساس الذي تزداد فيه اعداد الممرضات نتيجة التفاعلات البايوكيميائية بينها وبين ما يفرزه الجذر. لقد بين Alexander (5) ان المسبب الرئيس للأمراض الفطرية التي يصاب بها الانسان والحيوان والنبات هي الانواع التابعة للأجناس التالية :

Aspergillus , Penicillium , Phytophthora , Pythium , Rhizoctonia

ان المجتمع الفطري Fungal population متعدد في ترب و جذور النباتات وتوجد دراسات حول هذا التنوع منها دراسة (6) التي بيّنت تنوع مجموعة من الفطريات في ترب الغابات الرطبة دائمة الخضرة في جنوب الهند وسيادة فطري الاسيرجلس والبنسيليوم على غيرها من الفطريات ، ودراسة (7) ايضاً في غابات Mudumalai في جنوب الهند بيّنت سيادة الفطريات الناقصة ثم الكيسية ثم البازيدية وفق ظروف التجربة ، وفي العراق نصيب لمثل هذه الدراسات منها (8) واجريت هذه الدراسة لمعرفة التنوع الفطري حول ترب و جذور نباتي العائق والنخيل في محافظتي بابل وكربالاء ، ودراسة للموسوي (9) بيّنت تنوع المجتمع الفطري لترابة نبات البابامياء في محافظة كربلاء .

تصاب اشجار النارنج عادة بمجموعة من الامراض الفطرية حيث ان بعض الفطريات تحدث اصابة للجذور او الساقان او الاوراق او الثمار (3) من هذه الاصابات : تصمغ القاعدة او تصمغ العفن البني ، موت البادرات ، تصمغ الافرع والاغصان ، عفن الارميلاريا ، عفن القلف ، الانثراكتنوز ، الفطر الهبائي ، عفن الثمار .

اما التربة الملائمة لزراعة اشجار الموز ومنها النارنج فيمكن زراعتها في اراضي متباينة القوام ولكن يفضل ان يتراوح قوامها من رملية الى طينية خفيفة ويجب ان تكون التربة جيدة التهوية والصرف وخالية من الطفقات الصماء بحيث لا يقل بعد مستوى الماء الارضي عن (1,50) سم من سطح التربة ويجب عدم زراعتها في الاراضي الملحية اذ يظهر الملح فيها على شكل خطوط

وعلى ظهر حواف الشقوق للترابة ، وعند زراعة النارنج تختلف جذوره في نموها بان تكون سطحية او عميقه النمو وهذا يعتمد على الظروف البيئية وطريقة الزراعة اذا كانت اصول النارنج افلام او بنور ونوع الاصول المستعملة في الزراعة (3) . وللفطريات دور مهم في التربة من تحليل المركبات العضوية المخلفات النباتية والحيوانية وتدمير عناصر مهمة للترابة (10) وسيوضح البحث المجتمع الفطري المتواجد في الترب حول جذور النارنج في ناحية ابي غرق في محافظة بابل ومعرفة تردد الفطريات وكذلك تحليل التربة (درجة الحرارة والرطوبة) وقد اختبر نبات النارنج لأنه نبات يتتحمل الطقس الحار ويحتاج الى موسم نمو دافئ حيث كلما ازدادت درجة الحرارة ازداد الانبات وصولاً الى (25 – 30) م ولكن لا يتتحمل درجات حرارة اعلى من 40 م وهذا يعني ان له متطلبات بيئية لنمو تسهل نمو المجتمع الفطري ايضاً حيث ان المدى الامثل لنمو الفطريات المحبة للحرارة المتوسطة (20 – 30 م) .

نبات النارنج :

1- تصنيف نبات النارنج :

الاسم الشائع : البرتقال المر Bitter orange

الاسم العلمي : *Citrus aurantium*

العائلة : السذابية Rutaceae

2- وصف نبات النارنج :

شجرة او شجيرة يصل ارتفاعها الى 10 امتار . اوراقها جلدية عاصفة اللون والازهار بيضاء لها رائحة عطرية لطيفة ، الثمرة كروية كبيرة ذات لون برتقالي محمر وخشنة الملمس طعمها حامض مثل الليمون ، الاجزاء المستعملة منه هي : الثمار و قشور الثمار والازهار (3) .

3- التركيب الكيميائي لنبات النارنج :

يحتوي ثمار وقشور وازهار النارنج العديد من المركبات الكيميائية ذات الفائدة الطبيعية والغذائية واهمية صناعية اذ انه يحتوي على مجموعة كبيرة من الاحماض منها:

Acetic acid , ascorbic acid , benzoic acid , formic acid Geranic acid , Malic acid , Methanol , Ethanol , terpineol , acetaldehyde . كما انه يحتوي على : tannic acid , Cinnamic acid ,hesperidin , geraniol , furfural ,citronellal , citral Naringin , Naringenin , limonene , hexanol ,linalool وغيرها الكثير من المواد الكيميائية .

المواد وطرائق العمل :

1- العينات : 44 عينة تربة بوزن (500- 1000 غم) بواقع 22 عينة للمنطقة البعيدة عن الجذور بمسافة 15-10 سم وعن سطح التربة بمسافة 55-50 سم و 22 عينة للمنطقة الملائمة لسطح الجذور بعمق 50- 55 سم عن سطح التربة .

موقع الدراسة : اخذت عينات التربة من ناحية ابي غرق في محافظة بابل التي تبعد 9 كم عن مركز المحافظة ، من مميزات هذه التربة انها تربة مزيجية رملية .

3- جمع العينات : جمعت العينات الى 44 من تربة أشجار النارنج ابتداءً من شهر تشرين الاول 2011 لغاية نهاية شهر شباط 2012 ، تزن كل عينة 500- 1000 غم بعد تنظيف طبقة التربة وتبع كل عينة عن الاخرى 1 متر و حفظت العينات في اكياس نظيفة ثم نقلت الى المختبر غربلت للتخلص من الحصى والرمل وخزنلت لحين فحصها (11) .

4- تحليل التربة :

4-1: درجة الحرارة : تم قياس درجة حرارة التربة بعمق 15 سم باستعمال محوار زئبقي وترك لمندة 5 دقائق الى ان استقرت القراءة ثم سجلت الدرجة وحسبت بمعدل 5 قراءات للشهر الواحد (12) وخلال الدراسة تم قراءة درجة الحرارة للفترة من شهر تشرين الثاني 2011 ولغاية منتصف اذار 2012 .

4-2: الرطوبة النسبية : جفف وزن معلوم من التربة بدرجة حرارة 90 م لمندة 24 ساعة بواسطة الفرن الكهربائي وتم حساب الرطوبة النسبية بتطبيق المعادلة (11) .

$$\text{الرطوبة النسبية \%} = \frac{\text{وزن التربة الرطبة} - \text{وزن التربة الجافة}}{\text{وزن التربة الجافة}} \times 100$$

5- عزل الفطريات :

5-1 وسط العزل: استخدم وسط اكار البطاطا المحضر وفقاً للمصدر ويكون من المواد الاتية :

*Potato extract 200 gm

* Dextrose 20 gm

*Agar 15 – 20 gm

اذبيت هذه المواد وأكمل الحجم الى 1000 مل ماء مقطر ويعقم بجهاز التعقيم الموصد بدرجة حرارة 121 م وبضغط 15 بار لمندة 15 دقيقة ثم يضاف المضاد الحيوي كلورامفينيكول 250 ملغم / لتر و يتم ليبرد الى 45 م و يستخدم .

5- طريقة عزل الفطريات :

من التربة البعيدة عن الجذور **Non-Rhizosphere** : يؤخذ من عينة التربة 0,5 غم ويذاب في 100 مل ماء مقطر اي بنسبة (w/v 1:200) وبعد الرج لدقائق واحدة يسحب 1 مل من العالق ويصب منه 0,5 مل في طبق بتري معقم ثم يضاف الوسط الزراعي المبرد الى 45 م° بواقع مكربين لكل عينة ثم يحرك حركة رحوية دائرية ليمزج جيداً ويترك ليتصلب ثم يحضرن في الحاضنة بدرجة حرارة 28 م° لمدة 7 ايام وبعدها تشخص الفطريات (11) .

من التربة الملائمة لسطح الجذور **Rhizoplane** : تم تقطيع الجذور بطول 1 سم بما فيها من تربة ماتصفة عليها وغسلها بالماء المقطر مرة واحدة وتحت ظروف معقمة ثم جفت الجذور على اوراق ترشيح معقمة من نوع wattman No.1 وزرعت اربعة قطع من الجذور الجافة على سطح الاوساط الزراعية المتصلبة المحضرة مسبقاً وتحضرن في الحاضنة بنفس الظروف السابقة ، ثم تشخص الفطريات النامية بعد مدة الحضن (13) .

3- فحص وتشخيص الفطريات المعزولة:

1. الخصائص المظهرية :

تشمل شكل المستعمرة ، لونها ، حجمها، قوامها ، الصبغة التي تنتجهما من الجهة الخلفية للطبق (14) .

2. الخصائص المجهرية :

تشمل وجود الابواغ وشكلها وعدد الخلايا. ويتم ذلك بنقل جزء صغير من مستعمرة الفطر باستعمال ابرة تلقيح معقمة الى قطرة من صبغة اللاكتوفينول على شريحة زجاجية نظيفة سخن الشريحة بعد وضع غطاء الشريحة بإمرارها قليلاً على لهب مصباح بنزن بعدها فحصت تحت المجهر بقوة $40 \times 10 \times 40$ و $40 \times 10 \times 4$ للاحظة الصفات المجهرية للغزل الفطري (14) و صنفت العزلات الفطورية وفقاً لـ (15 , 16) .

4- تحليل المجتمع الفطري احصانيا :

- **تحليل التركيب العام للمجتمع الفطري :** تم حساب العدد الكلي للعزلات الفطورية في المنطقتين البعيدة والملائمة لسطح الجذور وذلك بعد المستعمرات الفطورية النامية على الاطباقي ، وكذلك تم حساب العدد الكلي لأنواع الفطورية المعزولة ثم استخرجت النسبة المئوية للعدد الكلي للعزلات الفطورية بحسب المعادلة الآتية (17) :

$$\text{النسبة المئوية للعدد الكلي للعزلات} = \frac{\text{عدد العزلات المتواجدة في المنطقة الواحدة}}{\text{العدد الكلي للعزلات في المنطقتين}} \times 100$$

2- حساب النسبة المئوية للتعدد Frequency :

تم حساب النسبة المئوية للتعدد الفطريات في منطقتي التربة لنباتات النازرج وفق المعادلة الآتية (17) :


$$F = \frac{\text{عدد عزلات الفطر الواحد}}{\text{عدد العزلات الكلية في المنطقة الواحدة للنبات}} \times 100$$

حيث تمثل F = النسبة المئوية للتعدد.

النتائج:


العوامل البيئية:

درجة الحرارة : سجلت درجة الحرارة للفترة من شهر تشرين الثاني 2011 الى منتصف شهر آذار 2012 حيث سجلت أعلى درجة حرارة للتربة في شهر آذار حيث كانت 23 م° اما معدل درجات الحرارة فسجل أعلى معدل في منتصف شهر آذار حيث بلغت 21,6 م° اما ادنى معدل لدرجة الحرارة فكان في شهر كانون الاول اذ بلغت 16 م° كما يلاحظ في الشكل أدناه :



1-2- رطوبة التربة :

سجلت اعلى درجة رطوبة في عينات التربة خلال شهر شباط لعام 2012 حيث كانت 22.6 % وادنى درجة رطوبة في شهر تشرين الثاني لعام 2011 حيث بلغت 8,09 % كما يلاحظ في الشكل ادناه :



دراسة المجتمع الفطري :

باتباع طريقة التخفييف جمعت 536 عزله فطرية من ترب نباتات النارنج البعيدة عن الجذور و 142 عزلة فطرية من المنطقة الملائمة لسطح الجذور في ناحية أبي غرق وتعود هذه الفطريات المعزولة الى 10 أنجاس من الفطريات اضافة الى الخمائر وبعض العزلات الفطرية التي لم يتم تشخيصها ، في المنطقة البعيدة عن الجذور non-rhizosphere سجلت الفطريات الناقصة سيادة في تلك المنطقة بنسبة 56,5% تلتها الفطريات البيضية بنسبة 32,08 % ثم اللاقحية 5,78 % واخيرا الكيسية 5,59 %. اما المنطقة الملائمة لسطح الجذور rhizoplane ايضا كانت السيادة للفطريات الناقصة بنسبة 16,41 % ثم البيضية 8,02 % ثم اللاقحية 1,11 % واخيرا الكيسية 0,9 % كما في الجدول رقم (1) .

جدول (1) يبين نسب سيادة الفطريات في منطقتي الدراسة :

المجاميع الفطرية	نسب الفطريات في المنطقة البعيدة عن الجذور	نسب الفطريات في المنطقة البعيدة عن الجذور
الفطريات الناقصة	% 56,5	% 16,41
الفطريات البيضية	% 32,08	% 8,02
الفطريات اللاقحية	% 5,78	% 1,11
الفطريات الكيسية	% 5,59	% 0,9

الجدول رقم (2) يبين انواع واعداد العزلات الفطرية في مناطق الدراسة :

جدول (2) يبين انواع واعداد العزلات الفطرية :

SPECIES	NON-RHIZOSPHERE	RHIZOPLANE
<i>Alternaria alternate</i>	18	6
<i>Aspergillus niger</i>	172	38
<i>Aspergillus terrus</i>	10	5
<i>Aspergillus flavus</i>	14	4
<i>Cladosporium herbarum</i>	6	0
<i>Fusarium spp.</i>	48	26
<i>Mucor spp.</i>	3	0
<i>Phytophthora spp.</i>	74	25
<i>Pythium spp.</i>	98	18
<i>Penicillium notatum</i>	15	5
<i>Penicillium expansum</i>	8	2
<i>Penicillium echinulatum</i>	4	0
<i>Penicillium egypticum</i>	8	2
<i>Rhizopus spp.</i>	28	6
<i>Yeast spp.</i>	30	5
TOTAL	536	142

أظهرت الاعداد الكلية للعزلات تذبذبا ملحوظا في المنطقة الواحدة خلال فترة الدراسة فقد اظهرت نتائج البحث ان الفطر *Aspergillus niger* كان الاكثر تردد في المنطقتين البعيدة والملاصقة للجذور وبنسبة 30,3% و 23,5% على التوالي . في حين سجل الفطر *Mucor* اقل نسبة تردد في المنطقة البعيدة عن الجذور 0.5% وفي المنطقة الملاصقة لسطح الجذور فقد سجلت الفطريات *Cladosporium herbarum , Mucor , Penicillium echinulatum* اقل نسبة تردد وهي صفر كما في الجدول رقم (3) .

جدول (3) يبين النسبة المئوية للعدد الكلي للعزلات N والنسبة المئوية للتردد F للأنواع الفطرية المعزولة :

SPECIES	NON-RHIZOSPHERE		RHIZOPLANE	
	N	F	N	F
<i>Alternaria alternate</i>	2.6	8.4	0.1	16
<i>Aspergillus niger</i>	23	30.3	5	23.5
<i>Aspergillus terrus</i>	1	1.7	0.6	3.1
<i>Aspergillus flavus</i>	1	2.4	0.5	2.5
<i>Cladosporium herbarum</i>	0.8	1.1	0	0
<i>Fusarium spp.</i>	6	8.4	3	16
<i>Mucor spp.</i>	0.4	0.5	0	0
<i>Phytophthora spp.</i>	10	13.1	3	15.5
<i>Pythium spp.</i>	13	17.7	2	11.1
<i>Penicillium notatum</i>	2	2.6	0.6	3.1
<i>Penicillium expansum</i>	1	1.4	0.2	1.2
<i>Penicillium echinulatum</i>	0.5	0.7	0	0
<i>Penicillium egypticum</i>	1	1.4	0.2	1.2
<i>Rhizopus spp.</i>	4	4.9	0.8	3.7
<i>Yeasts spp.</i>	4	5.3	0.6	3.1

المناقشة :

العوامل البيئية : سجلت درجات الحرارة والرطوبة النسبية خلال فترة الدراسة تذبذبا ملحوظاً بين ارتفاع وانخفاض وهذه النتائج تتفق مع ما سجلته هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي في محافظة بابل خلال فترة البحث .

دراسة المجتمع الفطري :

من خلال النتائج في الجدول (1و2 و3) اعلاه سجلت الفطريات الناقصة النسبة الاكبر من الفطريات المعزولة وهذه النتيجة تتفق مع غيرها من الدراسات من حيث سيادة الفطريات الناقصة لتراب مختلفة في العالم منها (18 ، 19) , كما ان هناك دراسات في الوطن العربي اعطت نتائج مشابهة لسيادة الفطريات الناقصة (20) اما في العراق فيوجد نصيب لمثل تلك الدراسات منها دراسة (21) حيث اجريت الدراسة على الترب المزروعة في جنوب العراق ، كما اجرى (22) دراسته على الترب الصحراوية في جنوب العراق ، وهناك دراسة عن ترب وسط وجنوب العراق لـ (8 ، 23) واجريت دراسة على ترب نبات الباميا في محافظة كربلاء وسط العراق ، يعزى السبب في انتشار وسيادة هذا النوع من الفطريات كونها تتكيف للمعيشة في مختلف البيئات وذلك لقدرتها على تكوين تراكيب تكافيرية مقاومة للظروف غير المناسبة (9) ، اما على صعيد انتشار الانواع الفطرية فقد سجل الفطر *A.niger* أعلى نسبة تردد في المنطقة البعيدة والملاصقة لسطح الجذور 30,3% و 23,5% على التوالي ربما يعود السبب لسرعة مدى تحمله للنمو والتكاثر في ظروف بيئية مختلفة فضلاً عن تكوين الوحدات التكافيرية اللاجنسية ولبعض انواعه اجسم حجرية اكثر مقاومة للظروف البيئية الغير ملائمة (24) وبعض انواعه لها القدرة على انتاج سموم الافلاتوكسین الفعالة التي تساعد الفطر على التنافس في البيئة التي يستطيع النمو فيها وتثبيط نمو أنواع اخرى من الكائنات (25) وبقية الانواع الاخرى اختلفت نسبة ترددتها في المنطقة وتذبذبت نسبتها ربما يعزى السبب الى ملائمة ظروف المنطقة حيث الرطوبة ودرجة الحرارة الملائمة (20-15 م°) مما ادت الى ظهور تنوع في نسبة تردد هذه الفطريات وهذه النتيجة من حيث التردد تتفق مع (6) . وربما يعزى السبب في ذلك الى مايفرزه النبات من مواد مثبطة لنمو بعض الانواع او محفزة للنمو وطبيعة نمو وظروف تحمل كل نوع فطري (26) اضافة الى ان أشهر الدراسة قد يكون لها تأثير من حيث مناخها حيث ان أشهر الخريف تؤدي الى زيادة تنوع الاعداد الفطرية حيث الرطوبة ودرجات الحرارة المعتدلة توفر فرصه افضل لنمو الفطريات والمنافسات الضعيفة النمو لأن بعض الفطريات في التربة تقوم بتحليل المركبات العضوية والمخلفات الحيوانية والنباتية وانتاج مركبات كاربوهيدراتية وتحويل المركبات البروتينية الى أمونيا ومركبات نتروجينية بسيطة وتدوير عناصر مهمة في التربة مثل الكبريت ، البوتاسيوم ، الفسفور ، الكالسيوم ، النتروجين ، (8) .

مجلة جامعة كربلاء العلمية – المجلد العاشر - العدد الرابع / علمي / 2012

المصادر :

- ١ • علي ، بتول زينل ؛ حبيب، خالد عبد الرزاق؛ حسن، توفيق محمد.(1989).علم الفطريات. مطبعة جامعة بغداد .
- ٢ • F.A.O. (1999). Production year Book. 115 .Rom .
- ٣ • مركز البحوث الزراعية. (2003) . زراعة وانتاج الموالح في اراضي الوادي والدلتا . الادارة المركزية للإرشاد الزراعي . معهد بحوث البساتين . جمهورية مصر العربية . نشرة رقم850 .
- ٤ • العاني ، عبدالله نجم. (1980) . مبادئ علم التربة ، دار الكتب للطباعة والنشر – جامعة الموصل .
- ٥ • Alexander, M.(1977). Introduction to soil microbiology . John Wiley and sons . USA. PP: 467 .
- ٦• Saravanakumar,K. and Kaviyarasan,V.(2010).Seasonal distribution of soil fungi and chemical properties of montane wet temperate forest types of Tamil Nadu . A frican Journal of Plant Science. Vol.4(6),pp.190-196.
- ٧• Satisch, N. ; Sultana,S.and Nanjundiah ,V.(2007). Diversity of soil fungi in a tropical deciduous forest in Mudumalai,Southern India.Curr .Sci. , 93 : 669-677.
- ٨ • Al-Zujaji, R.N.(2000), Study of fungal community to the soil *Alhagi graecorum* and *phoenix dactylifera* in kerbala and Babylon province. M.Sc. thesis . coll.Sci. Univ. of Babylon. (Arabic) .
- ٩ • الموسوي ، رشا نوري جواد . (2011) . دراسة المجتمع الفطري لترية نبات البابمية . مجلة جامعة بابل/ العلوم الصرفه والتطبيقية . العدد (2) . المجلد (19) .
- ١٠ • Christensin , M.(1989) , A view of fungal ecology . Mycology, 81(1):1-19 .
- ١١• Abdel-Hafez , S.I.(1982). Thermophilic and thermotolerent fungi in the desert soil in Saudia Arabia. Mycopathologia , 80 : 15-20 .
- ١٢ • Widden , P. and Abitbol, J.J.(1980), Seasonality of Trichoderma spp. on a spure – forest soil. Mycologia, 72:775-784.
- ١٣• Abdel-Hafez , S.I. and El-Maghraby O.(1992). Seasonal Fluctuation of root and surface fungi of *Zygophyllum coccineum* growth in wadi Bir – Ain, Eastern desert,Egypt,Abhat .
- ١٤ •Kwon- chung, K.S. and Bennett , E. (1992). Medical mycology Williams and wilkins , 2nd (ed) . U.S.A.
- ١٥ •Ellis, M.B.(1993). Dematiaceas hyphomycetes. Common , mycol. Inst. Kew., Surrey , England , 608 pp .
- ١٦ • Barron , G.L.(1983). The Genera of hyphomycetes from soil. Robert Krieger publishing comp. Florida .
- ١٧ •Booth ,T.;Gorrie,S.and Muhsin ,T.M. (1988). Life strategies among fungal ,assemblages on *salicornia europaca* agg.Mycologia,80:176-191.
- ١٨ • Gochenaur, S.E. (1978), Fungi of along island oak – birch forest community organization and seasonal occurrence of the opportunistic decomposer of A horizon. Mycologia , 70:975- 994 .
- ١٩ •Wacha, A. G. and Tiffany , L. H. (1979) Soils Fungi isolated form fields under different Tillage and weed- control regimes, Mycologia, 71:1215-1226 .
- ٢٠ •Moubasher A.H. and El-Dohlob S. M.(1970) . Seasonalfluctuation of Egyptian soil fungi. Trans.Mycol.Soc.,54(1):45-51.
- ٢١ •Ismail, A.S. and Abdullah , S.K.(1977) . Studies on the soil fungi. Proc. Indian . Aca. Sci., Vol. 86 B, No.3 : 151- 15 .
- ٢٢• Daraj, H.F. (1989). Studies of fungi associated with desert plant in south of Iraq. M.Sc. thesis coll. Educ. Univ. Basrah .
- ٢٣•Hamad , N.S. (1998). Microfungal Community in Iraq desert lands. Ph.D. thesis . coll. Sci. uni. Babylon .
- ٢٤• Domach ,K.H. Gams , W. and Enderson ,T.(1980) . Compenedium of Soil fungi. Academic press , London , Vol.1 ,PP:859 .
- ٢٥• Mishra, R.R., kanaujia , R.S. (1973). Opservation on soil fungistasis , Fungistasis in relation to soil depth , seasonal changes , soil Amendment and physio – chemical characteristics of the soil plant and soil.38 :321- 330 .
- ٢٦ • Muhsin, T.M and Daraj, H.F. (1993) . Population dynamic of *Alternaria* species associated with salt desert plants in Iraq. Abhath Al-yarmouk. J.2:9-29 .