

## Efficiency evaluation Some of biocontrol agents and chemical compound to control Fusarium wilt disease caused by *Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici* on tomato under field condition

تقويم كفاءة بعض عوامل المكافحة الاحيائية والكيميائية في التأثير على مرض الذبول الفيوزاري في الطماطة المتسبب عن الفطر *Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici* تحت الظروف الحقيقة

حليمة زغير البهادلي  
كلية الزراعة /جامعة بغداد  
وقاية النبات / سمو فطرية  
كاميل سلمان جبر  
كلية الزراعة /جامعة كربلاء  
وقاية النبات / امراض نبات  
يسار ناصر الحميري  
كلية الزراعة /جامعة بغداد  
وقاية النبات / فطريات  
الباحث مسؤول من اطروحة دكتوراه للباحث الاول

### الملخص

تناولت الدراسة تقويم فعالية عوامل المكافحة في السيطرة على مسبب المرض تحت الظروف الحقلية ، وتأثيرها في حاصل النبات . وقد اظهرت النتائج ان جميع معاملات المكافحة ادت الى خفض معنوي في نسبة وشدة المرض بعد 60 يوم اذ استطاعت البكتيريا *Pseudomonas putida* و *Enterobacter cloacae* خفض نسبة وشدة المرض معنوياً اذ حققت جميع عوامل المكافحة بمفردها Nb5 ، Nb9 ، EM1 و Sb29 في المعاملات الملوثة بالفطر الممرض من خفض نسبة وشدة المرض قياساً بمعاملة السيطرة الملوثة بالفطر الممرض بمفرده . اذ تراوحت نسبة وشدة المرض في معاملتي البكتيريا 20.00 و 10.25 و 12.00 و 23.33 % على التتابع قياساً بمعاملة السيطرة التي بلغت 85% و 54.67% على التتابع . في حين اظهرت معالتي المستحضر الحيوي EM1 و مستخلص عشبة البحر Sb29 خفضاً معنوياً في نسبة وشدة المرض قياساً بمعاملة السيطرة اذ بلغت فيها 16.66 و 9.33 و 20.00 و 8.67 % على التتابع . وتفوقت معالمة التوليفة بين عزلتي البكتيريا Nb5 و Nb9 في مكافحة المرض اذ بلغت نسبة وشدة المرض في معاملتيهما 6.66 و 4.16% على التتابع . بينما اظهر التكامل بين معاملات التجربة الى مكافحة المرض بشكل تام . مما انعكس وبصورة إيجابية على معدل الطول، الوزن الطري و الجاف، والحاصل لنباتات الطماطة قياساً بمعدل الحاصل لمعاملة الفطر الممرض بمفرده . حيث ظهر تفوقاً معنوياً لمعاملة التكامل بين عزلتي البكتيريا والمستحضر EM1 والمستخلص Sb29 إذ كان وزن الحاصل فيها 6.52 كغم /نبات ، قياساً بمعاملة السيطرة اذ كان وزن الحاصل فيها 0.983 كغم /نبات . تلتها معالمة التوليفة بين عزلتي البكتيريا مع المستخلص Sb29 بزيادة معنوية بوزن الحاصل التي بلغت 6.46 كغم /نبات ، تلتها معالمة البكتيريا Nb9 فقط اذ بلغت 5.82 كغم /نبات وبدون فرق معنوي مع معالمة التوافق بين عزلتي البكتيريا والمستحضر الحيوي EM1 التي بلغت 5.80 كغم /نبات تلتها بقية المعاملات الاخرى .

### Abstract

The study aimed to evaluate the efficiency of some agents to control the pathogen under field conditions, and the yield of tomato plant . Results under field condition , where all the control agents caused a reduction in disease incidence and severity after 60 days . all control agents Nb5, Nb9, EM1 and Sb29 individually with the treatments of pathogenic fungus achieved reduction in disease incidence and severity compared with control treatment which was inoculated with the pathogenic fungus only . the disease incidence and severity in the treatments of the two bacteria isolates ranged 20.00- 10.25 % and 23.33- 12.00% respectively compared with control treatment which reached 85% and 54.67% respectively. While The two treatments the Bioprodut EM1 and sea weed extract Sb29 showed significant reduction in disease incidence and severity compared with control treatment which reached in their treatment 16.66, 9.33 %, and 20.00 , 8.67% respectively. The interaction between the two bacteria isolates Nb5 and Nb9 showed superiority in disease control . the percentage of disease incidence and severity 6.66 and 4.16 % respectively .The integration between treatments led to completely control the disease . led to increase in plant height , fresh and dry weights , and the yield of tomato plant , compared with fungus treatment individually (control) . the yield weight was found to be 6.52 kg/ plant in the tow bacterial isolates with EM1 and Sb29 extract compared to

0.983 kg/ plant in control , followed by the combination of the two isolates with Sb29 which attained to 6.46 kg/plant , then *P.putida* alone , 5.82 kg/plant,

## المقدمة

تعد الطماطة *Lycopersicon esculentum* Mill. من اهم محاصيل الخضر لما تمتلكه ثمارها من قيمة غذائية عالية فهي غنية بالفيتامينات مثل فيتامين A و C والعناصر المعدنية مثل الحديد والفسفور، وهي تستهلك طازجة وتدخل في كثير من الصناعات الغذائية (2,1)

ان الانتاج العالمي للطماطة يزداد بمعدل 10% سنوياً منذ عام 1985 لكنه لايسد الزيادة الحقيقة لاستعمال الطماطة مع الزيادة السكانية ، وفي الوقت نفسه هناك كثير من العوامل الاساسية لتدحرج الانتاج العالمي للطماطة ، منها الاضرار الناجمة عن المرضيات سواء اكانت فايروسات ، فطريات ، بكتيريا أم نيماتودا التي تسبب كثيراً من الخسائر بالانتاج (3) ، اذ تصاب بالعديد من المسببات المرضية المهمة منها مسببات امراض الذبول واللفحات والتقرحات والموزائيك وتتجدد الاوراق وغيرها ، وفي السنوات الاخيرة اصبحت هذه الامراض من العوامل الرئيسية المحددة لانتاج الطماطة ، وان امراض الذبول المسببة عن الفطر

*Fusarium oxysporum* تؤثر بشكل كبير جداً في الانتاج العالمي للطماطة (4) وان التوجهات الحديثة في العالم هو ايجاد طرائق بديلة عن المبيدات الكيميائية تكون امنة للبيئة ومن هذه الطرائق استعمال الفطريات والبكتيريا الموجودة في منطقة حول الجذور. والتي تؤثر في حدوث وتطور الامراض وخاصة التي تكون مسبباتها المرضية من احياء التربة .

اذ اظهرت العديد من ابحاث وانواع البكتيريا الجذرية المحفزة لنمو النبات Promoting Plant Growth (PGPR) كفاءة ضد فطريات التربة الممرضة للنبات ومنها مسببات الذبول الوعائي فضلاً عن دورها في تحفيز نمو النبات (7,6,5) ، ومن الإستراتيجيات الحديثة للحصول على وقاية وإنتاج مثاليين والسيطرة على أحياء التربة استعمال المستحضرات الحيوية ومنها Effective Microorganisms (EM) إذ تستغل تأثيراته المضادة ضد المسببات المرضية ، وتحسين نمو النبات والحاصل اذ تنتج الأحياء المجهرية المكونة له هرمونات مثل Gibberellin و Auxin و Cytokinin و إنزيمات وفيتامينات ومضادات حيادية (8)

ومن الطرق البديلة الاخرى التي نالت اهتمام الباحثين هي المواد المستخلصة من النباتات بأعتبرها مواداً موجودة اصلاً في النبات (9) ، فقد اظهر استعمال مستخلص عشب البحر *Ascophyllum nodosum* قدرتها في استimulation الدفاعات النباتية في مكافحة مسببات الامراض ومنها الفطر *Fusarium oxysporum* (10) ولا همية مرض الذبول الفيوزاري في الطماطة هدفت الدراسة الى : • تقويم كفاءة بعض أوجه التكامل في مكافحة مرض الذبول الفيوزاري في الطماطة باستعمال بكتيريا PGPR وعامل الاستimulation Sb29 والمستحضر الحيوي EM1 تحت ظروف الحقل .

## المواد وطرائق العمل الاحياء المستخدمة في الدراسة

عزل الفطر *Fusarium oxysporum f.sp lycopersici* (FOL) من نباتات الطماطة واثبتت قدرته المرضية وشخص الى مستوى النوع باتباع الطرق المظهرية والمزرعية والجزئية والشكل الخاص والسلالة (11) اما عامل المكافحة البكتيريا *Pseudomonas putida* و *Enterobacter cloacae* فقد عزلت من منطقة حول جذور نباتات الطماطة السليمة واختبرت مقدرتها التضاديه وشخصت الى مستوى النوع اعتماداً على تقانة Analytical Profile Index 20 Enterobacteriaceae (API 20E) وهو اختبار بيوكيميائي يستخدم في تعریف عائلة البكتيريا المعاوية و البكتيريا العصوية السالبة لصبغة كرام .

## أكثار اللقاح الفطري لعزلات الفطر *Fusarium oxysporum*

استخدم الوسط الزراعي المكون من بنور الذرة البيضاء (Sorghum bicolor L.) لأكثار الفطر الممرض ، اذ تم تنقية بنور الذرة البيضاء من الشوائب وغسلها مرات عده وبشكل جيد ونقعت لمدة 24 ساعة ، بعدها نشفت من الماء ، وضع مقدار 100 غرام من البنور في دوارق زجاجية سعة 500 مل ، وعقمت بالموصدة (121°C وضغط 1.5 كغم / سم<sup>2</sup> لمدة 60 دقيقة) . لقح الوسط بخمسة أقراص قطر 7 ملم من مزارع عزلات الفطر *Fusarium oxysporum* عمر 7 ايام النامية على الوسط الزراعي PSA. حضنت الدوارق تحت درجة حرارة 25 ± 2 لمنطقة خمسة عشر يوماً مع رج الدوارق كل يومين لضمان التهوية وتوزيع الفطر على جميع البنور (12).

## تحضير اللقاح البكتيري

استعمل الوسط KB (King Broth) السائل لأكثار البكتيريا *Pseudomonas putida* و *Enterobacter cloacae* الذي حضر من 20 غم Peptone ، 2.5 غم K2HPO4 . 3H2O ، 6 غم MgSO4 . 7H2O ، 15 مل Glycerol اضيفت الى لتر ماء مقطر ، عقم الوسط بالمؤصدة في دوارق زجاجية سعة 100 مل ولقح كل دوارق بالبكتيريا بعدها حضنت في درجة حرارة 28 ± 2 لمنطقة 48 ساعة مع التحريك المستمر (13) .

تقويم كفاءة بعض عوامل المكافحة في خفض نسبة وشدة اصابة نباتات الطماطة بعزلة الفطر *K2b* تحت الظروف الحقلية . نفذت التجربة في احد البيوت البلاستيكية (قسم وقاية النبات / كلية الزراعة/ جامعة بغداد) في الموسم الزراعي 2011-2012 / العروة الخريفية بأتياع تصميم القطاعات العشوائية الكاملة، جرى إعداد الأرض بقلب التربة وعزقها وتسويتها جيداً ثم قسمت إلى 3 قطاعات والى مروز بطول 2 متر والمسافة بين مرز وأخر 75 سم . تمت اضافة معاملات التجربة التي اشتملت على المعاملات الآتية :

1. المقارنة بدون اي اضافة .
2. عالق الفطر المرض بمفرده ، بتركيز  $10^6$  بواقع 40 مل / اصيص
3. المبيد البلتاني بمفرده ، بتركيز 0.1 % بواقع 50 مل / اصيص
4. البكتيريا *P. putida* العزلة Nb9 بمفردها ، بتركيز  $3 \times 10^7$  بواقع 40 مل / اصيص
5. العزلة Nb5 بمفردها ، بتركيز  $10^7$  بواقع 40 مل / اصيص
6. المستحضر الحيوي EM1 بمفرده ، بتركيز 3 % بواقع 100 مل / اصيص
7. عامل الاستحاثة SB29 بمفرده . بتركيز 2 % بواقع 100 مل / اصيص
8. المرض + مبيد البلتاني
9. المرض + عزلة البكتيريا Nb9
10. المرض + عزلة البكتيريا Nb5
11. المرض + عامل الاستحاثة فقط
12. المرض + عامل الاستحاثة فقط
13. المرض + البكتيريا Nb5 + Nb9
14. المرض مع البكتيريا Nb5 + Nb9 + عامل EM1
15. المرض + Nb9 + عامل Sb29
16. المرض + Nb9 + عامل Sb29 + EM1 + Nb5 + Nb9

زرعت بادرات الطماطة صنف وجдан بعمر 30 يوم بواقع 10 بادرات/الوحدة التجريبية وبمسافة زراعة 20 سم . تمت اضافة معاملات التجربة على مرحلتين ، المرحلة الاولى قبل نقل البادرات بب يوم واحد وبدون اضافة اللقاح الفطري للمرض وبدون اضافة المبيد الكيميائي ، وتمت اضافة المعاملات حسب التراكيز المذكورة سابقاً . في حين اضيف اللقاح الفطري بعد 7 أيام من زراعة البادرات بعمل شق بعمق 10 سم حول كل نبات المحضر وفق الفقرة 2-3-2 واضيف اللقاح محلاً على بذور الذرة البيضاء وبمعدل 10 غم لكل نبات ، واضيف المبيد في اليوم التالي (14) ما عدا المستحضر الحيوي EM1 ومستخلص عشبة البحر Sb29 فقد تم اضافتها كل 15 يوم على اربع دفعات ، تم ري ارض التجربة حسب حاجة النبات وأجريت عمليات خدمة المحصول من عرق وتعشيب والخف والتسميد .

بينما اضيفت المعاملات في المرحلة الثانية بعد شهر من اضافة اللقاح الفطري ، وبعد 60 يوم من اضافة اللقاح الفطري حسبت نسبة وشدة المرض كما تم قياس طول النبات والوزن الطري والجاف للمجموع الخضري وفي نهاية الموسم تم تقدير حاصل النباتات وارتفاع النباتات والوزن الطري والجاف للمجموع الخضري .

### **النتائج والمناقشة**

تأثير بعض عوامل المكافحة في مرض الذبول الفيوزاري في الطماطة تحت الظروف الحقلية

اظهرت معاملات عوامل المكافحة جميعها خفضاً في نسبة وشدة مرض الذبول الفيوزاري في الطماطة المتسبب عن العزلة Kb2 بعد 60 يوماً من اضافة اللقاح الفطري (جدول 1). اذ تراوحت نسبة وشدة المرض في معاملات عوامل المكافحة من 0.00 - 12.00 % على التتابع قياساً بمعاملة السيطرة (اضافة المرض بمفرده) التي بلغت 83.33 % و 37.50 % على التتابع .

**جدول 1. تأثير بعض عوامل المكافحة في مرض الذبول الفيوزاري في الطماطة تحت الظروف الحقلية**

المعاملات	ن	بعد 60 يوم من اضافة اللقاح الفطري				
		نسبة المرض (%)	شدة المرض (%)	الوزن الجاف / غ	الوزن الرطب / غ	طول النبات / سم
المقارنة (بدون اي اضافة)	1					
لقالع عزلة الفطر المرض K2b بمفردها	2					
المبيد البلتاني بمفرده (Bel)	3					
(Nb5) بمفردها Enterobacter cloacae	4					
(Nb9) بمفردها <i>P. putida</i>	5					
(EM1) بمفرده المستحضر الحيوي	6					
(Sb29) بمفرده عامل الاستحاثة	7					

81	21.50	179.1	2.50	6.66	Bel + K2b	8
89	30.00	204.3	10.25	20.00	Nb5 + K2b	9
92	33.00	205.3	12.00	23.33	Nb9 + K2b	10
88	31.25	204.5	9.33	16.66	EM1 + K2b	11
102	42.00	217.0	8.67	20.00	Sb29 + K2b	12
91	32.50	219.1	4.16	6.66	Nb9 + Nb5 + K2b	13
99	39.50	229.6	2.50	3.33	EM1 + Nb9 + Nb5 + K2b	14
101	40.00	230.8	1.66	3.33	Sb29 + Nb9 + Nb5 + K2b	15
103	41.50	235.5	0.00	0.00	Sb29 + EM1 + Nb9 + Nb5 + K2b	16
0.766	1.823	6.116	4.231	2.147	0.05 عند مستوى L.S.D.	

استطاعت البكتيريا *Enterobacter cloacae* خفض نسبة وشدة المرض معنوياً اذ بلغت نسبها في معاملتها 20.00% على التتابع بوجود الفطر الممرض. كما اظهرت البكتيريا *P. putida* خفضاً معنوياً في نسبة وشدة المرض اذ بلغت نسبهما 10.25% و 12.00% على التتابع قياساً بمعاملة السيطرة التي بلغت فيها 23.33% و 37.50% على التتابع وقد اختلفت معنويات المرض ولم تختلف معنويات في شدة المرض مع معاملة البكتيريا *Enterobacter cloacae*. في حين اظهرت معاملتنا المستحضر الحيوي EM1 و مستخلص عشبة البحر Sb29 خفضاً معنوياً في نسبة وشدة المرض قياساً بمعاملة السيطرة اذ بلغت نسبة المرض فيها 16.66% و 20.00% على التتابع وشدة المرض 9.33% و 8.67% على التتابع.

وتفوقت معاملة التداخل بين عزليتي البكتيريا *E. cloacae* و *P. putida* في مكافحة المرض، اذ ادت الى تقليل نسبة وشدة المرض إلى مستويات منخفضة والتي بلغت 6.66% و 4.16% على التتابع ، في حين اظهرت معاملتنا التوليفية بين ثلاثة عوامل مكافحة الى خفض المرض بشكل كبير، ادت معاملة استعمال عزليتي البكتيريا مع المستحضر الحيوي EM1 ومعاملة عزلتي البكتيريا مع مستخلص عشبة البحر Sb29 الى خفض نسبة المرض الى 3.33% و شدته الى 2.50% و 1.66% على التتابع.


في حين اظهر التكامل بين عوامل المكافحة الاربعة الى مكافحة المرض بشكل تام ، اذ بلغت نسبة وشدة المرض في معاملتها 0.00% و 0.00% قياساً بمعاملة السيطرة التي بلغت فيها 83.33% و 37.50% على التتابع . كما بينت النتائج ان جميع المعاملات المستعملة ، حققت زيادة معنوية في معايير النمو الوزن الرطب والجاف وطول النبات للمجموع الخضري للنباتات بعد 60 يوم من اضافة اللقاح الفطري ، فقد ادت عوامل المكافحة بشكلها المنفرد من دون عزلة الفطر الممرض الى زيادة في معايير النمو فقد تراوحت 188.8 - 249.0 غم و 84 - 101 سم على التتابع وقد اعطت عشبة البحر بمفردها اعلى زيادة في معايير نمو النبات اذ كانت 249.0 و 45.5 غم و 45.5 - 28.0 غم و 249.0 - 188.8 غم و 99 سم على التتابع قياساً بمعاملة الفطر الممرض التي ادت الى خفض معنوي للوزن الرطب والجاف وطول المجموع الخضري اذ بلغت 55.6 و 9.5 و 78 سم على التتابع. وقد تفوقت معاملة استعمال عوامل المكافحة معاً بوجود الفطر الممرض على بقية المعاملات بتحقيقها اعلى زيادة في معدل الوزن الرطب والجاف وطول النبات فقد بلغت عندها 235.5 و 41.5 غم و 103 سم على التتابع تلتها معاملة التوليفية بين عزليتي البكتيريا مع المستخلص Sb29 بزيادة معنوية للوزن الرطب والجاف وطول النبات الذي بلغت فيها 230.8 و 40 غم و 101 سم على التتابع. تلتها معاملة التوليفية بين عزلتي البكتيريا مع المستحضر الحيوي EM1 التي بلغت عندها 229.5 و 39.5 غم و 99 سم تلتها بقية المعاملات الاخرى .

كما بينت النتائج(جدول2) ان جميع المعاملات احدثت رفعاً معنوياً بحاصل النبات الواحد قياساً بمعاملة المقارنة(اضافة المرض بمفرده) تراوح معدل حاصل النبات الواحد في جميع معاملات عوامل المكافحة منفردة او منكاملة مع الفطر الممرض 4.14 كغم/ نبات في حين كان معدل وزن الحاصل في معاملة المقارنة 0.983 كغم/ نباتات وبنقوص معنوي لمعاملة التكامل بين عزليتي البكتيريا والمستحضر EM1 والمستخلص Sb29 إذ كان وزن الحاصل فيها 6.52 كغم/ نباتات ، تلتها معاملة التوليفية بين عزلتي البكتيريا مع المستخلص Sb29 بزيادة معنوية بوزن الحاصل التي بلغت 6.46 كغم/ نباتات ، تلتها معاملة البكتيريا Nb9 بمفردها مع الفطر الممرض اذ بلغت 5.82 كغم/ نباتات ومن دون فرق معنوي مع معاملة التوافق بين عزلتي البكتيريا والمستحضر الحيوي EM1 التي بلغت 80.5 كغم / نباتات تلتها باقي المعاملات . وتم حساب النسبة المئوية للزيادة بالحاصل قياساً بمعاملة المقارنة (الفطر المرض بمفرده) التي تراوحت بين 321.16- 563.28%. (شكل 1)

كما بينت النتائج ان جميع المعاملات المستعملة لمكافحة مرض الذبول الفيوزاري في الطماطة حققت زيادة معنوية في معايير النمو، في نهاية الموسم،ممثلة في الوزن الرطب والجاف وطول النبات للمجموع الخضري للنباتات المعاملة، قياساً بمعاملة الفطر الممرض بمفرده التي ادت الى خفض معنوي للوزن الرطب والجاف وطول المجموع الخضري التي بلغت 218.5 غم و 78 غم و 192 سم على التتابع. وقد تفوقت معاملة عزلتي البكتيريا مع المستحضر الحيوي EM1 ومستخلص عشبة البحر Sb29 مع المرض على بقية المعاملات بتحقيقها اعلى زيادة في معدل الوزن الرطب وطول النبات بلغت عندها 364 غم و 364 سم على التتابع ، في حين حققت معاملة المستخلص Sb29 مع الفطر الممرض اعلى وزن جاف وطول النبات اذ بلغت في معاملتها 942.3 غم و 362 سم على التتابع. وقد اعطت معاملة المبيد الكيميائي بلثانول اقل معايير نمو فقد كان معدلاتها في معاملتهما 716.5 غم و 286 سم على التتابع . في حين اظهر اختبار الكشف عن تواجد الفطر الممرض في ثمار الطماطة عن وصول الفطر وتواجده في الثمار خاصةً في الاقرع السفلية

جدول 2. تأثير بعض عوامل المكافحة في كمية الحاصل والوزن الطري والجاف وارتفاع نباتات الطماطة تحت الظروف الحقلية في نهاية الموسم

طول النبات / سم	في نهاية الموسم			المعاملات	ت
	الوزن الجاف / غم	الوزن الطري / غم	معدل حاصل النبات الواحد (كغم)		
320	203	812.3	6.46	المقارنة ( بدون اي اضافة )	1
192	78	218.5	0.983	لماح عزلة الفطر الممرض K2b بمفردها	2
297	172	763.3	4.86	المبيذ البليتانول بمفرده (Bel)	3
323	212	972.4	6.22	(Nb5) بمفردها <i>Enterobacter cloacae</i>	4
346	225	931.5	6.48	(Nb9) بمفردها <i>P. putida</i>	5
356	234	937.6	6.88	المستحضر الحيوي EM1 بمفرده (EM1)	6
364	262	996.2	6.18	عامل الاستثناث Sb29 بمفرده (Sb29)	7
286	166	716.6	4.14	Bel + K2b	8
317	200	817.2	4.92	Nb5 + K2b	9
323	212	821.3	5.82	Nb9 + K2b	10
315	205	818.2	5.00	EM1 + K2b	11
362	248	868.2	4.86	Sb29 + K2b	12
324	210	876.6	5.22	Nb9 + Nb5 + K2b	13
357	238	918.5	5.80	EM1 + Nb9 + Nb5 + K2b	14
360	240	923.3	6.46	Sb29 + Nb9 + Nb5 + K2b	15
364	246	942.3	6.52	Sb29 + EM1 + Nb9 + Nb5 + K2b	16
34.06	36.68	22.56	0.867	L.S.D. (0.05)	



شكل 1. يوضح الزيادة المئوية للحاصل بتأثير عوامل المكافحة قياساً بمعاملة المقارنة (الفطر الممرض بمفرده)

وقد يعزى دور البكتيريا الجذرية *Enterobacter cloacae*, *P. putida* في مكافحة مسبب مرض الذبول الفيوزارمي في الطماطة FOL لامتلاكها القدرة على تحفيز المقاومة الجهازية ضد مسبب مرض الذبول الفيوزارمي عن طريق زيادة تركيز المركبات الفينولية مما يؤدي إلى تحفيز الدفاعات النباتية على المستوى الخلوي والجزئي مما دفع إلى زيادة في نمو النبات . فقد أظهرت البكتيريا الجذرية *Pseudomonas putida* قدرتها على تحفيز المقاومة الجهازية ضد مسبب مرض الذبول الفيوزارمي في الطماطة FOL عن طريق زيادة تركيز المركبات الناقلة للإشارة وهي Ethylene و Jasmonic acid مما ادى إلى تحفيز الدفاعات النباتية على المستوى الخلوي والجزئي مما دفع إلى زيادة في نمو النبات ( 15 ) ، وبينت دراسات أخرى تأثير البكتيريا *P. putida* في تثبيط عدد من الممرضات الفطرية والبكتيرية في نباتات العائلة البانجانية و اظهرت كفاءة عالية في حماية نباتات الطماطة من مسبب الذبول الفيوزارمي وتثبيط نمو وتجرث الفطر ( 16 ) .

وقد اشارت دراسات عديه على ان عزلات البكتيريا الجذرية *Enterobacter cloacae* ، *P. putida* تمتلك فعالية عالية في مكافحة مسبب مرض الذبول الفيوزارمي في الطماطة FOL وزيادة في حيوية ونشاط النبات . ( 17 )، اذ تمتلك البكتيريا الجذرية *Enterobacter cloacae* كفاءة تضادية عالية مع كثير من المسببات المرضية ، وتنزيد من قابلة التربة على كبح الممرضات ولا سيما الفطر *Fusarium oxysporum* ( 18 ). وقد تعود كفاءة مستخلص عشبة البحر *Ascophyllum nodosum* في مكافحة مسببات الامراض في تعزيز دور الانزيمات والبروتينات ذات العلاقة بالأمراضية ، وتضمنت

phenylalanine ammonia lyase و polyphenol oxidase و  $\beta$ -1,3-glucanase و chitinase و  $\beta$ -1,3-glucanase و peroxidase و lipoxygenase و phenylalanine ammonia lyase عن طريق تنشيط الجينات المسؤولة عن انتاج هذه البروتينات (10) . وان حدوث المقاومة المستحثة الجهازية تحمي النباتات من الاصابة بالمسببات المرضية ، ومنها الارتفاع الكبير في تخلق الفينولات في النباتات . ( 19 ) بينما تعزى كفاءة المستحضر الحيوي EM1 في مكافحة الامراض النباتية الى دور الكائنات الدقيقة التي يحتويها هذا المستحضر والمواد او المركبات التي تنتجهما التي تعمل على تثبيط نمو المسببات المرضية . ويعود ذلك الى تأثير البكتيريا *Lactobacillus Reuteri* إذ تنتج هذه البكتيريا مواد مثبطة لنمو الفطريات والبكتيريا مثل Lactic acid و *Fusarium spp.* كما لها القدرة على اخترال السموم التي ينتجها فطر ( 20 )

ان نتائج تطبيق المستحضر هو زيادة في احياء التربة المعززة لنمو النبات ونتائج الاكثر اهمية هو التحول السريع للمركيبات المعدنية الى المواد العضوية . واحمد نشاط احياء التربة الممرضة وزيادة انتاج المحاصيل وتحسين نوعياتها . و اشارت

دراسات اخرى الى ان هذا المستحضر قد ادى الى استصلاح التربة ونوعية الحاصلات فضلاً عن الانتاجية العالية ( 21 )

اذ يعزى حدوث المقاومة المستحثة بسبب إنتاج البروتينات ذات علاقة بالأمراضية Pathogenesis Related Proteins (PRP) مثل  $\beta$ -1,3-Glucanase ، Chitinase (PRP) ، Peroxidase (PO) ، Phenylalanine ammonia Lyase (PAL) ، Polyphenol oxidase (PPO) ، وبعد انزيم الليبروكسيdez ( 22 ) ، ويزداد انتشار المقاومة ضد المسببات المرضية من خلال اهميته في تصنیع الاتلين الذي يحفز تصنیع الفایتوالکسینات ، وتصنیع العوارض المیکانیکیة ضد دخول المسببات المرضیة الى النبات ( 23 )

## المصادر

- 1- Giovanni, C.D., P.D. Orco, A. Bruno, F. Ciccarese, C. Lotti, L. Ricciardi, 2004. Identification of PCR-based markers (RAPD, AFLP) linked to a novel powdery mildew resistance gene (ol-2) in tomato. Plant Sci. 166: 41-48 .
- 2- Christopher, D.J., T.S. Raj, S.U. Rani and R. Udhayakumar, 2010. Role of defense enzymes activity in tomato as induced by *Trichoderma virens* against *Fusarium* wilt caused by *Fusarium oxysporum f sp. lycopersici*. Journal of Biopesticides 3(1 Special Issue) 158 – 162.
- 3- Barone, A. and L. Frusciante 2007. Molecular marker-assisted selection for resistance to pathogens in tomato, Marker-Assisted Selection, Current status and future perspectives in crops, livestock, forestry and fish. pp. 153-164
- 4- Girhepuje, P.V. and G.B. Shinde, 2011. Transgenic tomato plants expressing a wheat endochitinase gene demonstrate enhanced resistance to *Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici*. Plant Cell Tiss Organ Cult . 105:243–251.
- 5- Jetiyanon K., J.W. Kloepffer, 2002. Mixtures of plant growth promoting rhizobacteria for induction of systemic resistance against multiple plant diseases. Biocontrol 4:285–291.
- 6- Brimner, T.A. and G.J. Boland, 2003. A review of the non-target effect of fungi used to biologically control plant diseases. Agriculture, Ecosystem and environment 100: 3-16.
- 7- Berger, S., S.M. Papadopoulo, U. Schreiber, W. Kaiser and T. Roitsch, 2004. Complex regulation of gene expression, photosynthesis and sugar levels by pathogen infection in tomato. Physiologia Plantarum, 122: 419–428.

- 8- Higa, T., 2000. What is EM technology ?. EM world Journal 1 : 1 – 6.
- 9- Elastal, Z.Y., A. Ashour and A.A.M. Kerrit, 2005. Antimicroboial activity of some medicanal plant extract in plestine.pak.J.med-Sci 21(2):187-193.
- 10- Jayaraman, J., J. Norrie and Z. K. Punja, 2010. Commercial extract from the brown seaweed *Ascophyllum nodosum* reduces fungal diseases in greenhouse cucumber . 23 :( 3) 353-361
- 11- الحميري ، ياسر ناصر. 2013 . بعض أوجه التكامل في مكافحة مرض الذبول الفيوزاري في الطماطة المتسبب عن الفطر *Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici* . اطروحة دكتوراه . كلية الزراعة – جامعة بغداد.
- 12- Srivastava R., A. Khalid, U.S. Singh, A.K. Sharma, 2010. Evaluation of arbuscular mycorrhizal fungus, fluorescent Pseudomonas and Trichoderma harzianum formulation against *Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici* for the management of tomato wilt. Biological Control 53 24–31.
- 13- Shanmugam V., N. Kanoujia, 2011. Biological management of vascular wilt of tomato caused by *Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici* by plant growth-promoting rhizobacterial mixture . Biological Control ( 57) 85–93.
- 14- Ncube, L., N.S. Pearson and M.O. Brutsch, 2011. Agronomic suitability of effective micro-organisms for tomato production. African Journal of Agricultural Research Vol. 6(3): 650-654.
- 15- Ahn, P., S. Lee, and S. Suh, 2007. Rhizobacteria-Induced Priming in *Arabidopsis* Is Dependent on Ethylene, Jasmonic Acid, and NPR1. MPMI . 20( 7): 759–768.
- 16- Lee, S.W., I.P. Ahn, J.W. Lim and Y.H. Lee, 2005. *Pseudomonas putida* strain 17 isolated from replant soil promotes plant growth and inhibits conidial germination of soilborne plant pathogens. Plant Pathol. J. 21:244-251.
- 17- Akkopru, A. and S. Demir, 2005. Biological control of *Fusarium* wilt in tomato caused by *Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici* by AMF *Glomus intraradices* and some rhizobacteria. Journal of Phytopathology (9):544-550.
- 18- Van Dijk, K., and E.B. Nelson, 2000. Fatty acid competition as a mechanism by which *Enterobacter cloacae* suppresses *Pythium ultimum* sporangium germination and damping-off. Appl. Environ. Microbiol. 66:5340–5347.
- 19- De-Ascensao, A.F. and I.A. Dubrey, 2003. Soluble and wall-bound phenolic polymers in *Musa acuminate* roots exposed to elicitors from *Fusarium oxysporum f.sp. cubensis*. Phytochemistry, 63: 679-686.
- 20- Sakakibara, K., 2002. Antibacterial effect of EM. First International EM Technology Conference, Okinawo, Japan, 1 p
- 21- Li, W. and Y. Ni, 1995. Research and application of EM (effective microorganisms). Chin. J. Ecol. 14: 58 - 62.
- 22- Kloepper, J., W.S. Tuzun and J.A. Kuc, 1992. Proposed definitions related to induced disease resistance. Biocontrol Sci. Technol. 2: 349-351.
- 23- Selvaraj, T. and P. Chellappan. 2006. Arbuscular mycorrhizae a diverse personality. J. of central European Agric. 7: 349-358.