

Genotype differences of bread wheat (*Triticum aestivum L.*) in some growth and yield indicators under salinity stress

الاختلاف الوراثي لأصناف الحنطة الناعمة (*Triticum aestivum L.*) في بعض مؤشرات النمو والحاصل تحت جهد الملوحة.

عباس علي العامري
جامعة كربلاء / كلية الزراعة

المستخلص

اجريت تجربة في الحقل (في منطقة بغداد / ابو غريب في تربة كلسية مصنفة ضمن مجموعة الترب العظمى (Typic Torrifluvent) بهدف دراسة تأثير جهد الملوحة (ماء النهر 3 و 6 دسي سمنز) في الاختلاف الوراثي لخمس اصناف من الحنطة الناعمة وهي (الفتح و تحدي و العراق و سالي و عدنانية)، وبموسمين 2011-2012 و 2012-2013. صممت التجربة وفق تصميم الالواح المنشقة اذ مثلت معاملات الملوحة الالواح الرئيسية والأصناف مثلت الالواح الثانوية، قورنت المتوسطات حسب اختبار LSD.

اظهرت النتائج ان زيادة مستويات جهد الملوحة ادى الى خفض جميع المؤشرات المدروسة في صفات ارتفاع النبات و عدد الاشطاء/ m^2 ومساحة ورقه العلم والوزن الجاف لورقة العلم وطول السنبلة وعدد سنبيلات/السنبلة وعدد الحبوب بالسنبلة وزن 1000 حبة وحاصل الحبوب وكلها الموسمين وفي جميع الاصناف قيد الدراسة ، فيما اعطى الصنف العراق من بين الاصناف الناعمة المدروسة اعلى القيم لجميع المؤشرات المدروسة وفي كلتا الموسمين وعند نموه تحت الاجهاد الملحية قياسا بالاصناف الاخرى.

Abstract

An experiment was conducted in the field (in the Baghdad / Abu Ghraib in the calcareous soil classified within the range of soils Great Typic Torrifluvent) in order to study the effect of salinity Stress (water of the Irrigation , 3 and 6 ds/ m) on five varieties of Bread wheat (Al-Fateh,AL-Tahadi,AL-Iraq, Sally and Adnanah) during 2011-2012 and 2012-2013 . experiment setup using split plot design ,salinity stress as main plot and varieties as subplot. Means were compared using LSD at P0.05.

The results showed that increased levels of salinity stress led to a reduction in all the indicators studied (plant height , number of tillers/ m^2 , flag leaf area, dry weight of a flag leaf, spike length , number spikelet's / spike, number of grains spike , 1000-grains weight and grains yield in both seasons, and in all varieties under study . Iraq given highest values for all indicators studied in both seasons , when it is grown under salt stress compared to other varieties .

المقدمة

الحنطة (*Triticum aestivum L.*) من اهم محاصيل الحبوب باعتبارها المادة الاساسية في غذاء الانسان والمصدر الرئيس للطاقة التي يحتاجها⁽¹⁾ . يعتبر الاجهاد الملحية من اهم التحديات المحددة لنمو وتطور وإنتاج المحاصيل في معظم دول العالم لا سيما في المناطق المروية⁽²⁾ . وبعد العراق من الدول التي تعاني من شحنة مياه الري الصالحة للزراعة بالإضافة الى تفاقم مشكلة الملوحة بسبب سوء نظام الري والصرف فضلا عن ما تعانيه الموارد المائية من نقص في الكميات وارتفاع تراكيز الاملاح فيها. فقد اوضحت العديد من الدراسات التأثير السلبي للملوحة في مكونات الحاصل للحنطة والتي اوضحت ان تعرض النبات الى جهد ازموزي غير ملائم خلال مرحلة النمو الخضرى ادى الى اعاقة او توقف انتقام الخلايا واستطالتها مما ادى الى آخرزال طول السنبلة وتقليل عدد السنبيلات في السنبلة وبالتالي قلة وزن الحبوب ، كما اكدت تلك الدراسات حصول انخفاض معنوي في بعض مكونات حاصل الحنطة ومنها عدد الحبوب في السنبلة وزن 1000 حبة الى تراكيز ملحية متزايدة (3و4و5%).

ولغرض استزراع الترب المتأثرة بالأملاح بالمحاصيل الاقتصادية لا بد من تقليل الاثر الضار للأملاح في التربة والنبات والتخلص من الأملاح الزائدة في منطقة الجذور واستصلاح الترب الملحية ولذلك اجري عدد من التطبيقات منها قسطرة التربة ، الغسل ، واستخدام المصلحات الكيميائية ذات الفعل الحامضي في التربة كالجبس والكبريت المعdeni وحامض الكبريتيك كمصدر غير مباشر للكالسيوم في محلول التربة (6و7) ، الا ان هذه التطبيقات في ظل تزايد شحنة المياه في السنوات الاخيرة اصبح تطبيقها مكلفا من الناحية الاقتصادية مما دفع الباحثين الى تبني اليات وتطبيقات ملائمة لظروف الاجهاد الملحية ومنها التعايش مع الملوحة من خلال استبطاط اصناف كفؤة للإجهادات المختلفة،اذ تمتاز اصناف الحنطة عالية الإنتاجية بكفاءتها في مقاومة

الاجهادات الحيوية وغير الحيوية وان انتخاب مثل هذه الأصناف الكفوفة يعتمد على متغيرات عديدة بغية إنتاج اكبر غلة ممكنة من حاصل الحبوب خاصة عند توفر تلك الاجهادات في وسط نمو النبات (8 و 9 و 10).

وبالنظر للدور المهم الذي يؤديه اختيار الصنف الكفوفة في إعطاء أعلى إنتاجية تحت الاجهاد الملحي ولقلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع فقد تم تصميم الدراسة الحالية والتي تهدف الى تحديد الصنف الكفوفة من بين الأصناف في النمو وإعطاء أعلى انتاج تحت الاجهاد الملحي.

المواد وطرائق العمل

نفذت تجربة حقلية في تربة كلسية مصنفة ضمن مجموعة الترب العظمى Typic Torrifluvent بهدف دراسة تأثير جهدي الملوحة باستخدام ثلاث مستويات من ملوحة ماء الري هي (ماء نهر ، ماء ملوحة 3 ، ماء ملوحة 6 ديسى سيمنز.م⁻¹). زرعت خمسة أصناف من الحنطة هي الفتح ، تحدي ، العراق و سالي ، عدنانية . في احد الحقول الزراعية في ابو غريب - لموسمى النمو 2011-2012 و 2012-2013 وقد تم تقدير بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لها حسب الطرق الموصوفة في (11) كما يوضح جدول (1). تضمنت الدراسة 15 معاملة باستخدام 5 أصناف من الحنطة الناعمة وهي (الفتح ، تحدي ، العراق ، سالي ، عدنانية)، وثلاث مستويات من ملوحة ماء الري هي (ماء نهر وماء ملوحة 3 وماء ملوحة 6 ديسى سيمنز.م⁻¹).

جدول (1) بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية للتربة المستخدمة في الدراسة.

وحدة القياس	القيمة	الصفة	
-	7.6	درجة التفاعل H pH 1:1	
ديسى سيمنز.م ⁻¹	1.9	التوصيل الكهربائي EC 1:1	
سنتيمول شحنة.كغم ⁻¹	19.4	السعة التبادلية الكتنيونية CEC	
غم.كغم ⁻¹	9.1	المادة العضوية	
سنتيمول شحنة.كغم ⁻¹	14.5	الإيونات الموجبة	Ca ⁺²
سنتيمول شحنة.كغم ⁻¹	9.8	Mg ⁺²	
سنتيمول شحنة.كغم ⁻¹	8.5	Na ⁺	
سنتيمول شحنة.كغم ⁻¹	0.19	K ⁺	
سنتيمول شحنة.كغم ⁻¹	3.6	الإيونات السالبة	HCO ₃ ⁻
سنتيمول شحنة.كغم ⁻¹	12.9	SO ₄ ⁻²	
-	Nil	CO ₃ ⁼	
سنتيمول شحنة.كغم ⁻¹	17.6	Cl ⁻	
ملغم.كغم ⁻¹	34.1	النتروجين الجاهز	
ملغم.كغم ⁻¹	13.5	الفسفور الجاهز	
ملغم.كغم ⁻¹	168.4	البوتاسيوم الجاهز	
غم.كغم ⁻¹	102	مكونات التربة	الرمل
غم.كغم ⁻¹	649	الغرين	
غم.كغم ⁻¹	249	الطين	
-	مزجية غيرنية	صنف النسجة	

استعمل تصميم الألواح المنشقة ، حيث مثلت معاملات السقى بالماء المالح الألواح الرئيسية فيما مثلت الأصناف الألواح الثانوية. زرعت بنور الحنطة للأصناف جميعها للموسن الشتوي بتاريخ 21/11/2011 و 21/11/2012 للموسفين على التوالي سرياً في خطوط المسافة بين خط وآخر 20 سم وبواقع عشرة خطوط وبكمية بذار (120 كغم.ه⁻¹)، سقيت التجربة بعد الزراعة مباشرة واستمر الري حسب الحاجة خلال موسم الزراعة . تم إجراء عمليات التعشيب اليدوي كلما دعت الحاجة لذلك . أضيف سmad السوبر فوسفات الثلاثي (P 20%) بمعدل 100 كغم.P.ه⁻¹ دفعه واحدة قبل الزراعة (12) ، أما السماد النتروجيني فقد استخدم سmad البويريا (N 46%) وبمعدل 200 كغم.N.ه⁻¹ وأضيف على دفعتين الأولى بعد الإنبات بأسبوعين والثانية بعد شهر من الدفعه الأولى (مرحلة التفرعات) والسماد البويراسي أضيف بمعدل 100 كغم.K.ه⁻¹ من سmad كبريتات البوتاسيوم (K 41.5%) وتمت إضافته مع إضافات السماد النتروجيني اخذت القياسات التالية في نهاية التجربة :

- ارتفاع النبات (سم) (Plant Height (cm)): وحسبت عند مرحلة 100% تزهير وذلك بقياس ارتفاعات عشرة نباتات اختيرت عشوائياً المسافة بين سطح التربة وبداية السنبلة للشطا الرئيس.

- طول السنبلة (سم) (Spike Length (cm)): حسبت عشرة سنابل اختيرت عشوائياً عند مرحلة النضج الفسيولوجي من قاعدة السنبلة إلى نهاية السنبلة الطرفية (عدا السفا).

- عدد السنابل .م⁻²: Number of spikes.M⁻²: حسبت النباتات الموجودة في كل وحدة تجريبية وحولت إلى 1 م².

- عدد الحبوب . سنبلة⁻¹: Number of Grains. spike⁻¹: وهي تمثل عدد الحبوب لعشرة سنابل اختيرت عشوائياً .

- وزن 1000 حبة (غم) (gm): Weight of 1000 Grain (gm): وحسبت من حاصل حبوب كل وحدة تجريبية وذلك بحساب 1000 حبة اختيرت عشوائياً .

مجلة جامعة كربلاء العلمية – المجلد الثاني عشر - العدد الثاني / علمي / 2014

- حاصل الحبوب (طن.هـ⁻¹) (Grain yield (Mgm.ha⁻¹): تم دراس سنابل كل وحدة تجريبية يدوياً وعزل الحبوب عن القش وزن وحولت من غم.م² إلى طن.هـ⁻¹

النتائج والمناقشة ارتفاع النبات(سم)

يلاحظ من بيانات جدول(2) اختلاف استجابة اصناف الحنطة للنمو تحت جهد الملوحة اذ تفوق الصنف العرق معنويا في ارتفاع النبات بلغ 92.1 و 93.6 سم لكلا الموسمين بالتتابع مقارنة مع الاصناف الأخرى ، فيما اعطى الصنف عدنانية اقل معدل لهذه الصفة بلغ 83.2 و 83.3 سم لكلا الموسمين بالتتابع والذي لم يختلف معنويا عن الصنف التحدي والذي اعطى 84.2 و 83.6 سم لكلا الموسمين بالتتابع .

جدول(2)تأثير الاختلاف الوراثي لأصناف حنطة الخبز تحت جهد الملوحة في ارتفاع النبات(سم) .

المعدل	الموسم 2013-2012			الموسم 2012-2011			الملوحة الاصناف	
	6	3	ماء نهر	المعدل	6	3	ماء النهر	
85.3	76.3	85.4	94.3	86.2	74.1	86.2	98.4	الفتح
93.6	83.2	93.2	104.5	92.1	82.1	91.1	103.3	العرق
83.6	74.3	83.4	93.1	84.2	75.1	80.4	97.1	تحدي
83.3	74.1	82.5	93.5	83.2	72.1	83.4	94.1	عدنانية
88.1	76.3	80.4	107.8	87.5	71.1	87.4	104.1	سالي
86.7	76.8	84.9	98.6	86.6	74.9	85.7	99.4	المعدل

الموسم 2013-2012		الموسم 2012-2011		LSD0.05
الاصناف	الملوحة	الاصناف	الملوحة	
3.765	3.987	3.456	4.876	
4.878	4.878	5.087	5.087	

اما تأثير الملوحة فقد ادى زيادتها الى انخفاض معنوي في ارتفاع جميع الاصناف المستخدمة في الدراسة وقد اعطى الري بماء النهر اعلى ارتفاع للنباتات بلغ 99.4 و 98.6 ولكلة الموسمين بالتتابع فيما اعطى الري بماء ملوحته 6 ديسى سيميز.م⁻¹ اقل ارتفاع للنبات بلغ 74.9 و 76.8 سم ولكلة الموسمين بالتتابع .كما بينت نتائج الجدول نفسه وجود تداخل معنوي بين الاصناف وزيادة الملوحة كاستجابة لهذه الاصناف للنمو تحت جهد الملوحة اذ يلاحظ انخفاض معنوي لجميع الاصناف عند زيادة قيمة EC وقد تفوق الصنف العرق باعطاءه اعلى ارتفاع للنبات عند التعرض لجهد الملوحة وقد سجل (91.1 و 93.2 سم) عند نموه تحت جهد ملوحة 3 ديسى سيميز.م⁻¹ فيما اعطى (82.1 و 83.2 سم) عند نموه تحت جهد ملوحة 6 ديسى سيميز.م⁻¹ متقدما بذلك معنويا على جميع الاصناف الأخرى .فيما كان الصنف عدنانية اكثراً الاصناف تأثيراً عند التعرض لجهد الملوحة .

عدد الاشتاء/م²

تبين نتائج الجدول (3) الى انخفاض معنوي في عدد الاشتاء / م² عند تعرض الاصناف لجهد الملوحة .لقد سجل الصنف العرق اعلى معدل لعدد الاشتاء / م² بلغ 373.8 و 367.8 لكلا الموسمين على التوالي مقارنة بالاصناف الأخرى يليه الصنف تحدي والذي اعطى اعلى قيمة لهذه الصفة بلغ 352.0 في الموسم الاول فيما اعطى الصنف فتح

جدول(3)تأثير الاختلاف الوراثي لأصناف حنطة الخبز تحت جهد الملوحة في عدد الاشتاء/م².

المعدل	الموسم 2013-2012			الموسم 2012-2011			الملوحة الاصناف	
	6	3	ماء نهر	المعدل	6	3	ماء النهر	
356.6	346.1	354.7	369.0	352.5	342.3	352.3	363.0	الفتح
367.8	354.3	369.0	380.3	373.8	364.7	372.0	384.7	العرق
351.8	342.3	353.0	360.3	359.4	352.0	358.0	368.3	تحدي
346.1	331.0	343.3	364.0	339.1	325.0	335.3	357.0	عدنانية
334.4	323.7	334.3	345.3	329.7	319.7	331.2	338.3	سالي
351.3	339.4	350.8	363.7	350.9	340.7	349.7	362.2	المعدل

الموسم 2013-2012		الموسم 2012-2011		LSD0.05
الاصناف	الاصناف	الاصناف	الاصناف	
5.725	الملوحة	6.356	الملوحة	
6.977	X الاصنافX الملوحة	7.674	X الاصنافX الملوحة	
9.808		9.047		

اعلى قيمة في الموسم الثاني بلغ 356.6 والذى لم يختلف معنويًا عن الصنف تحدي ،فيما اعطى الصنف سالي اقل قيمة لهذه الصفة بلغت 334.4 و 319.7 لكلا الموسمين على التوالى .كما سبب زيادة جهد الملوحة من 0.6 ديسى سيميز م¹ الى انخفاض معنوي في هذه الصفة وكان الانخفاض على اشدء عند تعرض الاصناف لجهد الملوحة (6) ديسى سيميز م¹ بلغ 340.7 و 339.4 لكلا الموسمين على التوالى .تشير نتائج التحليل الاحصائى وبصورة عامة ان نمو الاصناف تحت جهد الملوحة ادى الى انخفاض معنوي في هذه الصفة عن معاملة ماء النهر والتي سجل فيها صنف العراق اعلى قيمة لهذه الصفة بلغ 364.7 و 354.3 لكلا الموسمين على التوالى عند نمو الصنف تحت اعلى جهد الملوحة (6 ديسى سيميز م¹) .فيما كان الصنف سالي اكثر الاصناف تأثيراً بجهد الملوحة وسجل 323.7 و 319.7 لكلا الموسمين بالتتابع عند اعلى جهد الملوحة.

مساحة ورقة العلم(سم²)

يتضح من نتائج جدول (4) الى تباين اصناف حنطة الخبز عند تعرضها لجهد الملوحة وقد تفوق الصنف العراق معنويًا في اعطاءه اعلى مساحة لورقة العلم بلغت (54.707سم²) لكلا الموسمين على التوالى متقدماً بذلك معنويًا على جميع الاصناف الاخرى وبنسبة زيادة بلغت (44.513) و (47.977) و (44.513) و (55.257) و (54.707) و (55.257) و (49.743) و (50.684) و (54.707) و (50.546) و (49.520) و (47.977) و (50.687) لكلا من اصناف (الفتح وتحدي وعدنانية وسالي) ولكلما الموسمين على التوالى . فيما اعطى الصنف سالي اقل قيمة لمساحة ورقة العلم بلغت (47.977) لكلا الموسمين على التوالى .اما تأثير الملوحة فقد ادى زيادة جهد الملوحة الى انخفاض في هذه الصفة وقد اعطى الري بماء النهر اعلى مساحة ورقة العلم بلغت (51.449) لكلا الموسمين على التوالى متقدماً بذلك معنويًا على جهد الملوحة (6 ديسى سيميز م¹) والذي سجل اقل قيمة بلغت (48.831) لكلا الموسمين على التوالى . وكذلك معنويًا على المستوى (3 ديسى سيميز م¹) في الموسم الثاني والذي سجل (50.617) سم² فيما لم يرتفع الى مستوى المعنوية في الموسم الاول . يتبعين من نتائج التحليل الاحصائى للجدول نفسه ان نمو الاصناف تحت جهد الملوحة سبب انخفاضاً معنويًا في هذه الصفة وقد اعطى نمو صنف العراق تحت جهد الملوحة (6 ديسى سيميز م¹) اعلى قيمة لهذه الصفة فيما كانت الصنف سالي وعند جهدي الملوحة (6 ديسى سيميز م¹) اكثر تأثراً فسجل اقل القيم ولكلما الموسمين على التوالى .

جدول(4) تأثير الاختلاف الوراثي لأصناف حنطة الخبز تحت جهد الملوحة في مساحة ورقة العلم(سم²).²

الموسم 2013-2012				الموسم 2012-2011				الملوحة الاصناف
المعدل	6	3	ماء نهر	المعدل	6	3	ماء النهر	
50.684	49.743	50.768	51.543	52.425	51.684	52.568	53.025	الفتح
54.707	52.654	54.698	56.769	55.257	54.230	55.681	55.860	العراق
50.546	49.009	50.765	51.865	50.377	49.029	50.345	51.758	تحدي
49.520	48.908	49.089	50.565	48.790	47.789	48.869	49.713	عدنانية
47.977	43.843	47.765	52.323	44.513	41.783	44.868	46.889	سالي
50.687	48.831	50.617	52.613	50.272	48.903	50.466	51.449	المعدل

الموسم 2013-2012		الموسم 2012-2011		LSD0.05
الاصناف	الاصناف	الاصناف	الاصناف	
1.332	الملوحة	2.126	الملوحة	
1.137	X الاصنافX الملوحة	1.034	X الاصنافX الملوحة	
3.321		3.147		

الوزن الجاف لورقة العلم(غم)

تبين نتائج جدول (5) الى انخفاض معنوي في الوزن الجاف لورقة العلم (غم) عند تعرض الاصناف لجهد الملوحة .فقد سجل الصنف العراق اعلى معدل وزن ورقة العلم بلغ 0.2524 غم لكلا الموسمين على التوالى مقارنة بالاصناف الاخرى يليه الصنف فتح والذي اعطى 0.2388 غم لكلا الموسمين على التوالى .فيما اعطى الصنف سالي اقل معدل لهذه الصفة بلغ 0.2121 غم لكلا الموسمين على التوالى .كما سبب زيادة جهد الملوحة (6 ديسى سيميز م¹) الى انخفاض معنوي في هذه الصفة وكان الانخفاض على اشدء عند تعرض الاصناف لجهد الملوحة (6 ديسى سيميز م¹) وبلغ 0.2299 غم .تشير نتائج التحليل الاحصائى وبصورة عامة الى ان نمو الاصناف تحت جهد الملوحة ادى الى انخفاض معنوي في هذه الصفة عن معاملة ماء النهر وقد حافظ صنف العراق في اعطاء اعلى قيمة بلغت 0.2379 غم ولكلما الموسمين على التوالى وعند

مجلة جامعة كربلاء العلمية – المجلد الثاني عشر - العدد الثاني / علمي / 2014

نمو صنف العراق تحت اعلى جهد الملوحة (6ديسي سيميز.م⁻¹). فيما كان الصنف سالي اكثرا الصناف تأثرا بجهد الملوحة وسجل 0.1890 و 0.208 غم لكلا الموسمين على التوالي وعند اعلى جهد للملوحة لكلا الموسمين على التوالي.

جدول(5) تأثير الاختلاف الوراثي لأصناف حنطة الخبز تحت جهد الملوحة في الوزن الجاف لورقة العلم(غم).

المعدل	الموسم 2013-2012			الموسم 2012-2011			الملوحة الاصناف	
	6	3	ماء نهر	المعدل	6	3	ماء النهر	
0.2388	0.2221	0.2411	0.2532	0.2382	0.2239	0.2413	0.2495	الفتح
0.2472	0.2332	0.2487	0.2598	0.2524	0.2379	0.2536	0.2659	العراق
0.2307	0.2132	0.2366	0.2423	0.2251	0.2119	0.2286	0.2348	تحدي
0.2207	0.2067	0.2244	0.2312	0.2128	0.2090	0.2122	0.2173	عدنانية
0.2121	0.2008	0.2123	0.2234	0.1978	0.1890	0.2012	0.2033	سالي
0.2299	0.2152	0.2326	0.2419	0.2252	0.2143	0.2273	0.2341	المعدل

الموسم 2013-2012		الموسم 2012-2011		LSD0.05
الاصناف	الملوحة	الاصناف	الملوحة	
Xالاصناف	Xالملوحة	Xالاصناف	Xالملوحة	
0.01132	0.00137	0.01026	0.00214	0.12227
0.11421				

طول السنبلة(سم)

يتضح من نتائج جدول (4) الى تباين اصناف حنطة الخبز عند تعرضها لجهد الملوحة وقد تفوق الصنف العرق معنويا في اعطاءه اعلى طول للسنبلة بلغت (11.88 سم) لكلا الموسمين على التوالي متوفقا بذلك على جميع الاصناف الاخرى وبنسبة زيادة بلغت (7.7% و 7.5% و 7.3%) (و 3.0%) (و 10.3%) لكل من اصناف (الفتح و تحدي و عدنانية و سالي) ولكلما الموسمين على التوالي. فيما اعطى الصنف سالي اقل قيمة لطول السنبلة بلغت (10.63 سم) لكلا الموسمين على التوالي . اما تأثير الملوحة فقد ادى زيادة جهد الملوحة الى انخفاض في هذه الصفة وقد اعطى الري بماء النهر اعلى طول للسنبلة بلغت (11.68 سم) لكلا الموسمين على التوالي متوفقا بذلك معنويا على جهد الملوحة (6 ديسى سيميز م⁻¹) والذي سجل اقل قيمة بلغت (10.59 سم) لكلا الموسمين على التوالي. وكذلك معنويا على المستوى (3 ديسى سيميز م⁻¹). يتبيّن من نتائج التحليل الاحصائي للجدول نفسه ان نمو الاصناف تحت جهد الملوحة سبب انخفاضا معنويا في هذه الصفة وقد اعطى نمو صنف العراق تحت جهد الملوحة (3 ديسى سيميز م⁻¹) اعلى قيمة لهذه الصفة . فيما كان الصنف سالي وعند جهد الملوحة (3 ديسى سيميز م⁻¹) اكثرا تأثرا فسجل اقل القيم لكلا الموسمين على التوالي.

جدول(6) تأثير الاختلاف الوراثي لأصناف حنطة الخبز تحت جهد الملوحة في طول السنبلة(سم).

المعدل	الموسم 2013-2012			الموسم 2012-2011			الملوحة الاصناف	
	6	3	ماء نهر	المعدل	6	3	ماء النهر	
11.16	10.45	11.35	11.68	11.03	10.40	11.16	11.55	الفتح
11.50	10.89	11.65	11.98	11.88	11.27	11.96	12.43	العراق
10.72	10.08	10.76	11.32	11.30	10.90	11.30	11.71	تحدي
10.68	10.08	10.63	11.35	11.05	10.33	11.33	11.49	عدنانية
10.63	10.03	10.43	11.45	10.77	10.05	11.03	11.24	سالي
10.306	10.94	11.56	10.96	11.55	11.21	11.56	11.68	المعدل

الاصناف	الملوحة	الاصناف	الملوحة	LSD 0.05
Xالاصناف	Xالملوحة	Xالاصناف	Xالملوحة	
Xالاصناف	Xالملوحة	Xالاصناف	Xالملوحة	
0.3253	0.2531	0.4143	0.2332	
0.9023				

عدد السنابلات/سنبلة

تبين نتائج الجدول (7) الى انخفاض معنوي في عدد السنابلات/سنبلة عند تعرض الاصناف لجهد الملوحة . لقد سجل الصنف العراقي اعلى معدل لعدد السنابلات / سنبلة بلغ 21.1 و 20.7 لكلا الموسمين على التوالي مقارنة بالاصناف الاخرى يليه الصنف تحدي والذي اعطى اعلى قيمة لهذه الصفة بلغ 19.6 و 19.4 في الموسمين الاول والثاني على التوالي ، فيما اعطى الصنفان الفتح و سالي اقل قيمة لهذه الصفة ولكلتا الموسمين . كما سببت زيادة جهد الملوحة من 0-6 ديسى سيميز .M¹ الى انخفاض معنوي في هذه الصفة وكذا قيمة لهذه الصفة ولكلتا الموسمين . ديسى سيميز .M¹ بلغ 18.6 و 18.4 لكلا الموسمين على التوالي . تشير نتائج التحليل الاحصائي وبصورة عامة ان نمو الاصناف تحت جهد الملوحة ادى الى انخفاض معنوي في هذه الصفة عن معاملة ماء النهر والتي سجل فيها صنف العراق اعلى قيمة لهذه الصفة بلغ 21.7 و 21.9 لكلا الموسمين على التوالي و عند نموه بغياب جهد الملوحة (ماء النهر) . فيما كان الصنفان الفتح و سالي اكثرا الاصناف تأثيراً بجهد الملوحة ولكلتا الموسمين و عند اعلى جهد للملوحة .

جدول(7) تأثير الاختلاف الوراثي لأصناف حنطة الخبز تحت جهد الملوحة في عدد السنابلات/سنبلة.

الموسم 2013-2012				الموسم 2012-2011				الملوحة الاصناف
المعدل	6	3	ماء نهر	المعدل	6	3	ماء النهر	
19.0	18.0	18.5	20.6	18.9	18.0	19.0	19.8	الفتح
20.7	19.6	20.8	21.9	21.1	20.7	21.0	21.7	العراق
19.4	18.4	19.3	20.7	19.6	18.7	19.8	20.3	تحدي
19.2	18.2	19.0	20.4	19.4	18.9	19.3	20.0	عدنانية
18.6	18.1	18.6	19.3	19.1	18.3	19.1	20.1	سالي
19.2	18.4	19.24	20.5	19.6	18.9	19.6	20.3	المعدل

0.923	الاصناف	1.214	الاصناف	LSD 0.05
0.752	الملوحة	0.822	الملوحة	
1.502	الاصناف X الملوحة	1.840	الاصناف X الملوحة	

عدد الحبوب/سنبلة

يتضح من نتائج جدول (8) الى تباين اصناف حنطة الخبز عند تعرضها لجهد الملوحة وقد تفوق الصنف العراقي معنويا في اعطاءه اعلى قيمة لهذه الصفة بلغت 66.8 و 67.3 لكلا الموسمين على التوالي متتفقا بذلك على جميع الاصناف الاخرى وبنسب زيادة بلغت 1.2 او 2.9 او 3.6 % في الموسم الاول و 5.2 او 4.8 او 7.6 % في الموسم الثاني لكل من اصناف الفتح و تحدي و عدنانية و سالي على التوالي . فيما اعطى الصنف سالي اقل قيمة لعدد الحبوب/سنبلة بلغت 64.3 و 63.7 لكلا الموسمين على التوالي . اما تأثير الملوحة فقد ادى زيادة جهد الملوحة الى انخفاض في هذه الصفة وقد اعطى الري بماء النهر اعلى عدد للحبوب / سنبلة بلغت 68.2 و 66.1 لكلا الموسمين على التوالي متتفقا بذلك معنويا على جهد الملوحة (6 ديسى سيميز .M¹) والذي سجل اقل قيمة بلغت 64.3 و 63.1 لكلا الموسمين على التوالي . وكذلك معنويا على المستوى (3 ديسى سيميز .M¹) . يتبع من نتائج التحليل الاحصائي للجدول نفسه ان نمو الاصناف تحت جهد الملوحة سبب انخفاضا معنويا في هذه الصفة وقد حافظ صنف العراق تحت جهد الملوحة (3 ديسى سيميز .M¹) على اعلى قيمة لهذه الصفة . فيما كان الصنف سالي و عند جهدي الملوحة (3 ديسى سيميز .M¹) اكثرا تأثيرا فسجل اقل القيم لكلا الموسمين على التوالي .

جدول(8) تأثير الاختلاف الوراثي لأصناف حنطة الخبز تحت جهد الملوحة في عدد الحبوب/سنبلة.

الموسم 2013-2012				الموسم 2012-2011				الملوحة الاصناف
المعدل	6	3	ماء النهر	المعدل	6	3	ماء النهر	
63.5	62.7	63.3	64.7	66.5	64.7	66.3	68.6	الفتح
66.8	65.0	66.7	68.7	67.3	65.7	67.0	69.4	العراق
65.2	64.0	65.0	66.7	66.0	64.3	66.0	67.8	تحدي
63.7	62.3	64.0	65.0	65.4	63.7	64.3	68.2	عدنانية
63.7	61.7	63.7	65.7	64.9	63.3	64.2	67.2	سالي
64.6	63.1	64.5	66.1	66.0	64.3	65.5	68.2	المعدل

0.523	الاصناف	0.614	الاصناف	LSD 0.05
0.852	الملوحة	0.822	الملوحة	
1.522	الاصناف X الملوحة	1.830	الاصناف X الملوحة	

وزن 1000 حبة(غم)

يتضح من نتائج جدول (9) الى تباين اصناف حنطة الخبز عند تعرضها لجهد الملوحة وقد تفوق الصنف العرقي معنويا في اعطاءه اعلى وزن بلغ 36.104 غم لكلا الموسمين على التوالي متفقا بذلك على جميع الاصناف الاخرى وبنسبة زيادة بلغت 4.8% و 9.2% و 10.6% و 11.3% لكل من اصناف الفتح وتحدي وعدنانية وسالي ولكلما الموسمين على التوالي. فيما اعطى الصنفان سالي وعدنانية اقل قيمة لهذه الصفة و في كلما الملوحة فقد ادى زيادة جهد الملوحة الى انخفاض في هذه الصفة وقد اعطى الري بماء النهر اعلى وزن بلغ 35.617 غم لكلا الموسمين على التوالي متفقا بذلك معنويا على جهد الملوحة (6 ديسى سيميز.م⁻¹) والذي سجل اقل قيمة بلغت 35.106 غم لكلا الموسمين على التوالي. وكذلك معنويا على المستوى (3 ديسى سيميز.م⁻¹). يتبين من نتائج التحليل الاحصائي للجدول نفسه ان نمو الاصناف تحت جهد الملوحة سبب انخفاضا معنويا في هذه الصفة وقد حافظ صنف العراق في اعطاء اعلى القيم تحت جهد الملوحة (3 ديسى سيميز.م⁻¹) مقارنة بالاصناف الاخرى. فيما كانت الصنفان سالي وعدنانية وعند جهدي الملوحة (3 ديسى سيميز.م⁻¹) اقل تأثيراً سجل اقل القيم لكلا الموسمين .

جدول(9) تأثير الاختلاف الوراثي لأصناف حنطة الخبز تحت جهد الملوحة في وزن 1000 حبة(غم).

الموسم 2013-2012				الموسم 2012-2011				الملوحة الاصناف
المعدل	6	3	ماء نهر	المعدل	6	3	ماء نهر	
32.620	31.342	32.765	33.754	33.631	32.099	33.964	34.831	الفتح
36.104	33.897	36.543	37.872	35.651	34.193	35.217	37.545	العراق
33.378	31.761	32.942	35.432	33.996	32.063	33.843	36.084	تحدي
32.426	31.003	32.012	34.265	33.684	32.097	33.691	35.264	عدنانية
32.477	31.011	32.211	34.210	32.650	31.095	32.491	34.364	سالي
33.401	31.802	33.294	35.106	33.922	32.309	33.841	35.617	المعدل

1.021	الاصناف	1.212	الاصناف	LSD 0.05
1.042	الملوحة	0.724	الملوحة	
2.523	الاصنافXالملوحة	2.730	الاصنافXالملوحة	

حاصل الحبوب(طن.هـ⁻¹)

يلاحظ من بيانات جدول (10) اختلاف اصناف الحنطة للنمو تحت جهد الملوحة اذ تفوق الصنف العرقي معنويا في هذه الصفة مسجلا اعلى حاصل للحبوب بلغ 6.047 و 6.234 طن.هـ⁻¹ لكلا الموسمين بالتتابع مقارنةً مع الاصناف الاخرى ، فيما اعطى الصنفان عدنانية وسالي اقل معدل لهذه الصفة وفي كلما الموسمين والذي لم يختلفا معنويا عن بعضهما اما تأثير الملوحة فقد ادى زيادة التوصيل الكهربائي الى انخفاض معنوي في صفة الحاصل لجميع الاصناف المستخدمة في الدراسة وقد اعطى الري بماء النهر اعلى قيمة بلغت 6.565 و 6.458 طن.هـ⁻¹ ولكلما الموسمين بالتتابع فيما اعطى الري بماء ملوحته 6 ديسى سيميز.م⁻¹ اقل وزن بلغ 5.442 و 5.288 طن.هـ⁻¹ ولكلما الموسمين بالتتابع .كما بينت نتائج الجدول نفسه وجود تداخل معنوي بين الاصناف وزيادة الملوحة كاستجابة لهذه الاصناف للنمو تحت جهد الملوحة اذ يلاحظ انخفاض معنوي لجميع الاصناف عند زيادة قيمة EC وقد تفوق الصنف العرقي على حفاظه باعطائه اعلى حاصل عند التعرض لجهد الملوحة وقد سجل 6.415 و 6.116 طن.هـ⁻¹ عند نموه تحت جهد ملوحة 3 ديسى سيميز.م⁻¹ فيما اعطى 6.047 و 5.754 طن.هـ⁻¹ عند نموه تحت جهد ملوحة 6 ديسى سيميز.م⁻¹ ولكلما الموسمين بالتتابع متفقا بذلك معنويا على جميع الاصناف الاخرى .فيما كان الصنفان عدنانية وسالي اقل الاصناف تأثيراً عند التعرض لجهد الملوحة .

جدول(10) تأثير الاختلاف الوراثي لأصناف حنطة الخبز تحت جهد الملوحة في حاصل الحبوب(طن.هـ⁻¹)

الموسم 2013-2012				الموسم 2012-2011				الملوحة الاصناف
المعدل	6	3	ماء نهر	المعدل	6	3	ماء النهر	
5.914	5.428	5.985	6.329	6.043	5.310	6.227	6.593	الفتح
6.234	5.754	6.116	6.834	6.473	6.047	6.415	6.958	العراق
5.862	5.234	5.865	6.488	6.194	5.730	6.154	6.699	تحدي
5.517	5.019	5.213	6.321	5.573	5.115	5.323	6.282	عدنانية
5.516	5.009	5.219	6.321	5.576	5.010	5.427	6.293	سالي
5.809	5.288	5.679	6.458	5.972	5.442	5.909	6.565	المعدل

0.123	الاصناف	0.134	الاصناف	LSD 0.05
0.252	الملوحة	0.222	الملوحة	
0.592	الاصنافXالملوحة	0.630	الاصنافXالملوحة	

المناقشة

يعود تفوق اصناف الحنطة الناعمة وخاصة صنف العراق في صفات ارتفاع النبات وعدد السنابل . م² ومساحة ورقة العلم والوزن الجاف لورقة العلم إلى كفاءة هذا الصنف في مقاومة ظروف الاجهاد الملحي مما أدى إلى إعطاء نمو أفضل انعكсы في هذه الصفات عن طريق زيادة في البناء المعماري للجذور وكذلك استمرار كفاءة العمليات الحيوية تحت ظروف الاجهاد الملحي (14) و(15).

ان جهد الملوحة في وسط نمو الاصناف اثر سلباً في طول السنبلة وعدد السنبيلات/ سنبلة على اعتبار ان السنبلة هي مصب لنواتج البناء الضوئي وان الصنف العراق حافظ في اعطاء اعلى طول للسنبلة من خلال كفاءته في تحسن النمو وزيادة نمو المجموع الخضري مما ادى الى زيادة انتاجية النبات وهذا ناتج عن زيادة تحمل النبات لظروف الاجهاد الملحي(14). ان الانخفاض الحاصل في عدد الحبوب / سنبلة يعود الى التأثير السلبي لجهد الملوحة في نمو النبات وانخفاض مستوى العمليات الايضية والتي تؤثر جميعها في الحاصل البايولوجي ومكوناته وبذلك يتاثر عدد الحبوب / سنبلة ، وان الصنف العراق كان اكثر الاصناف كفاءة في اعطاء القيم الاعلى تحت الاجهاد الملحي عن طريق استمرار كفاءته في امتصاص العناصر الغذائية المهمة في العمليات الحيوية وبالتالي زيادة نمو النبات وتحسن انتاجيته . كما ان انخفاض وزن 1000 حبة في جميع الاصناف قيد الدراسة ناتج عن تأثير جهد الملوحة السلبي في وزن الحبوب الكلي الذي يعتمد على معدل تراكم المادة الجافة (15) وان احتفاظ الصنف العراق في وزن 1000 حبة تحت الاجهاد الملحي ناتجة عن كفاءة هذا الصنف ودوره الفعال في تعديل ومقاومة الجهد الازموزي وزيادة النمو الخضري للنبات وبالتالي زيادة وزن 1000 حبة.

ومن نتائج البحث يلاحظ الانخفاض المعني في حاصل الحبوب لجميع الاصناف تحت تأثير الاجهاد الملحي والذي اثر سلباً في وزن الحبوب والذي ادى الى فشل في امتلاء الحبة بالمواد الغذائية (15) مع احتفاظ صنف العراق نسبياً بأعلى حاصل حبوب وهذا يعود الى كفاءة هذا الصنف في تأثيره الفعال في ازالة التأثير السلبي للإجهاد الملحي وتحفيزه للنمو الخضري للنبات مما ادى الى زيادة نمو النبات وبالتالي زيادة الحاصل. وعلى ضوء النتائج اعلاه يمكن القول ان الصنف العراق قد تمكّن من تنبيط التأثيرات الضارة للإجهاد الملحي في صفات مكونات الحاصل من خلال كفاءة هذا الصنف في كسر الا ROS . كان عند أفضل حالة مقارنة بباقي الأصناف وعليه كان أداء هذا الصنف ولجميع المتغيرات أعلى بكثير من الأصناف الأخرى المدرستة . إن قدرة الصنف في تطوير نظام إنزيمي وغير إنزيمي دفاعي كفوء يمكن ذلك الصنف من مقاومة تجمع الا ROS وخلال الآليات المختلفة وبالتالي التخفيف من اثر الاجهاد (16و17 و18). توصي الدراسة الحالية باعتماد الصنف العراق باعتباره صنف كفوء في مقاومة الاجهاد الملحي عند اللجوء الى استخدام مياه ذات ملوحة عالية خاصة تحت تأثير الجفاف او عند شحنة المياه .

المصادر

- 1- اليونس ، عبد الحميد احمد ؛ محفوظ عبد القادر محمد و زكي عبد الياس . (1987) محاصيل الحبوب. مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،العراق.
- 2- Rausch , T .; Kirsch , M .; Low , R .; Lehr , A .; Viereck , R . and Zhigang , A . (1996) . Salt stress responses of higher plants. The role of proton pumps and Na^+ / H^+ antiprotons Plant Physiol.,148:425-433.
- 3- Sionit, N.; Teare ,I.D.and Kramer,P.J. (1980). Effect of repeat application of water stress on water status and growth of wheat. Plant Physiol., 50:11-15.
- 4- الكيار، عادل سليم هادي . (1998) (الاوجه الفسيولوجية لتحمل الملوحة لبعض التراكيب الوراثية لخطة الخبز *Triticum aestivum* L.) رسالة ماجستير، كلية الزراعة،جامعة بغداد،العراق .
- 5-Khan,M.J.(2007) . Physiological and biochemical mechanisms of salinity tolerance in different wheat genotypes. Thesis of Ph. D. N. W. F.P., Agricultural University, Peshawar,Pakistan.
- 6-Rhodes , D ., Nadolska A ., Rich , P. (2002) . Salinity , Osmolyles and Compatible . Salinity : Environment – Plants - Molecules . 181 – 204.
- 7- الزبيدي ، احمد حيدر . (1989) (ملوحة التربة الاسس النظرية والتطبيقية . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . جامعة بغداد بيت الحكم .
- 8-Van Camp, W, Capiauk, van Montagu.M., Inze D., Slooten.,(1996) .Enhancement of oxidative stress tolerance in transgenic tobacco plants over producing Fe superoxid dismutase in chloroplast . Plant Physiol . 112;1703-14.
- 9-Stepien, P.,Klobus, G.(2005) Antioxidant defuse in the leaves of C3and C4 plants under salinity stress. Physiol. Plant.125: 31-40.
- 10-Afzal,I.,Basra.S.M.,Hameed.A. and Fakoo Q.M .(2006).Physiological enhancements for Alleviation of salt stress in wheat. Pak .J .Bot. 38(5):1649-1659.
- 11-Page, A.I. (1982).Methods of Soil Analysis Part 2.Chemical and Microbiological Properties. Amer. Soc. Agron. Midison Wisconsin. USA.
- 12- جدع ، خضرير عباس . (1995) . الخطة حقائق وإرشادات . منشورات وزارة الزراعة . الهيئة العامة للإرشاد والتعاون الزراعي .
- 13-Steel , R.G.D. and Torri , J.H. (1960) Principles and Procedures of Statistics with Special Reference to the Biological Sciences Mccgraw - Hill book company – Inc. New York. 14 (4) p. 519 – 540 .
- 14-Jadav, K.I Wallihan , E.F. , Shar Pless .R.G. and Printy , w.l. 1976 Salinity effects on nitrogen use by wheat cultivar sonorabn. Agronomy .38 (3) : 68 – 222 .
- 15 -Levitt, J. (1980). Responses of Plants to Environmental Stresses . Vol 2,Acad.Press,NewYork.
- 16- Luna , G.M.Pastori , S.Driscoll, K.Groten S.Bernard and C.H. Foyer , (2004) . Drought controls on H_2O_2 accumulation, catalase (CAT) activity and CAT gene expression in wheat. J. of Experimental Botany,56;417-423.
- 17-Shahbazi,H.,M.Taeb M.R .Bihamta and F. Darvish.(2009) Inheritance of Antioxidant Activity of Bread Wheat under terminal drought stress . J. Agic. &Environ Sci., 6(3) :298- 302.
- 18- العامري، عباس علي . (2012) تأثير الحديد والزنك والبيكاربونات في نمو وحاصل بعض أصناف الخطة وعلاقتها ببعض مضادات الأكسدة الإنزيمية اطروحة دكتوراه ، كلية الزراعة،جامعة بغداد،العراق .