

Effect of different polyethylene color soil mulch and cultivated medium on "Festival" yield and its quality of strawberry cv.

تأثير تغطية التربة بألوان مختلفة من البولي اثلين و الوسط الزراعي في حاصل ونوعية الشليك صنف "Festival"

سارة سعدي عبد
كلية الزراعة / جامعة الكوفة

ثامر خضير مرزة
كلية العلوم / جامعة الكوفة

Abstract الخلاصة

أجريت التجربة في بيت البلاستيكي في شعبة البستنة والغابات / مديرية الزراعة في النجف الأشرف من 2012/11/14 ولغاية 2013/5/12 لدراسة تأثير عاملين هما : تغطية التربة بألوان مختلفة من البولي اثلين: الشفاف و الأبيض و الأسود ونسب مختلفة من الوسط الزراعي (مخلفات الرز) مع التربة بنسبة 1 : 1 و 3 : 1 تربة : سماد فضلاً عن معاملة السيطرة (تربة فقط) وتداخلتهما في حاصل الشليك (*Fragaria x ananassa Duch*) ونوعية الصنف "Festival".

تميزت النباتات النامية بالترب المغطاة بالبولي اثلين الشفاف أعلى حاصل كلي بلغ 182.1 غم / نبات. وتبين إن ثمار نباتات تغطية التربة بالبولي اثلين الأسود أنتجت أعلى نسبة للمواد الصلبة الذائبة الكلية أثناء الجنية الأولى ومقدارها 6.22 % وأعلى نسبة حموضة في الثمار مقدارها 0.48 % فيما أنتجت ثمار نباتات معاملة التغطية بالبولي اثلين الأبيض أعلى كمية من فيتامين C في الجنية الأخيرة التي بلغت 67.73 ملغم / 100 غم وزن طري .

و تميزت نباتات الوسط الزراعي بـ 1 تربة : 1 سماد بأعلى حاصل كلي بلغ 213.0 غم / نبات مقرونة بأعلى نسبة للمواد الصلبة الذائبة الكلية في الجنية الأولى ومقدارها 6.22 % ، فيما أنتجت ثمار نباتات المقارنة أعلى نسبة حموضة للثمار مقدارها 0.51 % . اما في 2013/4/12 فأنتجت ثمار نباتات معاملة الوسط الزراعي بـ 3 تربة : 1 سماد أعلى كمية من فيتامين C بلغت 68.30 ملغم / 100 غم وزن طري .

تميزت نباتات معاملة التداخل بين التغطية بالبولي اثلين الشفاف و الوسط بـ 1 تربة : 1 سماد بإنتاج اكبر حاصل كلي مقداره 277.5 غم / نبات ، وتميزت ثمار نباتات معاملة التغطية بالبولي اثلين الأبيض مقرونة بالوسط نفسه بإنتاج أعلى نسبة للمواد الصلبة الذائبة الكلية في الثمار بلغت 6.67 % ، على التوالي . كما حققت نباتات التداخل بين البولي اثلين الأسود والوسط 3 تربة : 1 سماد أو بدون تسميد و معاملة التغطية بالبولي اثلين الأبيض وبدون تسميد و التغطية بالبولي اثلين الشفاف وبدون تسميد للتربة بأعلى النسب من الحموضة الكلية بلغت 0.55 % . كما تفوقت نباتات التداخل بين التغطية التربة بكل من البولي اثلين الشفاف و الابيض و الاسود مقرونة بالوسط 3 تربة : 1 سماد بإنتاجها أعلى كمية من فيتامين C بلغ 68.30 ملغم / 100 غم وزن طري لكل منها ، على التوالي .

ABSTRACT:

Plastic house experiment was conducted in Horticulture and Forestry Dept./ Al - Najaf Agricultural Directorate from 14/11/2012 until 12/5/2013. The aim was to study the effects of two factors , the first : soil mulching with different colors : transparency , white and black , the second : two quantities of Agricultural media at a ratio of 1:1 and 3:1 soil to compost in addition to control treatment (soil alone) and their interactions on yield and quality of Strawberry (*Fragaria x ananassa Duch*) cv." Festival ".

Results showed that plants grown in a transparency polyethylene mulch produced the highest yield reached 182.1 g / plant Fruits of black polyethylene mulched soil produced the highest total soluble solid percentage at the first fruits picking reached 6.22 % and the highest total acidity percentage reached 0.48 % . Moreover , fruits of plants grown with white polyethylene soil mulch gave the highest amount of vitamin C at the last picking reached 67.73 mg/ 100g fresh weight .

The ratio of Agriculture medium 1:1 soil to compost has significant effect marked with the highest total plant yield of 213.0 g / plant accumulated with the production of the highest per cent of total soluble solid at the first picking reached 6.22 % , meanwhile , fruit of control plant treatment gained the highest total acidity percentage at the same picking time, it was

0.51% while , at the last picking time(12/4/2013) fruits of 3:1 treatment gave the highest amount of vitamin C reached to 68.30 mg / 100g fresh weight .

The interaction between studied factors from transparency polyethylene mulched soil and Agriculture medium at a rat of 1:1. the largest plant yield of 277.5 g/ plant in addition to gain the highest total soluble solid of 6.67 % Interaction between plant of black soil mulch and medium of 3:1 soil to compost produced the highest percentage of total acidity of 0.55 % . Fruits of plants produced from the interactions between transparency white and black mulch and the same above medium the highest values of vitamin C reached 68.30 mg/ 100g fresh weight

المقدمة Introduction

يعد نبات الشليك (الفراولة) *Fragaria x ananassa Duch* الذي يعود إلى العائلة الوردية (Rosaceae) من المحاصيل ذات الثمار الصغيرة والواسعة الانتشار في مناطق العالم المختلفة وذلك لكثرة أصنافه وقدرتها على التكيف والنمو في المناطق البيئية المتباينة (1) . يعد نبات الشليك من الفواكه المبكرة في الإنتاج فهو المحصول الطازج الأول من بين أنواع الفواكه التي تظهر ثمارها في الأسواق في الربيع . الثمار ذات طعم ممتاز وذات نكهة مميزة التي تستعمل في الكثير من الصناعات الغذائية كالمربي والجلي والحلويات والعصائر وتستهلك مادة أولية في الكثير من المستحضرات الغذائية لعطرها وطعمها ونكهتها المميزة مثل صناعة المثلجات والمعجنات (2). و للشليك قيمة غذائية عالية لاحتوائه على الكثير من المكونات مثل الكربوهيدرات والبروتين والدهون والفيتامينات و الأحماض العضوية والعناصر المعدنية (2) ولثمار الشليك فضلا عن قيمه اقتصادية (3) والطبية والعلاجية فإن عصيرها قلوي ، مدرر للبول وله تأثير منشط على إفرازات المعدة بسبب احتوائه على حوامض عضوية وأملاح و بوتاسيوم حيث يقلل من ضغط الدم ومضاد للتسمم وله فوائد في علاج الروماتزم وداء المفاصل والكبد والسل ويستعمل لأزالة صفرة الأسنان والترسبات المتركمة عليها (2 و4) . توجد عوامل كثيرة تؤثر في نمو و تزهير وإنتاجية نبات الشليك ومنها تغطيته ألتربة (Mulching) التي تعد من العمليات الزراعية المهمة في تنمية وإنتاج الشليك لمالها من مميزات كثيرة أهمها المحافظة على نوعية الثمار ومنع تعفنها و المحافظة

على رطوبة التربة وتحفيز نمو الجذور أسطحيه وتقليل نمو الأدغال (4). من جانب آخر، تعد الأوساط الزراعية احد مصادر المادة العضوية للتربة و يمكن أن تكون بديلا عن الأسمدة الكيمايية كونها تمد النبات بالعناصر الغذائية و لها تأثيرات أخرى في زيادة حاصل النبات وخصوبة التربة وذلك من خلال زيادة المادة العضوية فيها ، وسعة احتفاظها بالرطوبة ، ومحتوى المغذيات ونشاط الأحياء المجهرية (5 و 1) كما أثبتت إن إضافة المخلفات النباتية تأثيرات ايجابية في نمو المجموع الجذري وتشجيع نمو النبات عن طريق الهرمونات (6).

وبناءً على ماتقدم ولقلة الدراسات على نمو نبات الشليك و إنتاجيته في محافظة النجف الاشرف ، فقد نفذت هذه التجربة لدراسة تأثير استعمال الوان مختلفة من البولي اثلين (تختلف في درجة نفاذيتها للضوء و الحرارة) في تغطية التربة ، و الاسمدة العضوية (مخلفات الرز) في نبات الشليك و نوعيته .

المواد وطرائق العمل Materials and Methods

موقع التجربة:

أجريت هذه التجربة في محافظة النجف الأشرف في شعبة البستنة والغابات التابعة لمديرية زراعة النجف الاشرف لموسم 2012-2013 بدءاً من 2012/11/14 ولغاية 2013/5/12

المعاملات والتصميم التجريبي :

تضمنت هذه التجربة دراسة عاملين هما : العامل الأول تغطية التربة والعامل الثاني هو كمية الاوساط الزراعية باستعمال تصميم وفق تصميم تصميم الألواح المنشفة Split-Polit Design (7) إذشملت الألواح الرئيسية Main plots ألوان البولي اثلين نو سمك 150 مايكرون ويشمل : الألوان الشفاف والأبيض والأسود. اما الألواح الثانوية Sub-plots فقد تضمنت الخطوط المرتفعة عن تربه البيت البلاستيكي وقد خلطت فيها التربة المزيجية بنسب مختلفة من السماد العضوي المتحلل (مخلفات الرز) باعتبارها الأوساط الزراعية وكانت : وسط بنسبه 1 جزء تربة مزيجية: 1 جزء مخلفات الرز وسط بنسبه 3 جزء من التربة مزيجية : 1 جزء مخلفات الرز متحلل، والتربة لوحدها (مقارنه).

تهيئة التربة وإعدادها للزراعة:

هيئت تربه التجربة (البيت البلاستيكي) الذي أبعاده (55 م X 10 م) ومساحته 550 م² عن طريق حرارته عدة مرات لضمان تعميم التربة وتفكيكها وللتنخلص من الأعشاب النامية . ثم قسمت التربة إلى خطوط ، بهيأة مستويات مرتفعة عن سطح تربه البيت البلاستيكي طول الخط 50 م وقاعدة الخط من الأسفل 60 سم ومن الأعلى 40 سم ، ارتفاع الخط 25 سم والمسافة بين خط والأخر 1.3 م . ثم عملت حفر لتحديد أماكن زراعه الشتلات المجهزة للشتل بعد إعدادها للشتل بحيث تكون المسافة بين نبات وأخر 20 سم . تم اختيار ثلاثة خطوط في هذا البحث غطي كل خط بلون بولي اثلين مختلف : شفاف والأبيض والأسود . ثم قسم كل خط (متن) من الخطوط الثلاثة إلى ثلاثة أقسام ، كل قسم منه عُدّ وسطاً بنسب 1:1 او 1:3 من تربه المزيجية و الوسط

الزراعي ، على التوالي . و القسم الثالث استعملت تربه مزيجيه (مقارنه) . جرت عمليات خدمة المحصول بصورة متساوية لجميع المعاملات من التعشيب والري حسب طرائق المتبعة في إنتاج الشليك في العراق.

القياسات التجريبية :

كمية الحاصل الكلي :

حسبت على اساس ماتجمعة نباتات المعاملة الواحدة طيلة مدة الجمع والتي بلغت 16 جنية ابتدأت في 2013/ 2/10 وانتهت في 2013/ 5/12

الصفات النوعية للثمار :

1-نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية بالثمرة (%)

قدرت نسبه المواد الصلبة الذائبة الكلية بالثمرة باستعمال جهاز المكسار اليدوي (Hand refractometer) وذلك حسب طريقة (8) .

2-النسبة المئوية للحموضة الكلية القابلة للتعاادل بالثمرة (%)

قدرت الحموضة الكلية القابلة للتعاادل بالثمرة بوصفها نسبة مئوية بحسب الطريقة الموضحة في (9) حسب المعادلة التالية

$$\text{حموضة (\%)} = \frac{\text{عياريه القاعده } X \text{ كميتها } X 0.064 X \text{ حجم النهائي للمحلول}}{100X} = \frac{\text{حجم المحلول المسح } X \text{ وزن العينه}}{100X}$$

3-محتوى لب الثمار من فيتامين C:

قدر فيتامين C بطريقة التسحيح باستعمال صبغه 2,6-di chlorophenol indophenoi وحسب المعادله الموصوفه في (10) ح x ع x التخفيفات

$$\text{محتوى لب الثمار في فيتامين C} = \frac{100X}{\text{وزن العينه (غم)}}$$

ح=عدد ملغرامات الصبغه اللازمه للتعاادل .
ع=قوه الصبغه او عدد ملغرامات فيتامين C التي تتعاادل مع سم³ واحد من الصبغه

النتائج :

اشارت نتائج التحليل الاحصائي الخاصة بالجدول (a : 1) الى تفوق الحاصل الكلي في ثمار النباتات التي غطيت تربتها بالبولي اثلين الشفاف باعلى حاصل مقداره 14.8 غم / نبات بينما انتجت النباتات التي غطيت تربتها بالبولي اثلين الابيض والاسود اقل حاصل كلي مقداره 13.0 و 13.4 غم / نبات ، على التوالي . كما ان النباتات التي سمدت تربتها ب I تربة : I سماد انتجت اعلى حاصل كلي للثمار مقداره 20.1 غم / نبات مقارنة مع النباتات التي نمت في ظروف التربة فقط التي انتجت اقل حاصل كلي مقداره 3.6 غم / نبات . ولوحظ ايضاً في الجدول ذاته ان نباتات التداخل a₁b₁ انتجت اعلى حاصل كلي مقداره 22.3 غم / نبات في حين انتجت نباتات التداخلات a₁b₃ و a₂b₃ و a₃b₃ اقل حاصل كلي مقداره 3.6 و 3.6 و 3.7 غم / نبات ، على التوالي . وأشار الجدول (b : 1) الى تفوق ثمار النباتات التي نمت في ظروف التغطية بالبولي اثلين الشفاف باعلى حاصل كلي مقداره 69.3 غم / نبات مقارنة مع ثمار نباتات التي غطيت تربتها بالبولي اثلين الاسود التي انتجت اقل حاصل هو 43.6 غم / نبات . كما تبين ان النباتات التي شتلت بوسط I تربة : I سماد انتجت اعلى حاصل كلي بلغ 76.8 غم / نبات مقارنة مع الحاصل الكلي لنباتات معاملة السيطره التي انتجت اقل حاصل مقداره 19.9 غم / نبات. اما التداخل بين عاملي الدراسة فتبين ان نباتات التداخل a₁b₁ اعطت اعلى حاصل مقداره 107.3 غم / نبات بينما اعطت نباتات التداخلات a₁b₃ و a₂b₃ و a₃b₃ اقل حاصل كلي بلغ 19.9 و 19.9 و 20.0 غم / نبات ، على التوالي .

أما النتائج المعروضة في جدول (c : 1) تشير الى ان ثمار النباتات التي نمت تحت ظروف التغطية بالبولي اثلين الشفاف انتجت اعلى حاصل كلي مقداره 142.7 غم / نبات مقارنة مع ثمار النباتات التي غطيت تربتها بالبولي اثلين الاسود التي انتجت اقل حاصل هو 92.4 غم / نبات . كما لوحظ تميز النباتات التي نمت بوسط I تربة : I سماد بأنتاجها اعلى حاصل كلي بلغ 162.1 غم / نبات مقارنة مع الحاصل التراكمي الكلي لنباتات التي نمت تحت ظروف التربة فقط التي انتجت اقل حاصل كلي مقداره 92.4 غم / نبات . ان التداخل بين عاملي الدراسة اوضح ان نباتات التداخل a₁b₁ اعطت اعلى حاصل كلي للثمار مقداره 217.5 غم / نبات بينما اعطت نباتات التداخلات a₁b₃ و a₂b₃ و a₃b₃ اقل حاصل كلي بلغ 35.2 و 35.5 و 35.8 غم / نبات ، على التوالي .

و اشار الجدول (d : 1) إلى وجود فروق معنويه بين معاملات تغطية التربة والاسواس الزراعية في كمية الحاصل الكلي للأشهر الأربعة ، إذ لوحظ تفوق الحاصل الكلي في ثمار النباتات التي غطيت تربتها بالبولي اثلين الشفاف باعلى حاصل مقداره 182.1 غم / نبات بينما انتجت النباتات التي غطيت تربتها بالبولي اثلين الاسود اقل حاصل كلي مقداره 124.6 غم / نبات. وفيما يخص تأثير الاسواس الزراعية النباتية فتبين ان النباتات التي نمت بوسط زراعي I تربة : I سماد انتجت اعلى حاصل كلي للثمار مقداره 213.0 غم/نبات مقارنة مع النباتات التي نمت في ظروف التربة فقط التي انتجت اقل حاصل كلي مقداره 54.6 غم / نبات ،

ولوحظ أيضاً في الجدول ذاتة ان نباتات التداخل a_1b_1 انتجت اعلى حاصل كلي مقداره 277.5 غم / نبات في حين انتجت نباتات التداخلات a_2b_3 و a_1b_3 و a_3b_3 اقل حاصل كلي مقداره 53.1 و 54.1 و 56.7 غم / نبات ، على التوالي .

جدول (1 : a) تأثير لون البولي اثلين والوسط الزراعي وتداخلاتهما في كميته الحاصل (غم / نبات) للشهر الثاني من الجني *

معدل لون البولي اثلين	الوسط الزراعي (تربة : سماد)			لون البولي اثلين
	المقارنه	1:3	1:1	
14.8 a	3.6 e	18.5 bc	22.3 a	شفاف
13.0 b	3.6 e	16.0 d	19.3 b	الابيض الناصع
13.4 b	3.7 e	17.9 c	18.6 bc	الاسود
	3.6 c	17.5 b	20.1 a	معدل الوسط الزراعي

جدول (1 : b) تأثير لون البولي اثلين والوسط الزراعي وتداخلاتهما في كميته الحاصل (غم / نبات) لشهرين من الجني *

معدل لون البولي اثلين	الوسط الزراعي (تربة : سماد)			لون البولي اثلين
	1:1	1:1	1:1	
69.3 a	19.9 e	80.8 b	107.3 a	شفاف
47.6 b	19.9 e	56.8 c	66.2 c	الابيض الناصع
43.6 c	20.0 e	53.9 d	57.0 c	الاسود
	19.9 c	63.8 b	76.8 a	معدل الوسط الزراعي

جدول (1 : c) تأثير لون البولي اثلين والوسط الزراعي وتداخلاتهما في كميته الحاصل (غم / نبات) لثلاثة اشهر من الجني *

معدل لون البولي اثلين	الوسط الزراعي (تربة : سماد)			لون البولي اثلين
	1:1	1:1	1:1	
142.7 a	35.2 f	175.5 b	217.5 a	شفاف
100.7 b	35.5 f	123.3 d	143.4 c	الابيض الناصع
92.4 c	35.8 f	116.0 e	125.5 d	الاسود
	92.4 c	138.3 b	162.1 a	معدل الوسط الزراعي

جدول (1 : d) تأثير لون البولي اثلين والوسط الزراعي وتداخلاتهما في كميته الحاصل (غم / نبات) لأربعة أشهر من الجني *

معدل لون البولي اثلين	الوسط الزراعي (تربة : سماد)			لون البولي اثلين
	1:1	1:1	1:1	
182.1 a	54.1 f	214.8 b	277.5 a	شفاف
138.6 b	56.7 f	164.0 d	195.0 c	الابيض الناصع
124.6 c	53.1 f	154.1 e	166.5 d	الاسود
	54.6 c	177.6 b	213.0 a	معدل الوسط الزراعي


*المعدلات التي تشترك بالحرف الابجدي نفسة لاتختلف عن بعضها معنويا في كل جدول ولكل عامل والتداخل حسب اختبار دنكن متعدد الحدود على مستوى احتمال 0.05.

من جانب اخر يُستنتج مما هو معروف في الشكل (1 : a) وجود علاقه عكسيه في نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية و معاملات تغطية التربة المختلفة باستمرار نمو النبات وتقدمه في العمر بصورة عامة ، إذ تبين ان النباتات التي نمت في ظروف البولي اثلين الاسود قد انتجت اعلى نسبة من المواد الصلبة الذائبة الكلية في 2/12 و 3/12 في حين اظهرت ثمار النباتات التي نمت في ظروف البولي اثلين الشفاف اقل نسبة من المواد الصلبة الذائبة في تاريخ 12/2 ، بينما عند الجنيه الاخيرة فقد اعطت ثمار النباتات التي نمت في ظروف البولي اثلين الشفاف اعلى نسبة للمواد الصلبة الذائبة في حين انتجت ثمار النباتات التي نمت في ظروف البولي اثلين الاسود اقل نسبة للمواد الصلبة الذائبة الكلية . هذا واتضح ان جميع معاملات التغطية كانت عند مستوى المعدل العام من نسبة المواد الصلبة الذائبة . تبين في الجنيه الاولى تفوق نسبة المواد الصلبة الذائبة في ثمار النباتات التي نمت تحت تأثير التغطية بالبولي اثلين الاسود والتي اعطت اعلى القيم 6.22 % ، اما ثمار النباتات المغطاة بالبولي اثلين الشفاف فقد انتجت اقل نسبة من المواد الصلبة الذائبة الكلية بلغت 5.44 % ، بينما بتاريخ 3/12 تفوقت نسبة المواد الصلبة الذائبة في ثمار


النباتات التي نمت تحت ظروف التغطية بالبولي اثلين الاسود إذ بلغت 5.11 % مقارنة بنسبتها في ثمار النباتات التي نمت تحت ظروف التغطية بالبولي اثلين الابيض والشفاف التي بلغت فيها النسبة 4.88 و 4.77 % ، على التوالي ، وعند اخر جنيه تفوقت نسبة المواد الصلبة الذائبة في ثمار النباتات التي غطيت تربتها بالبولي اثلين الشفاف باعلى نسبة وهي 3.73 % مقارنة مع نسبتها في النباتات التي غطيت تربتها بالبولي اثلين الاسود التي انتجت اقل نسبة مواد صلبة ذائبة كلية وهي 3.20 % .

أما الشكل (1: b) الذي أوضح العلاقة السلبية بين كمية الوسط الزراعي النباتي ونسبة مواد الصلبة الذائبة الكلية بتقدم نمو وعمر النبات ، حيث أوضح ان اعلى نسبة للمواد الصلبة الذائبة كانت في ثمار النباتات التي زرعت بوسط اترية : 1 سمد بصورة عامة ، اما ثمار نباتات معاملة السيطرة فقد أعطت اقل نسبة للمواد الصلبة الذائبة كلية . من جانب اخر ، تبين ان جميع معاملات الاوساط الزراعية كانت في حدود مستوى المعدل العام للمواد الصلبة الذائبة الكلية . وكما يلحظ تفوق ثمار نباتات الوسط 1 تربه : 1 سمد بأعلى نسبة للمواد الصلبة الذائبة في كل تواريخ اخذ العينة إذ بلغ 6.22 و 5.33 و 3.94 % ، على التوالي مقارنة مع ثمار النباتات التي نمت في ظروف معاملة السيطرة (تربه فقط) التي اعطت اقل نسبة للمواد الصلبة الذائبة بلغت 5.55 و 4.55 و 2.78 % ، على التوالي .

إن نتائج التحليل الاحصائي الخاصة في نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية في ثمار نبات الشليك في الجدول (2) اشارت الى التأثير معنوي بين تغطيه التربه بالوان مختلفه من البولي اثلين وكميه الوسط الزراعي فيها. إذ انتجت ثمار نباتات التداخلات a_2b_2 و a_3b_1 التي لا تختلف عن بعضها معنويا اعلى نسبة مواد الصلبة الذائبة الكلية بلغت 6.66 و 6.66 و 6.67 % في الجنيه الاولى بينما انتجت نباتات التداخلات a_1b_1 و a_1b_3 و a_3b_3 التي لا تختلف عن بعضها معنويا وانتجت اقل نسبة للمواد الصلبة الذائبة للثمار بلغت 5.33 % لكل منهما. ومن ناحية اخرى بيّن الموعد الثاني 3/12 ان نباتات التداخلات a_1b_1 و a_2b_1 و a_3b_1 لا يوجد اختلافات معنوية فيما بينها وانتجت اعلى نسبة للمواد الصلبة الذائبة للثمار بلغت 5.33 % لكل منهما مقارنة مع نباتات التداخل a_2b_3 التي انتجت اقل نسبة مقداره 4.33 % . وفي الجنيه الاخير في 4/12 ظهر ان نسبة المواد الصلبة الذائبة في الثمار تختلف فيما بينها معنويا إذ تفوقت نسبة المواد الصلبة الذائبة لثمار نباتات التداخل a_1b_1 معنويا إذ بلغت 4.50 % بالمقارنة مع نسبتها في ثمار نباتات التداخلات a_1b_3 و a_3b_3 و a_2b_3 التي لا تختلف معنويا عن بعضها و أنتجت اقل النسب وهي 2.70 و 2.78 و 2.80 % ، على التوالي .




شكل (1 :a) علاقة نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية بتأثير التغطية بالبولي اثلين




إن الشكل (a : 2) يوضح العلاقة العكسية بين معاملات تغطية التربة بألوان مختلفة من البولي اثلين وقيمه الحموضة الكلية بالثمار بتقدم عمر النبات بصورة عامة، إذ يلاحظ عند اخذ العينة الأولى ان ثمار نباتات معاملة تغطية التربة بالبولي اثلين الأسود أنتجت أعلى القيم للحموضة بينما أنتجت ثمار نباتات معاملة التغطية بالبولي اثلين الشفاف اقل نسبة حموضة كلية ، وعند اخر جنيه تبين ان جميع معاملات تغطية التربة لا تختلف معنويًا عن بعضها في تلك الصفة . كما تبين ان نسبة الحموضة الكلية في ثمار النباتات التي غطيت تربتها بالبولي اثلين الاسود كانت اعلى من المعدل العام في 3/12 ، اما في 4/12 فكانت حموضة ثمار نباتات معاملات التغطية جميعها اقل من المعدل العام ، و في 5/12 فتبين ان حموضة ثمار النباتات جميع معاملات التغطية كانت اعلى من المعدل العام بصورة عامه .

اما فيما يتعلق في خطوط الإنحدار التي اوضحها الشكل (b : 2) فيتبين ان هناك علاقة عكسية أيضاً بين كميته الاوساط الزراعية النباتي المضاف للتربة التي تنمو فيه نباتات الشليك ونسبه الحموضه الكليه للثمار مع تقدم عمر النبات واستمراره في الانتاج . إذ يلحظ ان أعلى نسبة حموضة أنتجت ثمار نباتات معاملة السيطره ، اما اقل نسبه حموضه أنتجت ثمار النباتات تحت تأثير الوسط 1 تربه : 1 سمد بصورة عامه ، وكذلك تبين ان ثمار نباتات معاملة السيطره أنتجت نسبه حموضه فوق المعدل العام بتاريخ 2/12 . اما ثمار معاملات الاوساط الزراعية 1 تربه : 1 سمد و 3 تربه : 1 سمد بالاضافه الى معاملة السيطره (تربه فقط) كانت ثمارها قد أنتجت حموضه اقل من المعدل العام في 3/12 كما يلحظ ان نسبه الحموضه في ثمار نباتات معاملات الاوساط الزراعية جميعها ومعامله السيطره كانت اعلى من المعدل العام في 4/12 . كما لوحظ في 2/12 و 3/12 وجود فرق في حموضه ثمار النباتات بين معاملات الاوساط المختلفه إذ تفوقت نسبه الحموضه الكليه في ثمار نباتات معاملة السيطره بلغت 0.51 و 0.15 % مقارنة مع نسبة حموضه في ثمار النباتات التي سممت تربتها ب 1 تربه : 1 سمد بلغت 0.36 و 0.12 % لكل من التاريخين ، على التوالي . ومع تقدم النبات في النمو بتاريخ 4/12 تفوقت نسبة الحموضه في ثمار نباتات الوسط الزراعي 1 تربه : 1 سمد بلغت 0.081 % مقارنة مع حموضه ثمار نباتات الوسط الزراعي 3 تربه : 1 سمد وحموضه ثمار نباتات السيطره التي لا تختلف معنويًا إذ بلغت 0.078 و 0.077 % على التوالي .

إن نتائج التحليل الاحصائي المتوفره في الجدول (3) اشارت الى وجود تأثير معنوي للتداخل بين تغطية التربه بالوان مختلفه من البولي اثلين وكميه الوسط الزراعي في نسبه الحموضه الكليه في ثمار الشليك في كل تواريخ اخذ العينه النباتيه . اذ تبين في الجنيه الاولى تفوق نسبه الحموضه الكليه في ثمار النباتات التداخل a_3b_2 و a_2b_3 و a_1b_3 و a_3b_3 إذ أنتجت نسبه الحموضه الكلية 0.55 و 0.52 و 0.51 و 0.50 % ، على التوالي اما نباتات التداخل a_1b_1 التي نتجت اقل نسبه حموضه كلية في الثمار بلغت 0.34 % وهي لا تختلف عن نسبه الحموضه في ثمار نباتات التداخل a_2b_1 التي بلغت 0.35 % . ومن ناحيه اخرى وجد في الجنيه الثانية تفوقت نسبة الحموضه في ثمار نباتات التداخلات و a_1b_3 و a_2b_3 و a_3b_3 التي بلغت 0.15 % لكل منها وتبين ان نباتات التداخلات ذاتها لا تختلف معنويًا عن نباتات التداخلين a_3b_1 و a_3b_2 اذ بلغا 0.14 و 0.14 % . اما ثمار نباتات التداخلين a_1b_1 و a_2b_1 فقد أنتجا اقل نسبه حموضه كليه في الثمار وهي 0.10 و 0.11 % ، على التوالي . وفي الجنيه الاخير انتجت ثمار نباتات التداخلين a_1b_1 و a_3b_1 اعلى نسبه حموضه في ثمار النباتات وهي 0.084 % لكل منهما وهي لا تختلف معنويًا عن نباتات التداخلات a_1b_2 و a_3b_2 إذ بلغت 0.079 و 0.079 و 0.078 % ، على التوالي ، اما نباتات التداخل a_2b_1 و a_2b_2 و a_2b_3 و a_1b_3 انتجت اقل نسبه حموضه بلغت 0.074 و 0.076 و 0.076 و 0.076 % ولتي لا تختلف معنويًا عن نباتات التداخل a_3b_2 و a_3b_3 وهي 0.078 و 0.079 % ، على التوالي .



شكل (2 :a) علاقة نسبة الحموضة الكلية بتأثير التغطية بالبولي اثلين





شكل (2 :b) علاقة نسبة الحموضة الكلية بتأثير الوسط الزراعي

يوضح الشكل (3: a) العلاقة الطردية الموجبه بين معاملات تغطية التربه بالوان مختلفه من البولي اثلين مع تقدم النبات في العمر بصورة عامة ، اذ لوحظ ان اعلى نسبة انتجته ثمار نباتات معاملة التغطية بالبولي اثلين الابيض مقارنة مع ثمار نباتات معاملات التغطية بالبولي اثلين الاسود والشفاف ، ولكن مع تقدم النبات في العمر قلت الفروق في نسبة فيتامين C لمعاملات تغطية التربه المختلفه . وقد انتجت ثمار النباتات التي غطيت بالبولي اثلين الاسود اعلى كمية فيتامين C مقدارها 42.17 ملغم / 100 غم وزن طري مقارنة مع ثمار النباتات التي غطيت بالبولي اثلين الشفاف التي بلغت 35.53 ملغم / 100 غم وزن طري 2/12 ، وعند اخذ العينه بتاريخ 3/12 تبين عدم وجود فروق معنويه في كميته فيتامين C في ثمار نباتات معاملات التغطية بالبولي اثلين الاسود والشفاف إذ بلغت 65.77 و 64.97 ملغم / 100 غم وزن طري بالمقارنة مع كميته فيتامين C في ثمار نباتات معاملة

السيطره التي بلغت 63.83 ملغم / 100 غم وزن طري . اما في تاريخ 4/12 فيلحظ تفوق كمية فيتامين C في ثمار نباتات معاملة التغطية بالبولي اثلين الابيض و بلغت 67.73 ملغم / 100 غم وزن طري مقارنة مع كمية فيتامين C في ثمار نباتات معاملة التغطية بالبولي اثلين الشفاف والاسود وبلغتا 66.07 ملغم / 100 غم وزن طري لكل منهما ، على التوالي .
 يلاحظ الشكل (b : 3) ان هناك علاقة طردية بين الوسط الزراعي وكمية فيتامين C باستمرار نمو النبات ، إذ تبين ان ثمار نباتات نباتات الوسط الزراعي 3تربه : 1 سماد انتجت اعلى كميته من فيتامين C مقارنة بثمار نباتات معاملة السيطره التي اعطت اقل الكميات . وكذلك تبين في تاريخ 3/12 تفوق كمية فيتامين C لثمار نباتات المعاملة ب 1 تربه : 1 سماد بلغت 39.97 ملغم / 100 غم وزن طري مقارنة مع كمية فيتامين C لثمار نباتات معاملة السيطره التي اعطت 37.30 ملغم / 100 غم وزن طري ، اما في 12 / 4 تفوقت ثمار نباتات الوسط النباتي التي سمدت تربتها ب 1 تربه : 1 سماد و 3 تربه : 1 سماد التي اعطت اعلى كميته فيتامين C في الثمار والتي لا تختلف معنويا عن بعضها إذ بلغتا 67.17 و 67.97 ملغم / 100 غم وزن طري مقارنة مع كميته فيتامين C لثمار نباتات معاملة السيطره التي بلغت 59.43 ملغم / 100 غم وزن طري . وفي الجنيه الاخير تفوقت ثمار النباتات الوسط الزراعي 3 تربه : 1 سماد التي انتجت اعلى كميته فيتامين C في الثمار بلغت 68.30 ملغم / 100 غم وزن طري اما ثمار نباتات معاملة السيطره فانتجت كميته اقل من فيتامين C في الثمار بلغت 65.50 ملغم / 100 غم وزن طري.

أوضحت نتائج التحليل الإحصائي في الجدول (4) التأثير معنوي للتداخل بين تغطية التربه بالوان مختلفه من البولي اثلين وكمية الوسط الزراعي في كميته فيتامين C في ثمار نبات الشليك مع استمرار نموه النبات وتطور ثمار . إذ تبين من خلال النتائج المعروضة في الجنيه الاولى تفوق كميته فيتامين C في ثمار نباتات التداخل a_3b_1 باعلى كميته مقدارها 46.60 ملغم / 100 غم وزن طري مقارنة مع ثمار نباتات التداخلين a_1b_1 و a_2b_2 اللتين انتجا 30.00 و 33.30 ملغم / 100 غم وزن طري على التوالي . وفيما يخص الجنيه الثانيه فلوحظ تفوق كميته فيتامين C في ثمار نباتات التداخلات a_3b_2 و a_3b_1 و a_2b_3 التي انتجت 69.00 و 68.30 و 68.30 ملغم / 100 غم وزن طري مقارنة مع نباتات التداخل a_1b_3 التي بلغت 58.30 ملغم / 100 غم وزن طري . ومن ناحيه اخرى ، تبين في 4/12 تفوق نباتات التوليفه a_1b_2 و a_2b_1 و a_2b_2 و a_3b_2 في كميته فيتامين C التي انتجت 68.30 ملغم / 100 غم وزن طري لكل منها اما ثمار نباتات التداخلين a_3b_1 و a_1b_3 فانتجت اقل كمية فيتامين C في الثمار بلغت 63.30 ملغم / 100 غم وزن طري.





جدول (2) تأثير تداخل تغطيه التربه بالبولي اثلين و الوسط الزراعي في نسبة المواد الصلبه الذائبه الكليه للثمار % عند مواعيد اخذ العينه المختلفه *

الموعد	الموعد	الموعد	الايوساط الزراعيه	البولي اثلين
الثالث 4/12	الثاني 3/12	الاول 2/12	1تربه: 1سماد	الشفاف
4.50a	5.33a	5.33d	3تربه: 1سماد	
4.00 b	4.66b	5.33D	المقارنه	
2.70 f	4.66b	5.66 c	1تربه: 1سماد	الابيض
3.83 c	5.33a	6.67A	3تربه: 1سماد	
3.66 cd	4.66b	6.00B	المقارنه	
2.87 f	4.33 c	5.66 c	1تربه: 1سماد	الاسود
3.50d	5.33a	6.66A	3تربه: 1سماد	
3.33 e	5.33a	0.16cd	المقارنه	
2.76 f	4.66b	5.33d		

جدول (3) تأثير تداخل تغطيه التربه بالبولي اثلين و الوسط الزراعي في نسبة الحموضه الكليه في الثمار % عند مواعيد اخذ العينه المختلفه *

الموعد	الموعد	الموعد	الايوساط الزراعيه	البولي اثلين
الثالث 4/12	الثاني 3/12	الاول 2/12	1تربه: 1سماد	الشفاف
0.084a	0.10c	0.34d	3تربه: 1سماد	
0.079 ab	0.13b	0.40bc	المقارنه	
0.076b	0.15a	0.51 ab	1تربه: 1سماد	الابيض
0.074b	0.11c	0.35cd	3تربه: 1سماد	
0.076b	0.13b	6.46b	المقارنه	
0.076b	0.15a	0.52a	1تربه: 1سماد	الاسود
0.084a	0.14 ab	0.38c	3تربه: 1سماد	
0.078 ab	0.14 ab	0.55a	المقارنه	
0.079 ab	0.15a	0.55a		

جدول (4) تأثير تداخل تغطيه التربيه بالبولي اثلين و الوسط الزراعي في كمية فيتامين C في الثمار(ملغم / 100 غم وزن طري) عند مواعيد اخذ العينه المختلفه *

الموعد الثاني 3/12	الموعد الاول 2/12	الايواساط الزراعية	البولي اثلين
66.60 b	30.00 d	1تربة:1سماد	الشفاف
68.30 a	38.30 c	3تربة:1سماد	
63.30 c	38.30 c	المقارنة	
68.30 a	43.30 b	1تربة:1سماد	الابيض
68.30 a	33.30 d	3تربة:1سماد	
66.60 b	37.00 c	المقارنة	
63.30 c	46.60 a	1تربة:1سماد	الاسود
68.30 a	43.30 b	3تربة:1سماد	
66.60 b	36.60 c	المقارنة	

المناقشة:

يرجع سبب الزيادة في الحاصل التراكمي الكلي الى الزيادة في حجم الثمار التي كانت مستودعا للمواد المصنعة في عملية البناء الضوئي فضلا عن مساهمتها في تكوين عدد اكبر من الثمار وزيادة في معدل وزن الثمرة الواحدة ومن ثم زيادة الحاصل التراكمي الشهري ومن ثم التراكمي الكلي و ان الزيادة في عدد الاوراق و الزيادة في المساحة الورقية ادت الى زيادة انتقال نواتج البناء الضوئي من منطقة المصدر الاوراق إلى المستودع وهو الثمار Source to sink (12 و 13).

وأوضح في الاشكال 1 و 2 و 3 و الجداول 2 و 3 و 4 التي تخص الصفات الكيميائية (اللوعية) للثمار انة عند تغطية التربة بألوان مختلفة من البولي اثلين : الشفاف او الأبيض او الأسود وعند استعمال التسميد العضوي النباتي بنسب مختلفة 1 تربة : 1 سماد او 3 تربة : 1 سماد إضافة إلى تربة فقط ، اثرت في نسبة المواد الصلبة الذائبة في الثمار كما يوضحه شكل 1 وجدول 2 حيث أعطت ثمار النباتات التي نمت تحت ظروف البولي اثلين الأسود التي سمدت تربتها ب 1 تربة : 1 سماد أعلى نسبة للمواد الصلبة الذائبة الكلية في الثمار قد يعزى هذه النتيجة الى ان هذه النباتات ذات مجموع خضري قوي وهو الذي انعكس أثره في زيادة معدلات البناء الضوئي وزيادة العمليات الأيضية للنبات وعلية تزداد المواد الكربوهيدراتية و الأحماض العضوية وانتقالها من المصدر (الأوراق) إلى المستودع (الثمار) مما نتج عنه ارتفاع نسبة المواد الصلبة الذائبة في الثمرة وهذا ما أوضحه كل من (12 و 14 و 15) .

كما أوضح الشكل 2 و الجدول 3 ان نباتات معاملة التغطية بالبولي اثلين الشفاف ونباتات معاملة السيطرة أنتجت أعلى نسبة حموضة في الثمار . ويعزى السبب في ذلك إلى ان نباتات الشليك التي تنمو في ظروف النهار الذي تكون فيه شدة الاضاءة عالية (ناتج عن استعمال البولي اثلين الشفاف) والليل البارد تعطي ثمارا ذات محتوى عالي من الحموضة الكلية في الثمارهذه النتيجة متوافقة مع ما اشار اليه (16) .

هذا ولوحظ في الشكل 3 و الجدول 4 الذي يتعلق في كمية فيتامين C في الثمار ان نباتات معاملة التغطية بالبولي اثلين الأبيض الناصع أعطت اعلى كمية من الفيتامين C مقارنة بمثيلاتها وكذلك معاملة التسميد ب 3 تربة : 1 سماد وان سبب هذه الزيادة تعود إلى ان هذه النباتات ذو مجموع خضري و جذري جيد وان هذا ينعكس على زياده معدلات البناء الضوئي وزيادة العمليات الايضية للنبات وعلية يزداد انتاج الكربوهيدرات والاحماض العضوية وانتقالها من المصدر (الاوراق) الى المستودع (الثمار) مما نتج عنه زيادة كمية فيتامين C في الثمرة الذي ايدته كل من (12 و 13 و 14 و 15) او قد يعزى الى احتواء الوسط على مواد عضوية وعناصر معدنية لها دور في تنشيط عملية بناء الضوئي و انتاج الاحماض العضوية ومنها حامض الاسكوريك (فيتامين C) ويتفق ذلك مع ما توصل اليه (16) من ان النباتات المزروعه في وسط 1 تربة : 1 سماد زاد محتواها من الفيتامين C وهذه الحالة تعود الى تحسين تركيبة التربة من ناحية الفيزيائية والمعدنية . او يعود السبب في زيادة محتوى الثمار من فيتامين C الى تأثير العوامل البيئية في النباتات ، ويعد الضوء من اهم هذه العوامل فيزداد تركيزه في ثمار و أوراق النبات بزيادة مدة الإضاءة وشدتها (11 و 12 و 16) .

المصادر:

- 1-Griffin, T. S. and Porter, G. A. (2004). Altering soil carbon and nitrogen stocks in intensively tilled two-year rotations. *Biology and Fertility of Soils*, 39: 366-374.
- 2-السعيدى ، إبراهيم حسن . (2000). إنتاج الثمار الصغيرة . دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل . العراق
- 3-United State Devision of Agriculture(USDA) . (2006) . National Nutrient database for Standard , <http://www.us.gov>
- 4-إبراهيم ، عاطف محمد . (1996). الفراولة- زراعتها، رعايتها، إنتاجها ، منشأه المعارف . الطبعة الأولى- جامعه الإسكندرية . جمهورية مصر العربية.
- 5-Elisabetta, L . and Nicola, S. (2009) . *In vitro* and *In vivo* assessment of the potential of compost and its humic acid fraction to protect ornamental plants from soil-borne pathogenic fungi.*Scientia Horticulturae* , 122:432-439.
- 6- Garcia-gil, J. C. ; Plaza, C. ; Soler-roviro, P. and Polo, A. (2002). Long term effects of municipal solid waste compost application on soil enzyme activities and microbial biomass. *Soil Biology and Biochemistry* , 11:1907-1913.
- 7-الراوي ، خاشع محمود وخلف، الله عبد العزيز. (1980) . تصميم وتحليل تجارب زراعية . مؤسسة دار البيضاء للطباعة والنشر . جامعة الموصل . العراق .
- 8-Shoirokov, E. P. (1968). *Practical Course in Storage and Processing of Fruit and Vegetable*. UADA INSF publication, Washington , D.C., :161 pp
- 9-Ranganna, S. (1977). *Manual of Analysis of Fruit and Vegetable Products* . Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited . New Delhi
- 10-A.O.A.C.(1970). *Official Methods of Anaylsis* .11th ed . Association of Official Analytical Chemists . Washington , D.C.USA.
- 11-Mengel, K. and Kirkby, E. A.(2001). *Principles of Plant Nutrition*, 5th ed . Kluwer academic publishers . Dordrecht . Netheriands :181-183.
- 12-Ozdemir, E. and Kaska, N. (2002). Effects of different rooting dates of fresh runners rooted in pots on yiehd, precocity and quality of strawberry .*Acta Horticulturae* , 567(7): 297-300.
- 13- عبد، سارة سعدي و ثامر خضير مرزة . (2013) . استجابة مؤشرات النمو الخضري والحاصل التراكمي لتغطية " Festival99-74 : (2) 5 : التربة و التسميد العضوي في نبات الشليك صنف "
- 14- Watson, R.; Wright,C.J.; McBurney, T.; Taylor,A.J. and Linforth ,R. S. T.(2002). Influence of harvest date and light integral on the development of strawberry flavour compounds. *Journal of Experimental Botany*, 53 (377): 2121-2129.
- 15-Sharma, G. and Thkur, M. S.(2000). Evaluation of different strawberry cultivars for yield and quality characters in Himachal Pradech . *Agric. Sci.Digest* .,28(3):178-180.
- 16 - Ayesha, R.; Fatma, N.; Ruqayya, M. ;Qureshi, K. M. ;Hafiz, I. A. ; Khan, K. S. and Kamal, A.(2011). Influence of different growth media on the fruit quality and reproductive growth parametrs of strawberry(*Fragaria X ananassa Duch*)*J. Medicinal Plants Res.*, 5(26):6224-6232 .